

◆解答◆

- ① (1) イ (2) ア (3) エ (4) ウ
- ② (1) A 複眼 B 触角 (2) ア, オ (3) エ (4) ウ
- ③ (1) A 肺 B 肝臓 (2) ① あ ② お (3) S
- ④ (1) 光合成 (2) 酸素 (3) X 葉緑体 Y 師管 (4) ヨウ素液 (5) ① イ ② ブドウ糖

◆解説◆

- ① (1) おすの背びれには切れこみがありますが、めすの背びれには切れこみがありません。また、おすのしりびれは大きくて平行四辺形のような形ですが、めすのしりびれはうしろが短くて三角形に近い形になっています。
- ② (1) Aの複眼は、ものの色や形を見分けます。Bの触角は、においなどを感じます。
- (2) アのチョウ、オのカブトムシはさなぎの時期がある完全変態の昆虫、イのバッタ、ウのセミ、エのトンボはさなぎの時期がない不完全変態の昆虫です。
- (3) エのトンボの幼虫であるヤゴは水中でえら呼吸をして生活します。
- (4) セミの幼虫は土の中で数年間過ごします。
- ③ (1) Cの小腸で養分を吸収した血液がBの肝臓に流れこみ、養分の一部をたくわえます。
- (2) ① Aの肺を通過する直前の血液には二酸化炭素が最も多くふくまれています。また、肺を通過した直後の血液には酸素が最も多くふくまれています。
- ② 血液中にふくまれている尿素などの不要物は腎臓でこしとられるので、腎臓を通過した直後の血液中の不要物が最も少なくなります。
- (3) Pは右心房、Qは右心室、Rは左心房、Sは左心室です。左心室から全身へ血液を送り出しているため、左心室の壁が最も厚くなっています。
- ④ (5) ① 胃液はタンパク質、だ液はでんぷんを消化します。胆汁は脂肪の消化を助けるはたらきがあります。