

いろいろな気体とその性質

実施日

/ /

得点

/50点

☆☆☆

/50点

☆☆☆

/50点

☆☆☆

次の問いに答えなさい。

- (1) 発生した気体が水にとけにくいとき、その気体を集めるのに適した方法を何とといいますか。
- (2) 水にとけやすく、密度が空気よりも大きい気体を集めるのに適した方法を何とといいますか。
- (3) 水にとけやすく、密度が空気よりも小さい気体を集めるのに適した方法を何とといいますか。
- (4) 空気中にふくまれている、ものを燃やすはたらきのある気体は何ですか。
- (5) 二酸化炭素の水溶液の性質は何性ですか。
- (6) 二酸化炭素を石灰水に通すと、石灰水はどうなりますか。
- (7) アンモニアの水溶液の性質は何性ですか。
- (8) 二酸化マンガんにうすい過酸化水素水を加えると発生する気体は何ですか。
- (9) 亜鉛や鉄などに塩酸を加えると発生する気体は何ですか。
- (10) 空気中に体積の割合で約78%ふくまれ、ふつうの温度では変化しにくい性質をもつ気体は何ですか。

① 3点×10… /30点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	
(8)	
(9)	
(10)	

② 次の□にあてはまる語を書きなさい。

② 2点×10… /20点

気体名	①	②	アンモニア	③
色	ない	ない	ない	ない
におい	ない	ない	④	ない
空気と比べた重さ	少し軽い	少し重い	⑤	⑥
水へのとけやすさ	⑦	とけにくい	非常にとけやすい	少しとける
気体の集め方	すいじょうちかんほう 水上置換法	⑧	⑨	かほう 下方置換法 (水上置換法)
その他の性質	空気中に約78%ふくまれる。ふつうの温度では変化しにくい。	ものを燃やすはたらきをもつ。	有毒。水溶液はアルカリ性で、フェノールフタレイン溶液を加えると ⑩ 色になる。	石灰水を白くにごらせる。水溶液は酸性。