

◆解答◆

- ① (1) 子葉 (2) A, B, C (3) B
 (4) でんぷん (5) A:イ B:ア
 (6) ウ
- ② (1) ア:めしべ(柱頭)
 イ:おしべ(やく)
 (2) オ (3) カ (4) イ
- ③ (1) ひげ根 (2) ㉑ (3) イ
 (4) 道管 (5) C
- ④ (1) 二酸化炭素
 (2) A:イ B:ウ C:ア
 (3) 青むらさき色 (4) 葉緑体

◆解説◆

- ① (2) 成長して植物の体(根, くき, 葉)になる部分を, はいといいます。Aのよう芽は本葉やくきに, Cのよう根は根に, Bの子葉は最初に出てくる葉になります。
- (3) インゲンマメの種子にははいにゆうがないので, Bの子葉に発芽のための養分をたくわえています。
- (5) Aのよう芽は子葉の養分を受け取り, 成長していくので重くなっていきます。Bの子葉は, 養分を他の部分の成長に使うので, 軽くなっていきます。
- (6) アはアサガオ, イはイネ, エはトウモロコシの発芽のようすです。
- ② (2) タンポポやアサガオの花は, 花びらがくっついて^{ごうべんか}いる合弁花で, サクラやアブラナ, シロツメクサ, エンドウの花は, 花びらが^{はな}離れて^{りべんか}いる離弁花です。マツの花には花びらがありません。
- (4) タンポポの花粉は虫によって運ばれます。なお, タンポポの種子は, 風によって運ばれます。
- ③ (2) ㉑は根毛, ㉒は成長点, ㉓は根かんです。
- (5) 図3のようなくきをもつ植物は^{そう}単子葉類です。A, Bは双子葉類, Cは単子葉類です。
- ④ (3)(4) 葉のふの部分は葉緑体がないので光合成ができず, でんぷんがつくられません。ほかの部分では光合成が行われてでんぷんがつくられるので, ヨウ素液につけると青むらさき色に変化します。