

- 1 (1) A:イ B:ウ C:ア
 (2) ぼうこう (3) ア
- 2 (1) もうまく (2) イ
- 3 (1) ウ (2) アンモニア
 (3) かん臓
- 4 (1) A:ウ B:イ C:ア
 (2) ア:e イ:d ウ:c

◆解説◆

- 1 (1) Aは、心臓にもどる血液が流れている血管なので静脈です。Bは、心臓から送り出される血液が流れている血管なので動脈です。Cはじん臓でつくられたにょうが通る輸にょう管です。
- (2) じん臓でつくられたにょうは、ぼうこうで一時的にためられたあと、体外にはい出されます。
- (3) じん臓では、にょう素などの血液中の不要物がこし取られるので、じん臓を通る前の血液にふくまれるにょう素の割合の方が、じん臓を通ったあとの血液にふくまれるにょう素の割合よりも大きくなっています。
- 2 (2) 暗い場所では、目に入る光の量を多くするために、ひとみが大きくなっています。明るい場所に行くと、目に入る光の量を少なくするために、ひとみが小さくなります。
- 3 (2)(3) 体内のタンパク質が分解されるときに生じる有害なアンモニアは、かん臓に送られて、害の少ないにょう素がつくられます。
- (2)ア 肺を通った直後の血液には酸素が多くふくまれています。
- イ じん臓では、二酸化炭素以外の不要物がこし取られるので、じん臓を通った直後の血液にふくまれている不要物は最も少なくなります。
- ウ Bの小腸で吸収きうしゆされたブドウ糖とうやアミノ酸はかん臓にたくわえられます。よって、食後、小腸とかん臓をつなぐ血管(門脈)を流れる血液には栄養分が多くふくまれています。