

4 消化と吸収

学習日	月	日	得点
名前			/100点

1 2本の試験管AとBにでんぷんのりを 5cm^3 ずつ入れ、Aには水 1cm^3 、Bにはだ液 1cm^3 を加え、右の図のように、ある温度で10分間保ちました。その後、ヨウ素液を加えて調べると、Aにはでんぷんがあり、Bにはありませんでした。これについて、次の問いに答えなさい。



1 10点×5 /50点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

(1) 図のビーカーの水は、およそ何℃がよいですか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア 約 20°C イ 約 40°C ウ 約 60°C エ 約 80°C

(2) ヨウ素液を加えたとき、A、Bどちらでどのような変化が見られましたか。簡単に書きなさい。


(3) Bでは、でんぷんはだ液のはたらきで何にとけやすい養分に変えられましたか。

(4) だ液のような消化液をつくる部分を、次のア～エからすべて選び、記号で答えなさい。

ア 食道 イ 胃 ウ 小腸 エ 大腸

(5) 消化された養分は、どこで体内にとり入れられますか。(4)のア～エから選び、記号で答えなさい。

2 右の図は、人のからだの内部を示したものです。これについて、次の問いに答えなさい。



2 10点×5 /50点

(1)	
(2)	D F
(3)	
(4)	

(1) 図のAからこう門までのひとつながりの管を何といいますか。

(2) 図のDとFの名前を書きなさい。

(3) 図のFではEで吸収しきれなかったものをおもに体内に吸収します。そのものの名前を答えなさい。

(4) 体内に吸収されなかったものは、こう門から何になって体外へ出されますか。