

Всего было выявлено 11 случаев апноэ во время сна. В течение всего периода наблюдения за пациентом не было выявлено никаких других нарушений сна.

Выводы исследования

В результате проведенного исследования выявлено наличие у пациента синдрома обструктивного апноэ во время сна. В течение всего периода наблюдения за пациентом не было выявлено никаких других нарушений сна.


Рекомендации

Всем пациентам с синдромом обструктивного апноэ во время сна рекомендуется использовать CPAP-аппарат для лечения. В течение всего периода наблюдения за пациентом не было выявлено никаких других нарушений сна.

В течение всего периода наблюдения за пациентом не было выявлено никаких других нарушений сна.

1	173	179	4	В течение всего периода наблюдения за пациентом не было выявлено никаких других нарушений сна.
2	532	537	5	В течение всего периода наблюдения за пациентом не было выявлено никаких других нарушений сна.
3	631	639	8	В течение всего периода наблюдения за пациентом не было выявлено никаких других нарушений сна.
4	715	723	8	В течение всего периода наблюдения за пациентом не было выявлено никаких других нарушений сна.
5	740	781	41	В течение всего периода наблюдения за пациентом не было выявлено никаких других нарушений сна.
6	804	809	5	В течение всего периода наблюдения за пациентом не было выявлено никаких других нарушений сна.

Длительность эпизода НРД, с



Количество разных типов апноэ за всю ночь

