



PROQUIMIA
www.proquimia.com

DEOBACT

Fiche Technique
04/2012



PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES:

- > Liquide transparent de couleur jaune
- > Densité: $1,00 \pm 0,1$ g/ml
- > pH à 5% : $11,25 \pm 0,25$

CARACTERISTIQUES:

- > Triple action dans une seule opération : désinfection, nettoyage et désodorisation. Sa forte concentration en matières actives lui permet d'éliminer tous types de salissures, y compris les micro-organismes pathogènes pour l'homme.
- > Peut être employé sur tous types de surfaces: mosaïques, carreaux, plastiques, surfaces peintes et émaillées, acier inoxydable, etc.
- > Conçu pour le nettoyage et la désinfection des installations en milieu alimentaire et grandes collectivités présentant un risque de prolifération microbienne.
- > Incompatibilité avec les produits anioniques.

ACTIVITE MICROBICIDE:

Détergent bactéricide fongicide à base d'ammonium quaternaire pour le nettoyage et désinfection de surfaces en une seule phase, en milieu alimentaire. Registre Bactéricide 08-20-02820 HA

CONDITIONNEMENT:
BIDON 4 L (carton 6 u.)
BIDON 10 L

-Selon les études réalisées par l'Institut de Santé Carlos III, le produit est en conformité avec :

- La norme UNE-EN 1276 dilué en eau à 1%, en conditions sales, à la concentration du 4 %, à 20°C et un temps de contact de 5 minutes, face à : *Escherichia coli*, *Pseudomone aeruginose*, *Enterococcus hirae*, *Staphylococcus aureus*.

- La norme UNE-EN 1275 à la concentration du 2,5% et un temps de contact de 15 minutes à 20°C face à *Candida albicans* et *Aspergillus niger*.

- Activité face au virus Hépatites B (HBV) à 2 % et un temps de contact de 30 minutes.

- La norme UNE-EN 13697 en conditions propres à une concentration de 4 %, à 20°C et un temps de contact de 5 minutes face à : *Escherichia coli*, *Pseudomone aeruginose*, *Enterococcus hirae*, *Staphylococcus aureus*.

- Activité face à la *Listeria monocytogenes* Type 4 dilué à 0,6%, avec un temps de contact de 5 minutes selon le test de suspension qualitatif DGHM.

- Activité bactéricide face à la *Salmonella typhimurium* dilué à 4% avec un temps de contact d'1 heure selon le test DGHM VII^o.

CONSEILS D'UTILISATION:

S'applique par pulvérisation, trempage et aspersion du produit dilué en eau à une concentration de 4 % et un temps de contact de 5 à 10 minutes. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les aliments, les appareils et/ ou ustensiles manipulés dans les locaux ou installations antérieurement traitées avec le produit mentionné, soient libres de tous résidus de composants. A cet effet, laver abondamment avec de l'eau les parties traitées avant son utilisation.





PROQUIMIA
www.proquimia.com

DEOBACT

Fiche Technique
04/2012



La désinfection des surfaces doit être faite en l'absence des aliments.

MESURES DE PREVENTION:

Consulter la fiche de données de sécurité.
Ne pas mélanger de produits chimiques purs.

