

А. Т. Улимаева
(г. Уфа)

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА НАХОЖДЕНИЕ НАИБОЛЬШИХ И НАИМЕНЬШИХ ЗНАЧЕНИЙ
ФУНКЦИЙ

Опыт нашей работы в школах Башкирской АССР показал, что при организации повторения учебного материала в X классе целесообразно рассматривать задачи на нахождение наибольших и наименьших значений функций, причем использовать при их решении наряду с аппаратом производной и другие способы. Это способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся, вызывает у них интерес к решению задач и к изучению математики в целом.

Приведем пример решения одной такой задачи:

Требуется огородить прямоугольный участок земли площадью a^2 . Определите оптимальные размеры участка, при которых затраты на ограду будут наименьшими (предполагается, что стоимость ограды пропорциональна ее длине с коэффициентом $k > 0$).

Решение. I способ. Найдем прямоугольник площади a^2 , у которого периметр наименьший. Пусть $x > 0$ – длина стороны прямоугольника, тогда длина смежной с ней стороны равна $\frac{a^2}{x}$. Периметр прямоугольника $P(x) = 2(x + \frac{a^2}{x})$.

Найдем наименьшее значение $P(x)$, применяя производную:

$$P'(x) = 2(1 - \frac{a^2}{x^2}), x \in]0; +\infty[$$

Определим критические точки функции:

$$(2(1 - \frac{a^2}{x^2}) = 0) \Leftrightarrow (x = a \text{ или } x = -a)$$

так как $a > 0$, то $x = a \in]0; +\infty[$.

Найдем следующие значения функции $P'(x)$:

$$P'(\frac{a}{2}) = 2(1 - \frac{4a^2}{a^2}) = -6 < 0$$

$$P'(2a) = 2(1 - \frac{a^2}{4a^2}) = \frac{3}{2} > 0$$

Следовательно, $\min_{]0; +\infty[} P(x) = 4a$ при $x = a$.

Длина другой стороны прямоугольника также равна a .

Из условия задачи известно, что стоимость изгороди $N(x)$ пропорциональна ее длине с коэффициентом $k > 0$: $N(x) = k \cdot P(x)$. Следовательно $N(x)$ получит наименьшее значение, откуда

$$N_{opt}(x) = \min_{]0; +\infty[} N(x) = k \cdot 4a \text{ при } x = a$$

Итак, чтобы оптимизировать стоимость изгороди, целесообразно выбрать участок квадратной формы.

II способ. Замечая, что $P(x) = 2(x + \frac{a^2}{x}) = 2((\sqrt{x})^2 - 2\sqrt{x} \frac{a}{\sqrt{x}} + \frac{a^2}{(\sqrt{x})^2}) + 4a = 2(\sqrt{x} - \frac{a}{\sqrt{x}})^2 + 4a$, где $x \in]0; +\infty[$, заключаем, что $\min_{]0; +\infty[} P(x) = 4a$ при $x = a$:

$$((\sqrt{x} - \frac{a}{\sqrt{x}})^2 = 0) \Rightarrow (\sqrt{x} = \frac{a}{\sqrt{x}}) \Rightarrow (x = a)$$

III способ. Обозначим полупериметр прямоугольника $p(x)$. Пусть x – длина одной из его сторон, тогда длина смежной с ней стороны равна $p - x$ ($0 \leq x \leq p$). Площадь прямоугольника $a^2 = x(p - x)$;

$$(x^2 + a^2 - px = 0) \Leftrightarrow ((x - a)^2 + x(2a - p) = 0$$

Т. П. Григорьева
(г. Горький)

К ИЗУЧЕНИЮ СКАЛЯРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ

Доказательство распределительного свойства скалярного умножения векторов представляет трудности как в методическом, так и в математическом плане. В учебном пособии "Геометрия 9" (§, с. 59) приведено доказательство этого свойства векторов. Существуют и другие доказательства (см.: Скопец З. А. О распределительном свойстве скалярного произведения векторов. – Математика в школе, 1965, № 6, с. 26; Скопец З. А. и др. Скалярное произведение двух векторов. – Математика в школе, 1968, № 6, с. 8; Скопец З. А. Соотношение Лейбница и распределительное свойство скалярного произведения векторов. – Квант, 1972, № 6, с. 22). Однако названные доказательства либо слишком алгебраичны, либо громоздки. Приведем новое доказательство, навеянное статьей З. А. Скопца, опубликованной в № 6 журнала "Математика в школе" за 1965 г., которое, нам кажется, имеет преимущества по сравнению с указанными.

Предварительно с учащимися нужно рассмотреть метрическое свойство параллелограмма: сумма квадратов длин диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов длин диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов длин его сторон, т. е.

$$d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2. \quad (1)$$

Доказательство этого свойства следует из равенств

$$(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 \quad (2)$$

и


$$(\vec{a} + \vec{b})^2 = \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 \quad (3)$$

и не представляет трудностей для учащихся.

Заметим, что метрическое соотношение (1) может быть доказано ранее, в VIII классе, с помощью теоремы косинусов и применяется при решении других задач.

Перейдем теперь к доказательству распределительного свойства скалярного умножения векторов.

От точки O отложим векторы $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}, \vec{OC} = \vec{c}$.



(Рис. 1)

а) Пусть точки A, B, C не принадлежат одной прямой (рис. 1). Построим треугольник ABC до параллелограмма $ABCD$. Тогда $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}, \vec{AC} = \vec{c} - \vec{a}, \vec{BC} = \vec{c} - \vec{b}$. Нетрудно видеть,

что $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$, где $\vec{d} = \vec{OD}$, откуда $\vec{d} = \vec{b} + \vec{c} - \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b} + \vec{c} - 2\vec{a}$. Согласно (1) запишем

$$2|AB|^2 + 2|AC|^2 = |AD|^2 + |BC|^2$$

или

$$2(\vec{b} - \vec{a})^2 + 2(\vec{c} - \vec{a})^2 = ((\vec{b} + \vec{c}) - 2\vec{a})^2 + (\vec{c} - \vec{b})^2$$

После раскрытия скобок, основанных на равенствах (2) и (3), получаем

$$\vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{c} \cdot \vec{a} = (\vec{b} + \vec{c}) \cdot \vec{a}$$

Отметим, что рассмотренное доказательство справедливо как для компланарных так и для некопланарных векторов.

Для полноты изложения рассмотрим два частных случая.


б) Пусть точки A, B, C принадлежат одной прямой (рис. 2). Тогда введем вектор $k\vec{a}$, где $k \neq 1, k \neq \infty$. Согласно случаю а) имеем:

$$k\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = (k\vec{a}) \cdot \vec{b} + (k\vec{a}) \cdot \vec{c}$$


или

$$k(\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})) = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) + k(\vec{a} \cdot \vec{c})$$

После сокращения на k получаем требуемое равенство.



(Рис.2)



(Рис.3)

в) Пусть векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ коллинеарны. Тогда $\vec{a} = \alpha\vec{e}, \vec{b} = \beta\vec{e}, \vec{c} = \gamma\vec{e}$, где $|\vec{e}| = 1$. Отсюда следует:

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \alpha\vec{e} \cdot (\beta\vec{e} + \gamma\vec{e}) = \alpha\vec{e} \cdot (\beta + \gamma)\vec{e} = \alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma \quad (4)$$

С другой стороны,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} = (\alpha\vec{e}) \cdot (\beta\vec{e}) + (\alpha\vec{e}) \cdot (\gamma\vec{e}) = \alpha\beta + \alpha\gamma \quad (5)$$

Сравнивая правые части равенств (4) и (5), получаем истинность распределительного закона скалярного умножения векторов и для этого случая.

На уроке достаточно ограничиться общим случаем. Случаи б) и в) можно предложить либо в качестве упражнений, либо при повторении, либо сообщить учащимся лишь идею доказательства.

Приведем пример применения распределительного свойства скалярного умножения векторов.

Задача. Даны четыре точки A, B, C, D . Известны расстояния между этими точками: $|DA| = a, |DB| = b, |DC| = c, |AB| = a_1, |BC| = a_1, |AC| = b_1$. Найдите расстояние от одной из этих точек до центроида¹ оставшихся трех точек.

Решение. Пусть требуется найти расстояние от точки D до центроида G точек A, B, C (рис. 3). Введем векторы: $\vec{DA} = \vec{a}, \vec{DB} = \vec{b}, \vec{DC} = \vec{c}$. Тогда

$$\vec{DG} = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$$

¹Центroidом трех точек P, Q, R называется такая точка G , что

$$\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OP} + \vec{OQ} + \vec{OR})$$

отсюда

$$\overrightarrow{DG}^2 = \frac{1}{9}((\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c})^2 = \frac{1}{9}((\vec{a} + \vec{b})^2 + 2(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} + \vec{c}^2)$$

Согласно распределенному свойству скалярного умножения векторов имеем

$$\overrightarrow{DG}^2 = \frac{1}{9}(\vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + 2\vec{c} \cdot \vec{a})$$

Но

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= \frac{\overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OB}^2 - \overrightarrow{AB}^2}{2} = \frac{a^2 + b^2 - c_1^2}{2} \\ \vec{b} \cdot \vec{c} &= \frac{\overrightarrow{OB}^2 + \overrightarrow{OC}^2 - \overrightarrow{BC}^2}{2} = \frac{b^2 + c^2 - a_1^2}{2} \\ \vec{c} \cdot \vec{a} &= \frac{\overrightarrow{OC}^2 + \overrightarrow{OA}^2 - \overrightarrow{AC}^2}{2} = \frac{c^2 + a^2 - b_1^2}{2}\end{aligned}$$

поэтому

$$|DG|^2 = \frac{1}{3}(a^2 + b^2 + c^2) - \frac{1}{9}(a_1^2 + b_1^2 + c_1^2) \quad (6)$$

Отметим, что если точки A, B, C, D являются вершинами тетраэдра $ABCD$, то квадрат длины отрезка $|DG|$ вычисляется по формуле (6).

Решая эту задачу, мы попутно вывели формулу скалярного квадрата суммы трех векторов:

$$(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2 = \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + 2\vec{c} \cdot \vec{a}$$

Эта формула часто применяется при решении задач.

Материал, рассмотренный в статье может быть использован учителем на уроках геометрии как при непосредственном изучении материала, так и при его повторении, а также на внеклассных занятиях.