Подключение инфузионной системы к ПВК

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления (выполнить/сказать)[1]
	Подготовительный этап выполнения манипуляции	
1.	Ознакомился с листом назначения	сказать/выполнить
2.	Поздоровался	сказать
3.	Представился. Провел идентификацию пациента	сказать
4.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил устное согласие на ее выполнение	сказать
5.	Предложил пациенту занять необходимое положение	сказать
6.	В полном объеме подготовил необходимое оснащение для проведения манипуляции	сказать/выполнить
7.	Проверил целостность, внешний вид и сроки годности ампул/флаконов с ЛС и медицинских изделий до надевания нестерильных перчаток	выполнить
8.	Указал на флаконе с раствором инфузионным дату и время вскрытия флакона, фамилию и инициалы пациента	сказать
9.	Обработал руки в соответствии с НПА	сказать
	Основной этап выполнения манипуляции	
10.	Вскрыл упаковку ватных шариков	выполнить
11.	Правильно обработал флакон	выполнить
12.	Вскрыл упаковку с инфузионной системой. Извлек и расправил систему, закрепил иглу инъекционную на коннекторе системы	выполнить
13.	Закрыл роликовый зажим системы	выполнить
14.	Закрепил флакон на штативе (дном вверх)	выполнить
15.	Открыл воздушный клапан системы	выполнить
16.	Заполнил систему, убедился визуально в отсутствии воздуха в трубке системы. Поместил трубку системы на штатив	выполнить
17.	Набрал и отдозировал шприцы с 1 мл и 5 мл раствора натрия хлорида 9 мг/мл, вложил во скрытые упаковки от шприцов, предварительно сняв иглы рукой	сказать/выполнить
18.	Подготовил полоску лейкопластыря длиной 10 см	выполнить
19.	Озвучил: «Обрабатываю руки в соответствии с НПА». Надел медицинские нестерильные перчатки	сказать
20.	Вскрыл упаковки с салфетками марлевыми	выполнить
21.	Снял повязку бинтовую и салфетку марлевую	выполнить
22.	Подложил стерильную марлевую салфетку под основной порт	выполнить
23.	Удалил гепаринизированный раствор из ПВК, предупреждая кровотечение из катетера прижатием вены в предполагаемом месте нахождения верхушки ПВК	выполнить
24.	Промыл ПВК, предупреждая кровотечение из катетера прижатием вены в предполагаемом месте нахождения верхушки ПВК	выполнить
25.	Проконтролировал заполнение системы: прижимая вену 3-м пальцем левой руки в предполагаемом месте нахождения верхушки ПВК, расположил коннектор инъекционной муфты между 1-м и 2-м пальцами левой руки, отсоединил правой рукой иглу с колпачком (или защитный колпачок системы), поместил на столик манипуляционный, приоткрыл правой рукой зажим до появления капли раствора, закрыл зажим	выполнить
26.	Подключил инфузионную систему к основному порту ПВК, предупреждая кровотечение из катетера прижатием вены в предполагаемом месте нахождения верхушки ПВК	выполнить
27.	Слегка приоткрыл роликовый зажим	выполнить

28.	Зафиксировал систему полоской лейкопластыря ниже инъекционной муфты	выполнить
29.	Отрегулировал скорость введения ЛС	выполнить
30.	Прикрыл салфеткой марлевой место соединения основного порта ПВК с инъекционной муфтой системы	выполнить
31.	Озвучил: "Наблюдаю за состоянием пациента во время инфузии"	сказать
	Заключительный этап выполнения манипуляции	
32.	Правильно произвел дезинфекцию перевязочного материала	сказать/выполнить
33.	Правильно произвел дезинфекцию шприцев, системы, заглушки	сказать/выполнить
34.	Правильно произвел дезинфекцию игл	сказать/выполнить
35.	Озвучил: "Снимаю перчатки рабочей поверхностью внутрь, помещаю их в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала и СИЗ». Обрабатываю руки в соответствии с НПА»	сказать/выполнить
36.	Поместил пластмассовые колпачки, горловины от ампул и ампулы/флаконы, пустые упаковки в соответствующие контейнеры	сказать/выполнить
37.	Зарегистрировал выполнение манипуляции в медицинской документации.	сказать/выполнить

1- Зависит от физической возможности выполнения, а также от оборудования станции

ГомГМУ
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ