### *2. Измерение артериального давления*

| № п/п | Перечень практических действий | Форма представления (выполнить/сказать) |
|---|---|---|
| | **Подготовительный этап выполнения манипуляции** | |
| 1. | Произвёл гигиеническую обработку рук (см. алгоритм №1) | выполнить |
| 2. | Предложить пациенту занять положение сидя в удобной позе с опорой на спинку стула или лежа. Рука, на которой будет проводиться измерение АД, должна быть свободно расположена на поверхности стола или кровати ладонью вверх, ноги пациента должны быть расслаблены и не перекрещиваться. | сказать |
| | **Основной этап выполнения манипуляции** | |
| 3. | Наложить манжету тонометра соответствующего размера на плечо пациента на 2 см выше локтевой ямки. Середина манжеты должна быть расположена на уровне сердца (приблизительно на уровне четвертого межреберьz). Не следует накладывать манжету на ткань одежды. Установить стрелку манометра на нулевую отметку шкалы | выполнить |
| 4. | Определить пальпаторно пульсацию артерии в локтевой ямке, приложить мембрану фонендоскопа к месту пульсации. | сказать/выполнить[1] |
| 5. | Закрыть вентиль груши тонометра и быстро накачать воздух в манжету до уровня давления, на 20−30 мм рт. ст. превышающего систолическое АД (определяется по исчезновению аускультативных тонов) | выполнить |
| 6. | Открыть вентиль и медленно выпускать воздух, одновременно выслушивать тоны и следить за показаниями манометра | выполнить |
| 7. | Зафиксировал момент появления первых тонов Короткова (систолическое АД) | выполнить |
| 8. | Зафиксировал момент полного исчезновения тонов Короткова (диастолическое АД) | выполнить |
| 9. | При необходимости повторил измерение: полностью спустил воздух из манжеты, далее п.п.7-10 | выполнить |
| | **Заключительный этап выполнения манипуляции** | |
| 10. | Озвучил результат измерения АД | сказать |
| 11. | Снял манжету, стетоскоп, | выполнить |
| 12. | Произвёл гигиеническую обработку рук (см. алгоритм №1) | сказать |
| 1- при измерении АД на манекене следует выполнить определение пульсации артерии в локтевой ямке и озвучить «Определяю пульсацию плечевой артерии в локтевой ямке» | | |