

AUFKLÄRUNG

1. Was ist das?

- ✓ Bei der _____ handelt es sich um eine Untersuchung zur Darstellung von _____ mittels _____.
- ✓ Die _____ ist ein bildgebendes Verfahren, mit dem man _____ beurteilen kann.

- ☐ **Sonographie:** ...zur Darstellung von Organen und Körperstrukturen.
- ☐ **Echokardiographie:** ...zur Darstellung des Herzens.
- ☐ **Duplexsonographie:** ...zur Darstellung der Blutgefäße.
- ☐ **CT:** ...zur Darstellung von Organen und Geweben mithilfe von Röntgenstrahlen.
- ☐ **MRT:** ...zur Darstellung von Organen und Geweben mithilfe eines Magnetfeldes und Radiowellen.

- ☐ **Sonographie** → ...von Organen mittels Schallwellen.
- ☐ **Echokardiographie** → ...des Herzens mittels Schallwellen.
- ☐ **CT** → ...von Organen mittels Röntgenstrahlen.
- ☐ **MRT** → ...von Organen mittels eines Magnetfeldes und Radiowellen.

2. Mit dieser Untersuchung können wir _____ beurteilen bzw. krankhafte Veränderungen feststellen.

3. Die Untersuchung ist in der Regel **schmerzfrei**.

4. Die Untersuchung ist **strahlenfrei**.

Bei dieser Untersuchung werden **Röntgenstrahlen verwendet**. Die Strahlenbelastung ist jedoch gering.

5. Die Untersuchung **dauert** ungefähr _____ Minuten.

6. **Vor der Untersuchung sollten Sie** _____.

zB:

- den Oberkörper freimachen// die entsprechende Körperregion für die Untersuchung freizumachen
- Schmuck ablegen
- nüchtern bleiben
- zwei Stunden vorher nichts essen und trinken

7. **Während der Untersuchung liegen Sie** auf einer Liege.

8. **Dabei wird** _____ **verwendet**.

zB: ein Schallkopf, ein CT-Gerät, ein MRT-Gerät, Elektroden

9. **Während der Untersuchung sollten Sie** möglichst ruhig bleiben.

10. Je nach klinischem Verdacht kann die Untersuchung **mit oder ohne Kontrastmittel durchgeführt** werden.
Das Kontrastmittel dient dazu, die Gefäße und Organe besser darzustellen.

11. Wie jede Untersuchung ist auch diese mit **gewissen Risiken** verbunden.

Zu den **möglichen Nebenwirkungen** gehören _____.

12. Die Untersuchung kann **unter Umständen nicht durchgeführt werden**, wenn _____.

13. **Als Alternative kommen gegebenenfalls** eine _____ oder eine _____ in Betracht.

Sonographie

Bei der Sonographie handelt es sich um eine Untersuchung **zur Darstellung einer Körperregion** mittels **Schallwellen**.

Mit dieser Untersuchung können wir **verschiedene Organe und Körperstrukturen** beurteilen bzw. **krankhafte Veränderungen** feststellen. Dafür benötigen Sie keine spezielle Vorbereitung.

Die Untersuchung ist **schmerzfrei und strahlenfrei**. Sie **dauert** nur 10-20 Minuten.

Während der Untersuchung wird **ein Gel auf die Haut aufgetragen** und der **Schallkopf über die Haut bewegt**. Dabei können wir die Organe **aus verschiedenen Winkeln** betrachten.

Röntgen

Bei der Röntgenuntersuchung handelt es sich um ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung einer Körperregion mittels Röntgenstrahlen. Die Strahlenbelastung hier ist sehr gering und Sie bekommen eine Schutzkleidung gegen die Strahlung.

Mit dieser Untersuchung können wir verschiedene Körperstrukturen beurteilen, beispielsweise die Lunge, die Herzgröße, das Zwerchfell oder mögliche Knochenbrüche.

Die Untersuchung ist schmerzfrei und dauert in der Regel etwa zwei Minuten.

Vor der Untersuchung sollten Sie Schmuck und metallische Gegenstände ablegen.

Bitte bleiben Sie während der Untersuchung möglichst ruhig, damit die Bilder gut werden.

Es werden mehrere Aufnahmen aus unterschiedlichen Richtungen angefertigt, um die betroffene Körperregion möglichst genau beurteilen zu können.

CT

Bei der Computertomographie handelt es sich um ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung einer Körperregion mittels Röntgenstrahlen.

Mit dieser Untersuchung können wir den Körper in Querschnittsbildern darstellen.

Die Untersuchung ist schmerzfrei und dauert etwa 5-10 Minuten.

Vor der Untersuchung sollten Sie Schmuck und metallische Gegenstände ablegen.

Das Gerät ist ringförmig aufgebaut. Während der Untersuchung liegen Sie auf einer Liege, die langsam durch den Ring fährt.

Sie sollten möglichst ruhig bleiben.

Je nach Fragestellung kann die Untersuchung mit oder ohne Kontrastmittel durchgeführt werden. Das Kontrastmittel sollen Sie vorher trinken oder es wird Ihnen gespritzt. Das Kontrastmittel dient dazu, Gefäße und Organe besser darzustellen. Sie sollen aber 2 Stunden vor der Untersuchung nicht essen oder trinken.

Außerdem sollten Sie den Nierenwerten kontrollieren lassen und keine Allergie gegen Kontrastmittel haben.

Die Untersuchung wird in der Regel nicht durchgeführt, wenn eine Schwangerschaft vorliegt.

(Das Kontrastmittel besteht aus Jod.)

MRT

Bei der Magnetresonanztomographie handelt es sich um ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung und Beurteilung von Organen und inneren Strukturen mithilfe eines Magnetfeldes und von Radiowellen. Mit dieser Untersuchung können wir verschiedene Körperstrukturen detailliert und dreidimensional darstellen.

Die Untersuchung ist schmerzfrei und strahlenfrei.

Sie dauert etwa 20 bis 30 Minuten.

Vor der Untersuchung sollten Sie alle metallischen Gegenstände sowie Schmuck ablegen. (z.B. Brille, Gürtel, Ohringe, Münzen usw.)

Sie sollten zudem möglichst ruhig bleiben, um eine gute Bildqualität zu erreichen.

Während der Untersuchung liegen Sie auf einer Liege, die langsam in die Röhre fährt.

Falls sie unter Angst leiden, können wir Ihnen ein Beruhigungsmittel verabreichen. Außerdem haben sie jederzeit die Möglichkeit, über einen Notknopf die Untersuchung zu unterbrechen.

Je nach Fragestellung kann die Untersuchung mit oder ohne Kontrastmittel durchgeführt werden.

Bestimmte Implantate oder ein Herzschrittmacher (Pacemaker) müssen vorab berücksichtigt werden.

(Das Kontrastmittel besteht aus Gadolinium.)

ÖGD (Gastroskopie oder Magenspiegelung)

Bei der ÖGD untersuchen wir **Ihre Speiseröhre, Ihren Magen und Ihren Zwölffingerdarm** mit einer kleinen **Kamera**. Dafür **führen** wir **einen dünnen, flexiblen Schlauch über den Mund in die Speiseröhre und weiter bis zum Zwölffingerdarm ein**. So können wir die **Schleimhaut genau beurteilen** und bei Bedarf **Gewebeprobe entnehmen**. Vor der Untersuchung muss der obere Verdauungstrakt frei sein, deshalb sollten Sie **etwa 8 Stunden nüchtern** bleiben. Die Untersuchung erfolgt in der Regel unter einer **leichten Sedierung**, sodass Sie möglichst wenig davon spüren. Die Untersuchung dauert ungefähr 30 Minuten. Nach der Untersuchung **bleiben Sie bei uns** zur Beobachtung. Theoretisch können einige Komplikationen wie **Schluckbeschwerden, Blutungen, Infektionen und Verletzungen** der Schleimhaut auftreten, aber das ist sehr selten. *Unser Team verfügt über genügend Erfahrung.*

Koloskopie

Bei der Koloskopie untersuchen wir Ihren Darm mit einer kleinen **Kamera**. Dafür **führen** wir einen dünnen, flexiblen Schlauch **über den After in den Darm ein**. So können wir die **Darmschleimhaut genau beurteilen** und bei Bedarf **Gewebeprobe entnehmen** oder **Polypen entfernen**. Vor der Untersuchung muss der Darm vollständig **gereinigt** werden, deshalb **erhalten Sie ein Abführmittel**. Die Untersuchung erfolgt in der Regel **unter einer leichten Sedierung**, sodass Sie möglichst wenig davon spüren. Die Untersuchung dauert ungefähr 30 bis 40 Minuten. Nach der Untersuchung bleiben Sie bei uns zur Beobachtung. Theoretisch können einige Komplikationen wie Blutungen, Infektionen und Verletzungen der Darmwand auftreten, aber das ist sehr selten. *Unser Team verfügt über genügend Erfahrung.*

ERCP

ERCP ist die Abkürzung für **endoskopische retrograde Cholangio-pankreatographie**.

Bei der ERCP untersuchen wir Ihre **Gallenwege, die Gallenblase und die Bauchspeicheldrüsengänge** mit einer **kleinen Kamera** und **Röntgen-Kontrastmittel**. Dafür **führen** wir einen **dünnen, flexiblen Schlauch über den Mund in die Speiseröhre, den Magen und den Zwölffingerdarm bis zur Mündung der Gallengänge ein**. So können wir das **Gangsystem** genau beurteilen und bei Bedarf **gleichzeitig Behandlungen** durchführen, zum Beispiel **Gallensteine entfernen, Gewebeprobe entnehmen** oder **die Mündung der Gallengänge erweitern**. Vor der Untersuchung sollten Sie etwa **8 Stunden nüchtern** bleiben. Die Untersuchung erfolgt in der Regel **unter einer Sedierung**, sodass Sie möglichst wenig davon spüren. Die Untersuchung dauert ungefähr eine Stunde. Nach der Untersuchung **bleiben Sie bei uns** zur Beobachtung. Sie sollten danach **nicht selbst Auto fahren** und zunächst nichts essen oder trinken, da **die Sedierung Ihren Schluckreflex beeinträchtigen** kann. Theoretisch können einige Komplikationen wie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, Blutungen, Infektionen der Gallenwege oder eine Verletzung der Darmwand (Perforation) auftreten, aber das ist sehr selten. *Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung.*

EEG (Elektroenzephalographie)

Bei der Elektroenzephalographie (EEG) handelt es sich um eine neurologische Untersuchung **zur Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Gehirns**.

Mit dieser Untersuchung können wir **die Gehirnfunktion beurteilen** und **verschiedene Erkrankungen des Gehirns**, beispielsweise **Epilepsie oder Schlafstörungen**, diagnostizieren.

Die Untersuchung ist schmerzfrei, nicht invasiv und strahlenfrei.

Sie dauert in der Regel etwa 30 Minuten.

Eine spezielle Vorbereitung ist normalerweise nicht erforderlich. Vor der Untersuchung sollten Sie jedoch **Schmuck und andere Metallgegenstände** ablegen.

Während der Untersuchung liegen Sie entspannt auf einer Liege und sollten möglichst ruhig bleiben.

Anschließend wird Ihnen **eine Kappe mit Elektroden auf den Kopf gesetzt**. **Die elektrischen Impulse des Gehirns** werden mithilfe der Elektroden abgeleitet, von einem Gerät gemessen **und in Form von Kurven aufgezeichnet**.

Nach der Untersuchung können wir **anhand der aufgezeichneten Hirnströme die Gehirnfunktion** beurteilen. Besondere Risiken oder Komplikationen bestehen in der Regel nicht.

EKG

Beim EKG handelt es sich um eine Untersuchung **zur Aufzeichnung** der **elektrischen Aktivität des Herzens**. Dabei können **Herzfrequenz und Herzrhythmus** beurteilt werden.

Die Untersuchung ist **schmerzfrei, strahlenfrei** und **nicht invasiv**.

Sie **dauert** etwa 5 Minuten.

Vor der Untersuchung sollten Sie den Oberkörper **freimachen** und **alle metallische Gegenstände** sowie **Schmuck** ablegen.

Während der Untersuchung **liegen Sie auf einer Liege** und Sie sollten möglichst ruhig bleiben.

Die **Elektroden(Metallplättchen)** werden auf Brustkorb, Arme und Beine **gelegt**. Die elektrischen Impulse werden mithilfe von Elektroden **abgeleitet**.

Und die Ergebnisse werden anschließend auf einem Monitor oder auf Papier dargestellt.

Belastungs-EKG

Beim Belastungs-EKG handelt es sich um eine Untersuchung **zur Aufzeichnung** der **elektrischen Aktivität des Herzens unter körperlicher Belastung**.

Dabei können **Herzfrequenz, Herzrhythmus und die Herzfunktion unter Belastung** beurteilt werden.

Die Untersuchung ist **schmerzfrei, strahlenfrei** und nicht invasiv.

Sie **dauert** etwa 20 Minuten.

Vor der Untersuchung sollten Sie **den Oberkörper freimachen** und **alle metallische Gegenstände** sowie **Schmuck** ablegen.

Zu Beginn wird ein Ruhe-EKG durchgeführt. Anschließend laufen Sie **auf einem Laufband** oder fahren auf einem **Fahrradergometer**. Dabei wird die **Belastung schrittweise gesteigert**.

Während der Untersuchung werden die elektrischen Impulse des Herzens mithilfe von **Elektroden abgeleitet**. Außerdem werden **Ihr Blutdruck und Ihr Herzrhythmus regelmäßig** kontrolliert.

Die Ergebnisse werden anschließend auf einem **Monitor oder auf Papier dargestellt**.

Wenn Sie **Brustschmerzen, Atemnot, Schwindel** oder **starke Müdigkeit** bekommen, sagen Sie uns bitte sofort Bescheid. Dann wird die Untersuchung gegebenenfalls abgebrochen.

Echokardiographie:

Bei der Echokardiographie handelt es sich um eine **Ultraschalluntersuchung des Herzens**.

Mit dieser Untersuchung können wir **die Struktur und Funktion des Herzens** sowie die **Herzklappen mittels Schallwellen** beurteilen.

Die Untersuchung ist **schmerzfrei** und **strahlenfrei**. Sie **dauert** nur 15-20 Minuten.

Während der Untersuchung wird **ein Gel auf die Haut aufgetragen**. Anschließend wird der Schallkopf auf den Brustkorb gesetzt und **über die Haut bewegt**. Das Gel kann sich etwas kalt anfühlen. Durch die Bewegung des Schallkopfes können wir das Herz aus **verschiedenen Winkeln** betrachten und seine Struktur sowie seine Funktion beurteilen. Die Bilder werden anschließend auf einem Monitor dargestellt.

Transösophageale Echokardiographie:

Bei der transösophagealen Echokardiographie (TEE) handelt es sich um eine Ultraschalluntersuchung des Herzens **über die Speiseröhre**.

Mit dieser Untersuchung können wir **die Struktur und Funktion des Herzens** sowie **die Herzklappen** besonders genau beurteilen.

Die Untersuchung ist schmerzfrei und strahlenfrei. Sie dauert nur wenige Minuten.

Vor der Untersuchung wird **Ihr Rachen örtlich betäubt**, damit Sie möglichst keine Beschwerden verspüren.

Anschließend wird ein **flexibler Schallkopf**, der am Ende eines **Schlauches** befestigt ist, **durch den Mund in die Speiseröhre** eingeführt. Durch die Bewegung des Schallkopfes können wir das Herz aus verschiedenen Richtungen betrachten und seine Struktur sowie seine Funktion beurteilen. Die Bilder werden anschließend auf einem Monitor dargestellt.

Duplexsonographie

Bei der Duplexsonographie handelt es sich um eine **farbkodierte Ultraschalluntersuchung** der **Blutgefäße** mithilfe von **Schallwellen**.

Mit dieser Untersuchung können wir **die Blutgefäße** und **den Blutfluss** sowie **Gefäßverengungen und Gefäßverschlüsse** beurteilen. *(Doppler: Mit dieser Untersuchung können wir **die Fließgeschwindigkeit** und **die Richtung des Blutflusses** beurteilen. Dadurch lassen sich Durchblutungsstörungen sowie Gefäßverengungen oder Gefäßverschlüsse erkennen.)*

Die Untersuchung ist **schmerzfrei** und **strahlenfrei**. Sie dauert nur wenige Minuten.

Während der Untersuchung wird **ein Gel auf die Haut** aufgetragen. Anschließend wird der Schallkopf auf die Haut **gesetzt** und **über die zu untersuchende Körperregion** bewegt. Das Gel kann sich etwas kalt anfühlen. Das Ultraschallgerät sendet Ultraschallwellen **über den Schallkopf** ins Gewebe.

Durch die Bewegung des Schallkopfes können wir die Blutgefäße **aus verschiedenen Winkeln** betrachten und den **Blutfluss** beurteilen.

Die Bilder werden anschließend auf einem Monitor dargestellt.

(CT-/MRT-)Angiographie (Vene → Kontrastmittel → CT/MRT-Aufnahmen)

Bei der CT- bzw. MRT-Angiographie handelt es sich um ein modernes, bildgebendes Verfahren zur **Darstellung** der **Blutgefäße** mithilfe **von Röntgenstrahlung** (CT) oder **eines Magnetfeldes** (MRT).

Mit dieser Untersuchung können wir die Blutgefäße beurteilen und **Verkalkungen, Verengungen** oder **Verschlüsse** feststellen.

Die Untersuchung **ist schmerzfrei** und nicht invasiv. Sie **dauert** in der Regel etwa 30 Minuten.

Je nach Untersuchung sollten Sie **einige Stunden(min 4) nüchtern** bleiben. Außerdem sollten Sie uns über Allergien gegen Kontrastmittel oder die Einnahme von gerinnungshemmenden Medikamenten informieren.

Während der Untersuchung wird Ihnen **über eine Vene ein Kontrastmittel** verabreicht. Danach werden **Bilder** gemacht, um **die Blutgefäße** beurteilen zu können.

Die Bilder werden anschließend auf einem Monitor dargestellt.

Katheterangiographie (Nadel → Draht → Katheter → Arterie → Kontrastmittel → Röntgenbilder)

Bei der Katheterangiographie handelt es sich **um ein invasives Verfahren** zur Darstellung der **Blutgefäße** mithilfe **von Röntgenstrahlung** und **Kontrastmittel**. Mit dieser Untersuchung können wir die Blutgefäße genau beurteilen und **Verengungen, Verschlüsse oder andere Veränderungen** erkennen.

Vor der Untersuchung sollten Sie **nüchtern** bleiben. Bitte informieren Sie uns über Allergien gegen Kontrastmittel oder Blutgerinnungsstörungen.

Zunächst wird die **Punktionsstelle desinfiziert** und **örtlich betäubt**, damit Sie **beim Einstich** keine Schmerzen verspüren. Danach wird ein **dünner Katheter über eine Schlagader in das Gefäßsystem** **eingeführt**. Anschließend wird Kontrastmittel über den Katheter gespritzt und eine Serie von Röntgenaufnahmen angefertigt.

Dadurch können wir **den Verlauf der Gefäße** darstellen und beurteilen.

Nach der Untersuchung bleiben Sie **einige Stunden zur Überwachung** bei uns. Die Punktionsstelle wird mit einem **Druckverband** versorgt.

Mögliche Komplikationen sind **Blutungen, Infektionen, allergische Reaktionen auf das Kontrastmittel** oder **Verletzungen** der Gefäße.

Herzkatheteruntersuchung (Koronarangiographie)

Bei der Herzkatheteruntersuchung handelt es sich um **eine invasive Untersuchung zur Beurteilung der Herzkranzgefäße**. Gleichzeitig können bestimmte Herzerkrankungen, wie zum Beispiel **Verengungen der Herzkranzgefäße**, **behandelt werden**. Mit dieser Untersuchung können wir **Durchblutungsstörungen** des Herzens sowie **Verengungen oder Verschlüsse der Herzkranzgefäße** feststellen.

Die Untersuchung **dauert** in der Regel etwa 30 Minuten bis 2 Stunden. Vor der Untersuchung sollten Sie **etwa vier Stunden nüchtern** bleiben. Außerdem **informieren Sie uns** bitte über Allergien gegen Kontrastmittel oder Blutgerinnungsstörungen.

Zunächst wird die **Einstichstelle, meistens an der Leiste oder am Handgelenk, desinfiziert und örtlich betäubt**, damit Sie keine Schmerzen verspüren. Anschließend wird **ein dünner Katheter über ein Blutgefäß bis zum Herzen** vorgeschoben. Mithilfe von Röntgenstrahlen und Kontrastmittel werden die Herzkranzgefäße auf einem Monitor dargestellt.

Falls wir eine relevante Verengung feststellen, kann diese **direkt behandelt** werden, zum Beispiel durch die **Aufdehnung mit einem Ballon** und die **Einlage eines Stents**. Dadurch kann der **Blutfluss verbessert** werden. Nach der Untersuchung wird die Einstichstelle kontrolliert und gegebenenfalls mit einem **Druckverband** versorgt.

Mögliche Komplikationen sind Blutungen, Herzrhythmusstörungen, allergische Reaktionen auf das Kontrastmittel, Gefäßverletzungen und in seltenen Fällen ein Herzinfarkt.

PTA: Das ist die Abkürzung für **perkutane transluminale Angioplastie**. Bei der PTA handelt es sich um ein minimalinvasives Verfahren **zur Erweiterung verengter Blutgefäße**. Dabei wird ein **Ballonkatheter über einen Zugang** in das Gefäß eingeführt und an der Engstelle aufgeblasen. Dadurch kann der **Blutfluss verbessert** werden. Bei Bedarf kann zusätzlich **ein Stent eingesetzt** werden.

PTCA: Bei der PTCA handelt es sich um ein Verfahren **zur Aufdehnung verengter Herzkranzgefäße**. Dabei wird ein **Ballonkatheter über einen Herzkatheter bis zur Engstelle vorgeschoben und aufgeblasen**. Dadurch wird der **Blutfluss verbessert**. Häufig wird zusätzlich **ein Stent eingesetzt**.

Bronchoskopie (Lungenspiegelung)

Bei der Bronchoskopie, **auch Lungenspiegelung** genannt, untersuchen wir **die Atemwege** mit einer kleinen **Kamera**.

Dafür **führen** wir einen **dünnen, flexiblen Schlauch** (Bronchoskop) **über die Nase** oder **den Mund** in die **Lufttröhre** und **weiter in die tiefen Atemwege ein**.

So können wir die **Schleimhaut der Atemwege** genau beurteilen und bei Bedarf **Gewebeproben entnehmen**, die anschließend im Labor histologisch untersucht werden.

Vor der Untersuchung sollten Sie **etwa 12 Stunden nüchtern** bleiben, damit während der Untersuchung keine Mageninhalte in die Atemwege gelangen.

Die Untersuchung erfolgt in der Regel unter einer Sedierung, sodass Sie möglichst wenig davon spüren. Während der Untersuchung können Sie normal atmen, aber nicht sprechen. Die Untersuchung dauert ungefähr 30 Minuten. Nach der Untersuchung sollten **Sie nicht selbst Auto fahren**, wenn Sie eine Sedierung erhalten haben. Mögliche Komplikationen sind selten, können aber Blutungen, Infektionen oder Verletzungen der Schleimhaut umfassen.

Spirometrie (Lungenfunktionstest)

Bei der Spirometrie, auch Lungenfunktionstest genannt, handelt es sich um eine **Untersuchung zur Beurteilung der Funktion der Lunge und der Atemwege**.

Mit dieser Untersuchung können wir **das Lungenvolumen, den Luftstrom** sowie **die Lungenfunktion** beurteilen.

Die Untersuchung ist schmerzfrei, nicht invasiv und dauert in der Regel **etwa fünf bis zehn Minuten**.

Eine spezielle Vorbereitung ist normalerweise nicht erforderlich.

Während der Untersuchung **sitzen Sie aufrecht**. Zunächst wird Ihre Nase **mit einer Nasenklemme** verschlossen.

Anschließend atmen Sie **nach Anweisung durch ein Mundstück**, das mit einem **Messgerät**, dem Spirometer, verbunden ist. Dabei werden die ruhige Atmung, die **maximale Ein- und Ausatmung** sowie die **forcierte Ausatmung** gemessen.

Die **Messergebnisse** werden auf einem Bildschirm dargestellt und anschließend **ausgewertet**.

Besondere Risiken oder Komplikationen bestehen in der Regel nicht.

Nasen-Rachen-Abstrich

Bei dem Nasen-Rachen-Abstrich handelt es sich um eine Untersuchung **zur Entnahme einer Probe aus der Nasen- und Rachenschleimhaut**.

Mit dieser Untersuchung können wir **Krankheitserreger nachweisen**.

Die Untersuchung dauert nur wenige Minuten und ist in der Regel **schmerzarm**.

Eine spezielle Vorbereitung ist nicht erforderlich.

Während der Untersuchung sollten Sie den Kopf **leicht nach hinten neigen** und möglichst ruhig bleiben.

Anschließend führe ich **einen sterilen Tupfer** vorsichtig **durch die Nase bis in den Nasen-Rachen-Raum** ein und **entnehme die Probe durch leichte Drehbewegungen**.

Die Probe wird anschließend ins Labor geschickt und dort weiter untersucht.

Besondere Risiken oder Komplikationen bestehen in der Regel nicht.

Die Sputumkultur

Bei dieser Untersuchung wird **Ihr Auswurf** im Labor untersucht, um **mögliche Lungenerkrankungen** festzustellen. Es gibt keine besondere Vorbereitung. Sie **bekommen ein steriles Röhrchen(einen Becher)**.

Zuerst **spülen** Sie Ihren Mund **mit Wasser** aus. Danach **husten** Sie den Auswurf **ab** und geben ihn in das Röhrchen. Die Probe wird anschließend im Labor untersucht.

Pulsoxymetrie

Bei der Pulsoxymetrie handelt es sich um ein nicht-invasives Verfahren zur **Messung der Sauerstoffsättigung** und **der Herzfrequenz**. Die Untersuchung ist schmerzfrei und dauert nur wenige Minuten.

Eine spezielle Vorbereitung ist nicht erforderlich. Während der Untersuchung wird **ein kleiner Sensor an Ihrem Finger befestigt**. Das Gerät misst **mithilfe von Licht** die **Sauerstoffsättigung und den Puls**.

Blutgasanalyse (BGA)

Die Blutgasanalyse ist eine Blutuntersuchung **zur Bestimmung des Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalts** sowie **des Säure-Basen-Haushalts**.

Die Untersuchung dauert etwa drei bis fünf Minuten.

Eine spezielle Vorbereitung ist normalerweise nicht erforderlich.

Während der Untersuchung entnehme ich **mit einer Nadel etwas Blut aus einer Arterie**.

Anschließend wird die **Einstichstelle mit einem Tupfer kurz abgedrückt** und mit einem **Pflaster** versorgt.

Die Blutprobe wird anschließend im Labor untersucht.

Blutentnahme

Bei der Blutentnahme handelt es sich um eine Untersuchung **zur Bestimmung verschiedener Blutwerte**. Die Untersuchung dauert etwa drei bis fünf Minuten.

Je nach Untersuchung sollten Sie nüchtern bleiben.

Zunächst wird die Haut an der Einstichstelle gründlich **desinfiziert**. Während der Untersuchung entnehme ich **mit einer Nadel etwas Blut aus einer Vene**.

Anschließend wird die **Einstichstelle mit einem Tupfer kurz abgedrückt** und mit einem **Pflaster** versorgt. Die Blutprobe wird anschließend im Labor untersucht.

Gipsverband

Bei einem Gipsverband handelt es sich um eine konservative Behandlung **zur Ruhigstellung eines gebrochenen Knochens**.

Der Gips dient dazu, den betroffenen Knochen **zu stabilisieren**, damit er **in Ruhe heilen** kann.

Für die Anlage des Gipsverbandes werden **feuchte Gipsbinden um die betroffene Stelle gewickelt** und **anschließend ausgehärtet**.

Nach der Anlage sollten Sie die betroffene Extremität **etwa 30 Minuten** nicht bewegen, damit der Gips vollständig **stabil und trocken** wird.

Falls Ihre Finger oder Zehen blau, weiß, kalt werden, stark anschwellen, kribbeln oder nicht mehr bewegt werden können, sollten Sie sich sofort bei uns melden.

Um das Risiko einer Thrombose zu verringern, kann gegebenenfalls eine **Blutverdünnung** notwendig sein, bis Sie die betroffene Extremität wieder vollständig bewegen können.

Wundversorgung

Zuerst **schaue** ich mir die Wunde genau **an** und **reinige** sie. Danach **desinfiziere** ich die Wunde, um das **Risiko einer Infektion zu verringern**.

Je nach Größe und Tiefe der Wunde kann es sein, dass die Wunde **genäht** werden muss. Wenn das nicht notwendig ist, wird die Wunde mit **einem passenden Verband** abgedeckt.

Es kann dabei kurz etwas brennen oder unangenehm sein, aber normalerweise sind keine starken Schmerzen zu erwarten.

Nach der Versorgung sollten Sie den Verband **sauber und trocken halten**.

Falls die Wunde stärker schmerzt, gerötet oder geschwollen wird oder Sie Fieber bekommen, sollten Sie sich wieder bei uns melden.

Lumbalpunktion

Bei der Lumbalpunktion handelt es sich um eine Untersuchung, bei der **eine kleine Menge Nervenwasser (Liquor) aus dem Rückenmarkskanal entnommen** wird.

Mit dieser Untersuchung können wir **den Liquor** im Labor untersuchen und bestimmte Erkrankungen des Nervensystems feststellen. Die Untersuchung dauert etwa 30 Minuten.

Während der Untersuchung liegen Sie meistens **in Seitenlage** oder **sitzen nach vorne gebeugt**.

Zuerst wird die **Einstichstelle desinfiziert** und Sie bekommen eine **örtliche Betäubung**, damit Sie möglichst wenig Schmerzen spüren.

Anschließend führe ich **eine dünne Nadel zwischen zwei Lendenwirbeln in den Rückenmarkskanal** ein und **entnehme** eine kleine Menge Nervenwasser.

Mögliche Nebenwirkungen sind **Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ein Bluterguss** oder selten eine **Infektion**.

Die Untersuchung kann nicht durchgeführt werden, wenn beispielsweise **ein erhöhter Hirndruck** oder eine **schwere Gerinnungsstörung** vorliegt.

DRU

Bei der DRU (digital-rektalen Untersuchung) untersuchen wir den Enddarm und die Prostata **mit dem Finger**. Dabei **erhalten** wir mit dem Finger **wichtige Informationen über Veränderungen im Bereich des Mastdarms und der Prostata**.

Die Untersuchung kann als **unangenehm empfunden** werden, ist aber **in der Regel schmerzlos und dauert** nur wenige Minuten. Sie liegen entweder auf der Seite mit angezogenen Beinen oder knien auf der Untersuchungsfläche. Der Untersucher trägt einen **Einmalhandschuh** und **führt den Finger mit Gleitgel vorsichtig über den After in den Enddarm ein**.

Urinstatus (U-Status)

Beim Urinstatus handelt es sich um eine Urinuntersuchung zur Beurteilung der Nieren- und Harnwegsfunktion. Mit dieser Untersuchung können wir unter anderem Harnwegsinfektionen, Blutungen sowie Erkrankungen der Nieren oder der Leber feststellen.

Es gibt keine besondere Vorbereitung. Vor der Urinabgabe sollten Sie den Genitalbereich mit Wasser reinigen.

Zuerst lassen Sie die erste Portion des Urins in die Toilette. Anschließend geben Sie den Mittelstrahlurin in den bereitgestellten Becher. Danach wird die Urinprobe im Labor untersucht.

Dabei werden unter anderem Farbe, Konzentration und Zusammensetzung des Urins sowie Bakterien oder andere Auffälligkeiten beurteilt.

Urinkultur

Bei der Urinkultur handelt es sich um eine Untersuchung des Urins zum Nachweis von Bakterien oder Pilzen. Mit dieser Untersuchung können wir einen Harnwegsinfekt bestätigen und das geeignete Antibiotikum bestimmen.

Die Urinprobe wird im Labor auf einen speziellen Nährboden gegeben. Anschließend wird sie ein bis zwei Tage bebrütet. Falls Bakterien oder Pilze vorhanden sind, können sie wachsen und anschließend bestimmt werden.

Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL)

Bei der extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie, kurz ESWL, handelt es sich um ein nicht-invasives Verfahren zur Behandlung von Nieren- und Harnleitersteinen mithilfe von Stoßwellen.

Mit dieser Behandlung können Nieren- oder Harnleitersteine zertrümmert werden.

Vor der Behandlung sollten Sie mindestens vier Stunden nüchtern bleiben. Außerdem erhalten Sie Schmerzmittel und gegebenenfalls ein Beruhigungsmittel.

Zuerst bestimmen wir die Lage des Steins mithilfe einer Ultraschalluntersuchung. Anschließend werden Stoßwellen gezielt auf den Stein gerichtet. Dadurch wird der Stein in kleine Stücke zertrümmert. Die Steinfragmente können anschließend mit dem Urin ausgeschieden werden.

Die Behandlung dauert in der Regel etwa eine Stunde.

Mögliche Komplikationen sind Schmerzen in der Flanke, Blut im Urin oder Fieber. Diese Komplikationen treten jedoch nur selten auf.

Feinnadelbiopsie (FNP)

Bei der Feinnadelpunktion handelt es sich um ein Verfahren zur Entnahme einer Zellprobe aus der Schilddrüse. Mit dieser Untersuchung können wir Veränderungen der Schilddrüse beurteilen.

Es gibt keine besondere Vorbereitung. Falls Sie blutverdünnende Medikamente einnehmen, informieren Sie uns bitte vorher.

Zuerst wird die Haut an der Punktionsstelle desinfiziert. Anschließend wird unter Ultraschallkontrolle eine dünne Nadel in die Schilddrüse eingeführt. Über die Nadel wird eine kleine Zellprobe entnommen.

Zum Schluss wird die Punktionsstelle mit einem Pflaster versorgt.

Die Untersuchung dauert nur wenige Minuten und ist kaum schmerzhaft.

Mögliche Komplikationen sind Blutungen, Infektionen oder ein Bluterguss. Diese treten jedoch selten auf.

Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung)

Bei der Cholezystektomie handelt es sich um die operative Entfernung der Gallenblase.

Die Operation wird meistens laparoskopisch durchgeführt. Eine offene Operation ist heutzutage nur noch selten erforderlich.

Vor der Operation sollten Sie etwa acht Stunden nüchtern bleiben. Die Operation erfolgt unter Vollnarkose, sodass Sie während des Eingriffs schlafen.

Zunächst wird die Operationsstelle desinfiziert. Danach werden kleine Hautschnitte am Bauchnabel und an weiteren Stellen gemacht, um eine Kamera und die Operationsinstrumente einzuführen.

Anschließend wird die Gallenblase entfernt und die Wunden werden verschlossen.

Die Operation dauert ungefähr eine Stunde. Danach bleiben Sie in der Regel drei bis fünf Tage zur Beobachtung im Krankenhaus.

Mögliche Komplikationen sind Blutungen, Verletzungen von umliegendem Gewebe oder Infektionen. Diese treten jedoch selten auf.

Appendektomie (Wurmfortsatzentfernung)

Bei der Appendektomie handelt es sich um die operative Entfernung des Wurmfortsatzes.

Die Operation wird meistens laparoskopisch durchgeführt. Eine offene Operation ist heutzutage nur noch selten erforderlich.

Vor der Operation sollten Sie etwa acht Stunden nüchtern bleiben. Die Operation erfolgt unter Vollnarkose, sodass Sie während des Eingriffs schlafen.

Zunächst wird die Operationsstelle desinfiziert. Danach werden kleine Hautschnitte am Bauchnabel und an weiteren Stellen gemacht, um eine Kamera und die Operationsinstrumente einzuführen.

Anschließend wird der Wurmfortsatz entfernt und die Wunden werden verschlossen.

Die Operation dauert ungefähr eine Stunde. Danach bleiben Sie in der Regel drei bis fünf Tage zur Beobachtung im Krankenhaus.

Mögliche Komplikationen sind Blutungen, Verletzungen von umliegendem Gewebe oder Infektionen. Diese treten jedoch selten auf.

Chemotherapie

Bei der Chemotherapie handelt es sich um eine medikamentöse Behandlung von Krebserkrankungen. Die Medikamente sollen die Krebszellen zerstören oder ihr Wachstum hemmen.

Mögliche Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall und eine erhöhte Infektanfälligkeit.

Strahlentherapie

Bei der Strahlentherapie handelt es sich um eine Behandlung von Krebserkrankungen mithilfe hochenergetischer Strahlen. Die Strahlen sollen die Krebszellen zerstören oder ihr Wachstum hemmen.

Mögliche Nebenwirkungen sind Hautreizungen, Müdigkeit und Beschwerden im bestrahlten Bereich.