ANNEXE A : modèle du formulaire de demande Formulaire de demande de remboursement de la spécialité EZETROL (§ 3000200 du chapitre IV de l'AR du 21 décembre 2001)
I - Identification du bénéficiaire (nom, prénom, n° d'affiliation)
II - Eléments à attester par le médecin traitant
Je soussigné, docteur en médecine, certifie que le patient mentionné ci-dessus remplit les conditions figurant au § 3000200 pour obtenir un remboursement de la spécialité EZETROL
a) Conditions relatives à la situation du patient :
□ <sup>(1.)</sup> Traitement en monothérapie d'une hypercholestérolémie primaire :
En effet, le patient remplit les deux conditions nécessaires pour obtenir le remboursement de ce traitement en monothérapie :
D'une part,
Soit, il présente une hypercholestérolémie primaire (cholestérol sérique supérieur ou égal à 190 mg/dl, ou LDL-cholestérol supérieur ou égal à 115 mg/dl, mesuré à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) et, simultanément, se trouve dans la situation à risque suivante:
(1.1.) le calcul du risque cardiovasculaire absolu individuel chez le patient donne actuellement (ou a, ou aurait donné, à une date déterminée(*)) un résultat égal ou supérieur à 5 % à 10 ans, ce risque étant calculé sur base du modèle SCORE adapté à la situation belge (Rev Med Liege 2005 ; 60 : 3 : 163-172) en tenant compte de l'âge, du sexe, du taux de cholestérol sérique, de la pression artérielle systolique et du tabagisme.
(*) dans le cas où la prise d'un traitement avec un médicament hypolipidémiant a actuellement entraîné une amélioration de son profil de risque.
(2.) Soit, il présente une hypercholestérolémie primaire (cholestérol sérique supérieur ou égal à 175 mg/dl, ou LDL-cholestérol supérieur ou égal à 100 mg/dl, mesuré à jeun, à au moins deux reprises avec 1 à 8 semaines d'intervalle, en état stable, sous régime approprié) et, simultanément, se trouve dans une des deux situations à risque suivante :
[ (2.1.1.) soit coronaire: infarctus, angor objectivé, syndrome coronarien aigu, pontage aorto-coronaire, angioplastie coronaire;
(2.1.2.) soit cérébrale: accident vasculaire cérébral thrombotique, accident ischémique transitoire documenté
(2.1.3.) soit périphérique: claudication intermittente documentée
□ <sup>(2.2.)</sup> Diabète type 2 si le patient est âgé de plus de 40 ans ;
□ (2.3.) Diabète type 1 si présence de microalbuminurie
D'autre part, il présente une intolérance ou une contre-indication aux statines.
(3.) Traitement en bi-thérapie dans laquelle l'ézétimibe est ajoutée à un traitement préalable avec une statine:

En effet, le patient a déjà reçu le remboursement d'une statine en catégorie B conformément aux conditions du paragraphe relatif à cette statine. Malgré un traitement d'au moins 3 mois avec cette statine, utilisée en monothérapie à la dose la plus efficace et en même temps la mieux tolérée pour ce patient, le taux de cholestérol total reste supérieur à 190 mg/dl ou le cholestérol LDL supérieur à 115 mg/dl (respectivement 175 mg/dl et 100 mg/dl en cas d'antécédent d'au moins une atteinte artérielle ou de diabète. Je dispose d'un avis préalable d'un médecin spécialiste en médecine interne, en cardiologie, ou en pédiatrie (si le patient est âgé de moins de 18 ans), qui confirme la nécessité de cette bi-thérapie.

## b) Conditions relatives à la prescription de la spécialité EZETROL chez ce patient :

Je m'engage à tenir compte, lors de la prescription de la spécialité EZETROL chez ce patient, d'une posologie maximale remboursable limitée à la dose maximale journalière définie dans la notice officielle, et à vérifier l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique qui sera notifié dans son dossier médical.

Je tiens a la disposition du medecin conseil les elements de preuve confirmant les elements attestes ci-dessus.
III - Identification du médecin traitant (nom, prénom, adresse, n° INAMI)
(nom)
1 - [ ]   ] - [ ] - [ ] (n° INAMI)
/

(cachet)

Je m'engage également à tenir compte du non remboursement de l'ézétimibe simultanément avec celui d'un autre hypolipidémiant (statine, fibrate, ou dérivé de l'acide nicotinique), sauf dans la situation visée au point a) 3. du § 3000200 du chapitre IV de l'AR du 21 décembre

2001.

(signature du médecin)