

Formulaire destiné au pharmacien hospitalier préalablement à la facturation de la spécialité MABTHERA prescrite pour l'induction de la rémission d'une granulomatose avec polyangéite (GPA, maladie de Wegener) sévère active ou d'une polyangéite microscopique (PAM) sévère active (§ 6940000 du chapitre IV de l'A.R. du 21 décembre 2001).

\_\_\_\_\_

Je soussigné,

- ▣ spécialiste en médecine interne,
- ▣ spécialiste en rhumatologie,
- ▣ spécialiste en néphrologie
- ▣ spécialiste en pneumologie,

Il s'agit d'une:

- 1) Induction de la rémission d'une granulomatose avec polyangéite sévère active
  - 1.1) Rechute après rémission par un traitement d'induction standard à base de cyclophosphamide
    - Score BVAS/WG score à l'initiation du traitement: □□□□□□□□□□
  - 1.2) Réfractaire au traitement d'induction standard à base de cyclophosphamide
    - Score BVAS/WG score à l'initiation du traitement: □□□□□□□□□□
    - Dose cumulative de cyclophosphamide: □□□□□□□□□□
  - 1.3) Contre-indication pour l'utilisation de cyclophosphamide
    - Score BVAS/WG score à l'initiation du traitement: □□□□□□□□□□
    - Hypersensibilité connue au cyclophosphamide ou à un de ses composants;
    - Dépression médullaire sévère;
    - Troubles hépatiques ou rénaux graves;
    - Infections aiguës du tractus urinaire et présence de cystite hémorragique;
    - Obstruction urinaire;
    - Inflammation de la vessie;
    - Infections actives;
    - Grossesse ou allaitement
    - Femme avec désir actif d'enfants

- Version valable à partir du 01.05.2014

- ☐ Dépression médullaire sévère;
- ☐ Troubles hépatiques ou rénaux graves;
- ☐ Infections aiguës du tractus urinaire et présence de cystite hémorragique;
- ☐ Obstruction urinaire;
- ☐ Inflammation de la vessie;
- ☐ Infections actives;
- ☐ Grossesse ou allaitement
- ☐ Femme avec désir actif d'enfants

Je tiens à la disposition du médecin-conseil un rapport médical décrivant chronologiquement l'évolution ancienne et récente de l'affection. Sur base des éléments mentionnés ci-dessus, j'atteste que pour ce patient le remboursement de la spécialité Mabthera est nécessaire, tenant compte d'une posologie maximale de 375 mg/m<sup>2</sup> par administration, pour un total de 4 administrations.


**III – Identification du médecin spécialiste en médecine interne, en rhumatologie, en néphrologie ou en pneumologie (nom, prénom, adresse, N°INAMI), mentionné ci-dessus au point II :**

(nom)

(prénom)

1  -       -   -     (n° INAMI)

/   /     (date)



(cachet)

.....

(signature du médecin )