(a) Schwarzschild radius vs temperature

r_s/a

10^0

10^{-1}

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

$\beta_0 t_0$

Full $V_0 = 0.001$ (45 pts)
Proxy $V_0 = 0.001$
Full $V_0 = 0.005$ (18 pts)
Proxy $V_0 = 0.005$
Corrected G, $V_0 = 0.001$
Corrected G, $V_0 = 0.005$

(b) Entanglement coefficients α_{cut}, α_S

α (nats per mode)

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

$\beta_0 t_0$

α_{cut} (bipartition)
α_S (bond)

(c) Potential profiles, $V_0 = 0.001$

$\Phi(r)/c_*^2$

0.00 −0.02 −0.04 −0.06 −0.08

0 10 20 30 40 50 60 70 80

r/a

$\beta_0 t_0 = 0.1$
$\beta_0 t_0 = 0.5$
$\beta_0 t_0 = 1.0$
$\beta_0 t_0 = 1.5$
$\beta_0 t_0 = 2.0$
$\beta_0 t_0 = 2.5$
proxy

(d) BC-corrected $1/r$ test (no Yukawa)

$GM_{\mathrm{est}}(r)$

0.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

r/a

$\beta_0 t_0 = 0.1$
$\beta_0 t_0 = 0.5$
$\beta_0 t_0 = 1.0$
$\beta_0 t_0 = 1.5$
$\beta_0 t_0 = 2.0$
$\beta_0 t_0 = 2.5$
proxy