

ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD DE ZUNG

William Zung

Luffi



Adaptación Luis Astocondor

I. DATOS GENERALES

Nombre del Instrumento	: Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung (EAA)
Autor	: William Zung
Año	: 1965
Objetivo	: Identificar los niveles de ansiedad, buscar un estimado de la ansiedad como un trastorno emocional y medir cuantitativamente la intensidad al margen de la causa.
Dirigido a	: Adolescentes y adultos
Adaptado por	: Luis Astocondor (2001)

II. ASPECTOS TEORICOS

No se encuentran datos disponibles.

III. CRITERIOS DE CONSTRUCCION

Tanto en la construcción de la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad como en la Escala de Autoevaluación de la Depresión, Zung tomó en cuenta ciertas precauciones necesarias a la confección de tests psicológicos. Al examinado le es imposible falsificar tendencias en sus respuestas porque la mitad de los ítems están expresados en sentido positivo y otros en sentido negativo respecto a la ansiedad, lo cual evita que la persona descubra pautas a seguir y responda de manera automática.

IV. DESCRIPCION GENERAL

La Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung (EAA) comprende un cuestionario de 20 ítems o relatos, cada uno referido a manifestaciones características de ansiedad, como síntomas o signos. El conjunto abarca una amplia variedad de síntomas de ansiedad como expresión de trastornos emocionales.

Las palabras utilizadas en el cuestionario de la escala han sido escogidas para hacerlas más accesibles a la mayoría de las personas, empleando su propio lenguaje. En algunos casos, las personas pueden hacer preguntas relacionadas con el criterio a que se debe sujetar el procedimiento de marcar determinada información. Las preguntas generalmente indican el deseo de cooperación con el profesional de la salud (médico, psicólogo) y deben ser respondidas de tal manera que induzcan a la persona a dar las respuestas más acordes a su realidad personal.

En el formato del cuestionario, hay 4 columnas en blanco encabezadas por "Nunca o casi nunca", "A veces", "Con bastante frecuencia" y "Siempre o casi siempre" (Ver Apéndice A).

Se le da a la persona la lista de frases y se le pide que coloque una marca en el recuadro que considere más aplicable a su caso, de acuerdo a cómo se ha sentido la última semana.

Los ítems tienen dirección positiva o negativa, por ejemplo, la primera frase “Me siento más intranquilo y nervioso que de costumbre” tiene un sentido positivo, mientras que la frase “Me siento tranquilo y me es fácil estar me quieto”, tiene un sentido negativo, pues describe la sensación opuesta a la que tienen la mayoría de las personas ansiosas, que es intranquilidad y dificultad para estarse quieto.

Los ítems que evalúan una dirección positiva son:

- Me siento más nervioso(a) y ansioso(a) que de costumbre (Ítem 1)
- Me siento con temor sin razón (Ítem 2)
- Despierto con facilidad o siento pánico (Ítem 3)
- Me siento como si fuera a reventar y partirme en pedazos (Ítem 4)
- Me tiemblan los brazos y las piernas (Ítem 6)
- Me mortifican dolores de cabeza, cuello o cintura (Ítem 7)
- Me siento débil y me canso fácilmente (Ítem 8)
- Puedo sentir que me late muy rápido el corazón (Ítem 10)
- Sufro de mareos (Ítem 11)
- Sufro de desmayos o siento que me voy a desmayar (Ítem 12)
- Se me adormecen o hinchán los dedos de las manos y pies (Ítem 14)
- Sufro de molestias estomacales o indigestión (Ítem 15)
- Orino con mucha frecuencia (Ítem 16)
- Siento bochornos (Ítem 18)
- Tengo pesadillas (Ítem 20)

Los ítems que evalúan una dirección negativa son:

- Siento que todo está bien y que nada malo puede sucederme (Ítem 5)
- Me siento tranquilo y puedo permanecer en calma fácilmente (Ítem 9)
- Puedo inspirar y expirar fácilmente (Ítem 13)
- Generalmente mis manos están secas y calientes (Ítem 17)
- Me quedo dormido(a) con facilidad y descanso bien durante la noche (Ítem 19)

En la tabla 1 se presenta un resumen de los ítems y la dirección que asumen:

Tabla 1
Dirección de los Ítems de la EAA

Dirección Positiva	Dirección Negativa
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 y 20	5,9, 13, 17 y 19
15 ítems	05 ítems

Además en el formato de la EAA se usa un número par y no impar de respuestas posibles para que la persona no pueda marcar la columna central para dar la impresión de que pertenece al término medio.

Los resultados obtenidos de varios estudios han demostrado que en casi todos los desórdenes psiquiátricos hay un cierto grado de ansiedad concomitante.

Personas con diferentes diagnósticos primarios tales como la enfermedad coronaria, lumbago o depresión, con frecuencia conllevan el diagnóstico adicional de ansiedad, lo cual significa que un diagnóstico primario que no sea el de ansiedad no elimina la concomitancia de sintomatología ansiosa que requiere el tratamiento de esta condición agregada. (Ejemplo: enfermedad coronaria y ansiedad, depresión y ansiedad, entre otros).

Los ítems están concebidos en términos que se asimilan al lenguaje común de las personas ansiosas. No obstante, su significado se identifica con la terminología médica convencional que define los síntomas de ansiedad. Los síntomas de trastornos ansiosos que comprende la Escala se presentan en la tabla 2.

Tabla 2

Trastornos ansiosos que mide la EAA

Afectivos	Somáticos
Desintegración mental Aprehensión Ansiedad Miedo	Temblores Dolores y molestias corporales Tendencia a la fatiga y debilidad Intranquilidad Palpitaciones Mareos Desmayos Transpiración Parestesias Náuseas y vómitos Frecuencia urinaria Bochornos Insomnio Pesadillas

Para obtener la medida de la EAA se hace en base a la calificación que seguidamente presentamos en la tabla 3.

Tabla 3
Calificación de la EAA

Ítems	Nunca o raras veces	Algunas veces	Buen número de veces	La mayoría de las veces
1	1	2	3	4
2	1	2	3	4
3	1	2	3	4
4	1	2	3	4
5	4	3	2	1
6	1	2	3	4
7	1	2	3	4
8	1	2	3	4
9	4	3	2	1
10	1	2	3	4
11	1	2	3	4
12	1	2	3	4
13	4	3	2	1
14	1	2	3	4
15	1	2	3	4
16	1	2	3	4
17	4	3	2	1
18	1	2	3	4
19	4	3	2	1
20	1	2	3	4

Posteriormentese anota el valor individual de cada información en el margen derecho de la tabla, sumándose dichos valores para obtener un total, el cual es convertido en un “índice de ansiedad” en base a la siguiente ecuación:

$$\frac{\text{Total}}{\text{Promedio máximo de 80}} \times 100 = \text{Índice de ansiedad}$$

La escala es estructurada en tal forma que un índice bajo indica la inexistencia de ansiedad y un índice elevado, ansiedad clínicamente significativa.

El índice de la Escala orienta sobre “cual es el grado de ansiedad de la persona”, en términos de una definición operacional, expresada en porcentaje s. En el Apéndice B se pueden apreciar los índices obtenidos según niveles.

Mediante la combinación de los resultados obtenidos en numerosos estudios, el índice de la EAA ha sido interpretado tal y como se puede apreciar en la tabla 4.

Tabla 4
Índice EAA - Impresión de Equivalencia Clínica

Índice EAA	Equivalencia Clínica
Menos de 45	Dentro de límites normales. No hay ansiedad presente.
45 – 59	Presencia de ansiedad mínima moderada.
60 – 74	Presencia de ansiedad marcada a severa.
75 a más	Presencia de ansiedad en grado máximo.

V. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA VERSION ORIGINAL

VALIDEZ

Zung en 1965 valida las escalas, tanto de la Autoevaluación de la Ansiedad como de la Autoevaluación de la Depresión, aplicándolas en primer lugar a un grupo de pacientes de consultorios externos en el Duke Psychiatry Hospital con diagnósticos de depresión, ansiedad y otros desórdenes de la personalidad. Los diagnósticos fueron establecidos separadamente por otros clínicos obteniendo puntuaciones con escalas psicométricas estándar antes de la aplicación de ambas escalas. En todos los pacientes se encontró una alta correlación entre las puntuaciones obtenidas y las recogidas con otras pruebas, se encontró asimismo diferencias significativas en relación con la edad, nivel educacional e ingresos económicos (Citado por Astocondor, 2001).

En 1968, se realizó la validación transcultural aplicando las escalas en Japón, Inglaterra, Checoslovaquia, Australia, Alemania y Suiza. Las autoevaluaciones en dichos países eran comparables, encontrando que existen diferencias entre un grupo de pacientes con diagnóstico de ansiedad aparente y pacientes ansiosos. En este mismo trabajo Zung delimita sus niveles de cuantificación de la ansiedad (Citado por Astocondor, 2001) como se presenta en la tabla 5.

Tabla 5
Índice e Interpretación Global original de la EAA de Zung

Índice EAA	Interpretación Global
Menos de 50	Dentro de los límites normales
50 – 59	Leve a moderada
60 – 69	Moderada a intensa
70 a más	Intensa

Zung afirma que la ansiedad es relativamente independiente de los factores de edad, educación y situación social, a la vez que plantea las siguientes conclusiones:

- Generalmente los pacientes hospitalizados están más deprimidos que los pacientes externos por lo que sus índices son mayores.
- Los pacientes pueden tener varios diagnósticos, al mismo tiempo pueden presentar ansiedad y depresión simultáneamente. Por lo tanto un diagnóstico inicial de ansiedad no elimina la posibilidad de que esté deprimido.
- Los índices de las personas normales tienden a ser mayores en los de más edad y en los más jóvenes, pero en su promedio siempre es menor de 50 (Citado por Astocondor, 2001).

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD EN NUESTRO PAIS

En nuestro país, Astocondor (2001), como parte de su tesis titulada “Estudio Exploratorio sobre ansiedad y depresión en un grupo de pobladores de comunidades nativas Aguarunas”, realizó la adaptación y validez de la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung y de la Escala de Autoevaluación de la Depresión de Zung en una muestra de 100 pobladores de ambos sexos, de 14 a 30 años, de siete comunidades nativas aguarunas del departamento de Amazonas.

A continuación presentamos sus hallazgos referidos a la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung:

VALIDEZ

La EAA fue revisada y adaptada convenientemente al nivel sociocultural y educativo de los habitantes de las comunidades nativas aguarunas (Ver Apéndice C), habiéndose realizado previamente un estudio piloto, con las consiguientes modificaciones sugeridas que fueron aprobadas por un jurado calificador, el cual estuvo integrado por 10 especialistas en el área clínica, social y comunitaria.

Se utilizó el método de validez interna por criterio de jueces, a través del Coeficiente V de Aiken. El resultado obtenido de este proceso se aprecia en la tabla 6.

Tabla 6
Validez de la versión adaptada de la EAA de Zung

Areas Medidas	Item	V*
Intranquilidad	1	0,9
Angustia	3	0,8
Molestias y dolores musculares	7	0,8
Palpitaciones	10	1
Disnea	13	1
Náuseas y vómitos	15	0,9
Frecuencia Urinaria	16	0,8
Rubor facial	18	1
Pesadillas	20	1

Fuente: Astocondor (2001)

Leyenda:

V : Coeficiente V de Aiken

* : Significancia al ,05

Como se puede visualizar la totalidad de los ítems adaptados obtuvieron un alto nivel de validez.

CONFIABILIDAD

Para hallar la confiabilidad se utilizó Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados tal y como se puede observar en la tabla 7.

Tabla 7
Consistencia interna de la EAA

Participantes	Alpha de Cronbach
Varones	0,7750
Mujeres	0,6714
Total	0,7850

Fuente: Astocondor (2001)

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Astocondor, L. (2001). *Estudio Exploratorio sobre Ansiedad y Depresión en un grupo de pobladores de comunidades nativas aguarunas*. Tesis de licenciatura no publicada, Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú.

VII. APENDICES

APENDICE A PROTOCOLO DEL INSTRUMENTO ORIGINAL

Instrucciones

Marque con una X en el espacio correspondiente según como usted se haya sentido durante la última semana.

No.	Items	Nunca o casi nunca	A veces	Con bastante frecuencia	Siempre o casi siempre
1	Me siento más nervioso(a) y ansioso(a) que de costumbre.				
2	Me siento con temor sin razón.				
3	Despierto con facilidad o siento pánico.				
4	Me siento como si fuera a reventar y partirme en pedazos.				
5	Siento que todo está bien y que nada malo puede sucederme.				
6	Me tiemblan los brazos y las piernas.				
7	Me mortifican dolores de cabeza, cuello o cintura.				
8	Me siento débil y me canso fácilmente.				
9	Me siento tranquilo(a) y puedo permanecer en calma fácilmente.				
10	Puedo sentir que me late muy rápido el corazón.				
11	Sufro de mareos.				
12	Sufro de desmayos o siento que me voy a desmayar.				
13	Puedo inspirar y expirar fácilmente.				
14	Se me adormecen o hinchan los dedos de las manos y pies.				
15	Sufro de molestias estomacales o indigestión.				
16	Orino con mucha frecuencia.				
17	Generalmente mis manos están secas y calientes.				
18	Siento bochornos.				
19	Me quedo dormido(a) con facilidad y descanso bien durante la noche.				
20	Tengo pesadillas.				

APENDICE B

INDICES DE LA EAA SEGÚN NIVELES

DENTRO DE LOS LIMITES NORMALES. NO HAY ANSIEDAD PRESENTE

Total	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Indice EAA	25	26	28	29	30	31	33	34	35	36	38	39	40	41	43	44

PRESENCIA DE ANSIEDAD MINIMA A MODERADA

Total	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Indice EAA	45	46	48	49	50	51	53	54	55	56	58	59

PRESENCIA DE ANSIEDAD MARCADA A SEVERA

Total	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Indice EAA	60	61	63	64	65	66	68	69	70	71	73	74

PRESENCIA DE ANSIEDAD EN GRADO MAXIMO

Total	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Indice EAA	75	76	78	79	80	81	83	84	85	86	88	89	90	91	92	94
Total	76	77	78	79	80											
Indice EAA	95	96	98	99	100											

APENDICE C

VERSIÓN ADAPTADA DEL PROTOCOLO DEL INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES AGUARUNAS

Instrucciones

En esta parte se encuentran espacios donde se colocarán datos generales, además 20 oraciones y al costado de ellas espacios en blanco encabezadas por NUNCA O RARAS VECES, ALGUNAS VECES, BUEN NÚMERO DE VECES Y LA MAYORÍA DE LAS VECES. Lo que se hará será marcar con el lapicero con una "X" en el espacio que corresponde a como se sintió durante la última semana.

ORACIONES	NUNCA O RARA VEZ	ALGUNAS VECES	BUEN NÚMERO DE VECES	LA MAYORÍA DE LAS VECES
1. Me siento más intranquilo y nervioso que de costumbre. *				
2. Tengo miedo de las cosas o las personas.				
3. Siento mucho temor o miedo sin saber por qué.*				
4. Me siento como si fuera a reventar y partirme en pedazos.				
5. Siento que todo está bien y nada malo puede sucederme.				
6. Me tiemblan los brazos y las piernas.				
7. Siento que me molestan dolores de cabeza, cuello o cintura. *				
8. Me siento débil y me canso fácilmente.				
9. Me siento tranquilo y puedo permanecer en calma fácilmente.				
10. Puedo sentir el sonido de los latidos muy rápidos en mi corazón. *				
11. Sufro de mareos.				
12. Sufro de desmayos o siento que me voy a desmayar.				
13. Puedo respirar fácilmente.				
14. Se me adormecen o me hinchan los dedos de las manos y pies.				
15. Siento ganas de devolver la comida (vomitar) o molestias en el estómago. *				
16. Orino (hago "pichi") a cada rato varias veces al día. *				
17. Generalmente mis manos están secas y calientes.				
18. Siento que mi cara se pone caliente y roja. *				
19. Me quedo dormido con facilidad y descanso bien durante la noche.				
20. Cuando duermo sueño cosas malas que me dan miedo. *				

* Ítems adaptados.

