



28-1

DR. R. DIAZ-GUERRERO Y DR. C. D. SPIELBERGER

IDARE INVENTARIO DE ANSIEDAD: RASGO-ESTADO

Primera Parte:

MANUAL E INSTRUCTIVO



EL MANUAL MODERNO, S. A.

1975

I. Descripción, Aplicación y Calificación

El Inventario de la Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE, versión en Español del STAI [State Trait-Anxiety Inventory]) constituido por dos escalas separadas de autoevaluación que se utilizan para medir dos dimensiones distintas de la ansiedad: 1. La llamada Ansiedad-Rasgo (A-Rasgo), y 2. La llamada Ansiedad-Estado (A-Estado). Aun cuando originalmente se desarrolló este inventario para investigar fenómenos de ansiedad en sujetos adultos normales, es decir, sin síntomas psiquiátricos, se ha demostrado que es también útil en la medición de la ansiedad en estudiantes de secundaria y de bachillerato, tanto como en pacientes neuropsiquiátricos, médicos y quirúrgicos.

La escala A-Rasgo del inventario de la ansiedad consiste de veinte afirmaciones en las que se pide a los sujetos describir cómo se sienten generalmente. La escala A-Estado también consiste en veinte afirmaciones, pero las instrucciones requieren que los sujetos indiquen cómo se sienten en un momento dado. Ambas escalas se encuentran impresas en una sola hoja, una de un lado y la otra del otro. Una copia del protocolo del inventario para el estudio de la ansiedad, se encuentra en las páginas 20 y 21 de este Manual. La escala A-Estado es designada SXE y la escala A-Rasgo es designada SXR.

La escala A-Rasgo puede ser utilizada como instrumento de investigación en la selección de sujetos que varíen en su disposición a responder a la tensión psicológica con niveles de intensidad distintos A-Estado. Los investigadores pueden utilizar la escala A-Estado para determinar los niveles reales de intensidad de A-Estado inducidos por procedimientos experimentales de tensión, o bien como un índice del nivel de pulsión (P), tal como este concepto es definido por Hull (se refiere al concepto de drive (D) de Hull, 1943 & Spence, 1958). Se ha demostrado que las calificaciones obtenidas en la escala A-Estado, se incrementan en respuesta a numerosos tipos de tensión y disminuyen como resultado del entrenamiento en relajación.

El IDARE también ha resultado útil en el trabajo clínico. La escala A-Rasgo es utilizada para la identificación de estudiantes de bachillerato y profesional, que sean propensos a la ansiedad; y para evaluar el grado hasta el cual, los estudiantes que solicitan los servicios de consejo psicológico o de orientación, son afectados por problemas de ansiedad neurótica. La escala A-Estado es un indicador sensitivo del nivel de ansiedad transitoria experimentada por clientes y pacientes en orientación, psicoterapia, terapéutica del comportamiento o en los pabellones psiquiátricos. Puede también utilizarse para medir los cambios de intensidad en A-Estado que ocurren en estas situaciones. Las características esenciales que pueden evaluarse con la escala A-Estado involucran sentimientos de tensión, nerviosismo, preocupación y aprensión.

Una versión anterior del STAI ha sido descrita y evaluada por Levitt (1969) en su libro: La Psicología de la Ansiedad. En un capítulo acerca de la medición experi-

mental de la ansiedad, Levitt compara y contrasta el STAI con otros instrumentos psicológicos que han sido desarrollados como medidas de la ansiedad.

LOS CONCEPTOS DE ANSIEDAD-ESTADO Y DE ANSIEDAD-RASGO

La Ansiedad-Estado (A-Estado) es conceptualizada como una condición o estado emocional transitorio del organismo humano, que se caracteriza por sentimientos de tensión y de aprensión subjetivos conscientemente percibidos, y por un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. Los estados de ansiedad pueden variar en intensidad y fluctuar a través del tiempo.

La Ansiedad-Rasgo (A-Rasgo) se refiere a las diferencias individuales, relativamente estables, en la propensión a la ansiedad, es decir, a las diferencias entre las personas en la tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes con elevaciones en la intensidad de la A-Estado. Como concepto psicológico, la Ansiedad-Rasgo tiene las características del tipo de locuciones que Atkinson (1964) llama "motivos" y que Campbell (1963) conceptualiza como "disposiciones conductuales adquiridas". Los motivos son definidos por Atkinson como disposiciones que permanecen latentes hasta que las señales de una situación los activan. Las disposiciones conductuales adquiridas, de acuerdo con Campbell, involucran residuos de experiencia pasada que predisponen al individuo tanto a ver al mundo en la forma especial, como a manifestar tendencias de respuesta "objeto consistentes".

Los conceptos de Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo pueden concebirse como análogos, en cierto sentido, a los conceptos de energía cinética y potencial en la física. La Ansiedad-Estado, como la energía cinética, se refiere a un proceso empírico de reacción que se realiza en un momento particular y en un determinado grado de intensidad. La Ansiedad-Rasgo, como la energía potencial, indica las diferencias de grado de una disposición latente a manifestar un cierto tipo de reacción. En donde la energía potencial destaca las diferencias entre los objetos físicos, respectado de la cantidad de energía cinética que puede ser liberada si se la dispara a través de una fuerza apropiada, la Ansiedad-Rasgo implica las diferencias entre las personas en la disposición para responder a situaciones de tensión con cantidades variables de Ansiedad-Estado.

Se podría anticipar en general, que quienes califican alto en A-Rasgo, exhibirán elevaciones de A-Estado más frecuentemente que los individuos que califican bajo en Ansiedad-Rasgo, ya que los primeros tienden a reaccionar a un mayor número de situaciones como si fuesen peligrosas o amenazantes. Las personas con alta Ansiedad-Rasgo también más probablemente responderán con un incremento en

la intensidad de A-Estado en situaciones que implican relaciones interpersonales que amenazan a la auto estima. Se ha encontrado, por ejemplo, que las circunstancias en las cuales se experimenta un fracaso, o aquéllas en las que la capacidad personal de un individuo está siendo valorada (por ejemplo, al resolver una prueba de inteligencia), son particularmente amenazantes para las personas con una alta calificación de A-Rasgo (Spence & Spence, 1966; Spielberger, 1966b, Spielberger & Smith, 1966). Pero el hecho de que las personas que difieren en A-Rasgo muestren o no diferencias correspondientes en A-Estado, depende del grado en el que una situación específica es percibida por un individuo particular como amenazante o peligrosa y eso es influido de manera considerable por la experiencia pasada de un individuo.

Los conceptos de Ansiedad-Rasgo y de Ansiedad-Estado, que guiaron la construcción del IDARE son consideradas en mayor detalle por Spielberger (1966a). Las circunstancias y las condiciones que parecen provocar niveles más altos de A-Estado en las personas que difieren en A-Rasgo, son discutidas por Spielberger, Lushene & McAdoo (1971).

APLICACION

El IDARE fue diseñado para ser autoadministrable y puede ser aplicada ya sea individualmente o en grupo. Las instrucciones completas están impresas en el protocolo de ambas escalas tanto la escala de A-Rasgo como la de A-Estado. El inventario no tiene límite de tiempo. Los estudiantes universitarios generalmente requieren sólo de 6 a 8 minutos para contestar sea la escala A-Rasgo o la A-Estado y menos de 15 minutos para contestar ambas. Las personas con menor nivel educativo y, o con disturbios emocionales, pueden requerir de 10 a 12 minutos para contestar una de las escalas y aproximadamente 20 minutos para contestar las dos. Las aplicaciones repetidas de la escala A-Estado típicamente requieren de 5 minutos o menos.

Aun cuando muchos de los reactivos del IDARE tienen validez de contenido como medidas de "ansiedad", el examinador no deberá utilizar este término al aplicar el inventario. Por lo contrario, deberá consistentemente referirse al Inventario y a sus escalas como el "Inventario de Auto-evaluación". Este es precisamente el título que está impreso en el protocolo.

La validez del IDARE se fundamenta en el supuesto de que el examinando entiende claramente que en las instrucciones que se le dan, en relación con el "estado" él debe reportar cómo se siente en este momento específico, y que las instrucciones que se le dan en relación con el "rasgo" se le pide que indique cómo se siente generalmente. La atención del examinando debe ser dirigida al hecho de que las instrucciones son distintas para las dos partes del inventario y se le deberá decir que ambas instrucciones se deben leer con todo cuidado, tanto en un lado como en el otro. Generalmente es útil hacer que el examinando lea las instrucciones en silencio mientras el examinador las lee en voz alta, y además dar al examinando la oportunidad de hacer preguntas.

Si llegan a hacerse preguntas específicas en la situación de prueba, el examinador deberá responder en una forma que no influya la opinión del examinando. Respuestas tales como: "Tan sólo responda a las preguntas de acuerdo a la forma como usted se siente generalmente" para la escala A-Rasgo; "responda de acuerdo a la forma como se siente en este mismo instante" para la escala A-Estado son generalmente satisfactorias y suficientes. La mayoría de las personas responden a todos los reactivos del IDARE sin que haya necesidad de urgirles, pero se debe decir a los examinandos que no deben omitir ninguno de los reactivos, si llegara a hacerse una pregunta al respecto. Cuando se trate de la utilización del IDARE para fines de investigación, el experimentador puede desear instruir explícitamente a los sujetos para que respondan a todos y cada uno de los reactivos.

En el proceso de estandarización del IDARE se aplicó primero la escala A-Estado (forma SXE) y enseguida la escala A-Rasgo (forma SXR). Este es el orden que se recomienda cuando ambas escalas se aplican juntas. Puesto que la escala A-Estado fue diseñada con el fin de que fuese sensitiva a las condiciones bajo las cuales se aplica el inventario, las calificaciones en esta escala pueden ser influenciadas por la atmósfera emocional que se puede crear si se aplica primero la escala A-Rasgo. En contraste, ha sido demostrado que las escalas A-Rasgo son relativamente inmunes al efecto de las condiciones bajo las cuales son aplicadas (Johnson, 1968; Johnson & Spielberger, 1968; Land, 1969).

El examinando responde a cada uno de los reactivos del IDARE, llenando el círculo del número apropiado que se encuentra a la derecha de cada uno de los reactivos del protocolo. El IDARE puede aplicarse también con una hoja de respuesta de elección múltiple que permita la calificación por medio de máquinas. La mayor parte de los datos normativos que se reportan en este Manual, fueron obtenidos con hojas de respuesta, IBM Serie 1230. Con este tipo de hojas de respuesta, el total de las tarjetas de una máquina de calificar 1230, puede ser alimentado directamente a un programa de computadora diseñado para calificar pruebas con respuestas de diferentes pesos (tales programas pueden obtenerse para la mayoría de las computadoras).

Las instrucciones para la escala A-Rasgo del IDARE deberán ser siempre las que están impresas en el protocolo respectivo. Para la escala A-Estado del IDARE, sin embargo, las instrucciones pueden ser modificadas a fin de evaluar la intensidad de A-Estado para cualquier situación o intervalo de tiempo, que pudiese ser de interés a un experimentador o a un clínico. Cuando se administra con propósitos de investigación, el experimentador puede desear alterar las instrucciones, a fin de enfocarlas a un período de tiempo específico. Se puede indicar al sujeto que responda, por ejemplo, de acuerdo a como se sentía mientras trabajaba en una tarea experimental que acaba de terminar. Cuando la tarea es larga, puede ser útil el indicar al sujeto que responda de acuerdo a cómo se sintió al principio de la tarea, o cómo se sintió al trabajar en la parte final de la misma.

En la investigación clínica, un cliente, se le puede pedir que reporte los sentimientos que experimentó durante la entrevista de orientación. O bien, como se

sintió mientras visualizaba una situación estímulo específica, si se le está tratando con terapia de modificación del comportamiento. No es difícil, para la mayor parte de las personas, el responder a los reactivos de la escala A-Estado del IDARE, de acuerdo a cómo se sintieron en una situación específica, o en un momento en particular, siempre y cuando las sensaciones hayan sido experimentadas recientemente y la persona esté motivada para cooperar con el experimentador.

A fin de medir los cambios de intensidad de A-Estado a través del tiempo, se recomienda aplicar la escala A-Estado en cada una de las ocasiones en las cuales sea necesaria una medida de A-Estado. Se ha encontrado, que la aplicación repetida de pruebas de personalidad, o llevan a una mayor confiabilidad en la diferenciación entre sujetos (Howard & Diesenhau, 1965), o no tienen influencia significativa sobre las calificaciones (Bendig & Bruder, 1962).

Si llegara a ser absolutamente necesario, en investigaciones en las cuales se desea hacer medidas repetidas a A-Estado durante el desempeño en una tarea experimental, se pueden utilizar para proporcionar medidas válidas de A-Estado escalas breves integradas por tan sólo cuatro o cinco reactivos de la escala A-Estado del IDARE (O'Neill, Spielberger & Hansen, 1969; O'Neill, Hansen & Spielberger, 1969). Además, el responder a estas breves escalas A-Estado, no parece interferir en el desempeño de una tarea experimental.

Se pueden obtener múltiples medidas repetidas de A-Estado ya sea con las mismas, o con diferentes instrucciones respecto del período para el cual se desea los reportes de los sujetos. Por ejemplo, a un sujeto se le puede pedir que reporte como se siente inmediatamente antes de empezar a trabajar en una tarea experimental, y después de que termine la tarea, se le puede preguntar que indique cómo se sintió durante el tiempo en que estuvo trabajando en ella. O bien tanto antes como después de la tarea experimental, se puede pedir al sujeto, que responda a la escala A-Estado del IDARE de acuerdo a cómo se siente precisamente en ese instante. El período preciso acerca del cual se desean las respuestas del sujeto, deberá naturalmente ser enfatizado en las instrucciones.

CALIFICACION

La dispersión de posibles puntuaciones para el "Inventario de Autoevaluación" del IDARE varía desde una puntuación mínima de 20, hasta una puntuación máxima de 80, tanto en la escala A-Estado como en la escala A-Rasgo. Los sujetos responden a cada uno de los reactivos del IDARE valorándose ellos mismos en una escala de cuatro puntos (ver el protocolo del IDARE en el Apéndice A). Las cuatro categorías para la escala A-Estado son: 1. No en lo absoluto. 2. Un poco. 3. Bastante y 4. Mucho. Las categorías para la escala A-Rasgo son: 1. Casi nunca. 2. Algunas veces. 3. Frecuentemente y 4. Casi siempre.

Algunos de los reactivos del IDARE (por ejemplo: "estoy tenso") se formularon de tal manera que una valoración (4) indica un alto nivel de ansiedad, mientras que otros reactivos (por ejemplo: "me siento bien") se formu-

laron de tal manera, que una valoración alta indica muy poca ansiedad. El valor numérico de la calificación para los reactivos en los cuales las valoraciones altas indican gran ansiedad son los mismos representados por el número que se haya sombreado. Para aquellos reactivos en los cuales una valoración alta indica poca ansiedad el valor numérico de la calificación es inverso. Así pues, el valor numérico de la calificación para las respuestas marcadas 1, 2, 3 ó 4, en el caso de los reactivos inversos, viene a ser de 4, 3, 2 y 1 respectivamente.

Para reducir la posible influencia de una respuesta indiscriminada a las respuestas del IDARE, sería conveniente balancear las escalas A-Estado y A-Rasgo, con un número igual de reactivos para los cuales las valoraciones altas indiquen ansiedad y baja. La escala A-Estado del IDARE está balanceada para evitar la respuesta indiscriminada mediante 10 reactivos con calificación directa y 10 reactivos con calificación invertida. Sin embargo, no fue posible desarrollar una escala A-Rasgo balanceada a partir de los reactivos originales. La escala A-Rasgo del IDARE tiene 7 reactivos invertidos y 13 reactivos de calificación directa. Los reactivos invertidos de las escalas del IDARE son los siguientes:

Escala A-Estado: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 y 20.

Escala A-Rasgo: 1, 6, 7, 10, 13, 16 y 19.

Hay plantillas para la calificación manual de las escalas A-Rasgo y A-Estado del IDARE. Para calificar cada escala, simplemente se coloca la plantilla sobre el protocolo y se dan los valores numéricos de la respuesta que aparecen impresos en la clave de cada reactivo. Esto se hace de manera más conveniente con un contador de mano simple, también se puede sumar mentalmente o utilizar una máquina calculadora mecánica o electrónica; es importante cerciorarse que se está utilizando la plantilla correcta para calificar los protocolos de las escalas A-Estado y A-Rasgo IDARE. Las calificaciones finales de cada escala pueden ser registradas en cualquier lugar conveniente del protocolo.

Una forma fácil de calificar en forma normal el IDARE en muestras se describe en el Apéndice A. Si las contestaciones de los sujetos han sido registradas en hojas de IBM, se puede utilizar un procedimiento de computadora para calificar el IDARE. Este procedimiento también se describe en el Apéndice A, requiere de una máquina calificadora de pruebas IBM No. 1230, además de los servicios de computadora.

La mayoría de las personas que tienen la habilidad de leer de alumnos de 5o. a 6o. año de primaria, responden espontáneamente a todos los reactivos del IDARE sin necesidad de recibir instrucciones especiales o ayuda. Aquellos individuos que no lo hacen, no han entendido las instrucciones rutinarias, o no comprenden el contenido de algunos de los reactivos. Si un sujeto emite uno o dos reactivos en cualesquiera de las escalas, la calificación prorrateada de toda la escala puede ser obtenida a través del siguiente procedimiento: 1. Determínese la calificación media para los reactivos a los cuales el sujeto ha respondido. 2. Multiplíquese ese valor por veinte, y 3. Ajuste el producto al número entero inmediatamente superior que corresponda. Sin embargo, si tres o más reactivos son omitidos la validez de la escala debe considerarse dudosa.

II. Las Normas del IDARE

Los datos normativos del IDARE han sido obtenidos en grandes muestras de alumnos universitarios del primer año y licenciatura, otras antes de la maestría de nivel universitario y estudiantes de bachillerato. Se han reportado también datos normativos para pacientes psiquiátricos del sexo masculino, pacientes de medicina general y de cirugía, y reclusos jóvenes. En el proceso de obtener los datos de las muestras normativas, la escala A-Estado siempre se explicó primero y en seguida se explicó la escala A-Rasgo. Aún cuando las normas del IDARE no se basan en muestras representativas, o estratificadas, la información provista permite comparar las calificaciones obtenidas en grupos experimentales seleccionados y en clientes o pacientes individuales de grupos de referencia importante.

Las normas del IDARE para estudiantes universitarios se basan en dos muestras separadas de estudiantes de la Universidad Estatal de Florida: (a) 982 estudiantes por ingresar al 1er. año (334 hombres, 648 mujeres) y (b) 484 estudiantes no graduados (253 hombres, 231 mujeres). Las puntuaciones T normalizan (media igual a 50 y desviación estándar igual a 10) y los rangos percentiles para ambas muestras, son representados en los cuadros 1 y 2 respectivamente separados los hombres y las mujeres. El IDARE fue aplicado a los estudiantes por ingresar al 1er. año antes de su entrada al mismo mientras se realizaba un programa de orientación. Todos los aquí denominados "estudiantes no graduados" participaban en un curso introductorio de psicología y contestaron el inventario durante una de las clases. A muchos de estos estudiantes se les explicó el inventario por segunda vez para determinar su confiabilidad (estabilidad).

Los datos normativos para estudiantes de bachillerato aparecen también en los cuadros 1 y 2. El IDARE fue aplicado a 377 estudiantes de los primeros grados (190 hombres y 187 mujeres) de la Escuela de Bachilleres de Long Beach, Nueva York. El IDARE les fue aplicado en una sesión de examen colectivo bien integrada que fue parte de un proyecto especial de investigación acerca de las relaciones existentes entre la ansiedad, el desempeño en pruebas de inteligencia y el aprovechamiento académico.

A fin de encontrar una puntuación T o un rango percentil en los cuadros de las normas, que corresponda a una puntuación obtenida por un individuo en la escala A-Rasgo o A-Estado, se recomienda el siguiente procedimiento: 1. Determínese la muestra normativa que parece ser la más apropiada para el caso en cuestión y consúltese el cuadro para esa muestra. 2. Búsquese la puntuación en bruto obtenida en la columna a la extrema izquierda o extrema derecha del cuadro. 3. Léase la puntuación T o el rango percentil que corresponde al sujeto en la columna apropiada.

Las medias, desviaciones estándar y confiabilidades alfa de las escalas A-Rasgo y A-Estado del IDARE para las muestras normativas de los estudiantes de bachillerato y

universitarios se presentan en el cuadro 3. Se podrá notar que todas las medias de A-Rasgo para hombres y mujeres en las dos muestras de inmunitarios son aproximadamente las mismas, mientras que las medias para las mujeres estudiantes del bachillerato son un poco más altas que las obtenidas para los estudiantes varones del mismo nivel de estudios.

También se puede notar en el cuadro 3. que las calificaciones promedio de A-Estado para los estudiantes universitarios del primer año, son ligeramente más altas que sus calificaciones de A-Rasgo y también algo más altas que las obtenidas en los otros grupos normativos. Para las otras dos muestras, las calificaciones de A-Estado fueron, o bien aproximadamente las mismas o un poco más bajas que las correspondientes calificaciones de A-Rasgo. Puesto que los estudiantes universitarios del primer año contestaron el IDARE durante el programa de orientación, y de examen mientras que los otros estudiantes universitarios y de bachillerato contestaron el inventario bajo circunstancias menos amenazantes, estas diferencias en las calificaciones sugieren que la escala A-Estado es en verdad, sensitiva a las condiciones bajo las cuales se aplica el inventario. Los datos normativos en la escala A-Estado deberían por lo tanto ser interpretados, tomando en cuenta estos hechos.

Los datos normativos para pacientes neuropsiquiátricos (NP), pacientes de medicina general y cirugía (MGC) y reclusos jóvenes, quedan incluidos también en cuadros 1 y 2. Los datos para los pacientes NP y MGC fueron obtenidos de los siguientes Hospitales para Veteranos: Augusta en Georgia; Bay Pines y Miami, Florida; Biloxi and Gulfport en Mississippi, Charleston en South Carolina; Clarksburg en West Virginia y Tuscaloosa en Alabama (todos en E.U.A.), fue aplicado a los pacientes, sea individualmente o en pequeños grupos. Los datos de los reclusos fueron obtenidos en la Federal Correctional Institution de Tallahassee, Florida, en don el IDARE fue aplicado a pequeños grupos de reclusos como parte del programa de clasificación y de aplicación de pruebas psicológicas de la institución.

La edad promedio de los pacientes NP, fue de 43 años y su nivel de estudios promedio fue de 10 años de escolaridad. El promedio de edad y el nivel de estudios de los pacientes MGC fue de 55 años y de 10 años de escolaridad. En el caso de los pacientes NP, ni la edad ni el nivel de estudios correlacionaron con las calificaciones del IDARE, se encontró una correlación negativa significativa ($r = -.22$) entre las calificaciones de A-Rasgo del IDARE y el nivel de estudios de los pacientes y MGC. Una tendencia semejante entre las calificaciones de A-Rasgo y el nivel de estudios puede notarse en el cuadro 3 para los estudiantes universitarios y de bachillerato: Los estudiantes de bachillerato obtuvieron la calificación promedio de A-Rasgo más alta: los estudiantes universitarios graduados obtuvieron las calificaciones de A-Rasgo más bajas, en tanto que las calificaciones de A-Rasgo para los estudiantes que iban a entrar al primer año de universidad cayeron entre estos dos extremos.

Cuadro 1. Puntuaciones T normalizadas para las escalas de Rasgo y Estado del IDARE

Punt. en bruto	Universitarios de primer año				Universitarios no graduados				Bachillerato				Pacientes NP*		Pacientes MGC*		Reclusos*		Punt. en bruto
	Varones		Mujeres		Varones		Mujeres		Varones		Mujeres		Es.	Ra.	Es.	Ra.	Es.	Ra.	
	Es.	Ra.	Es.	Ra.	Es.	Ra.	Es.	Ra.	Es.	Ra.	Es.	Ra.							
20					21	23	21						25		25				20
21			20	20	26	26	26	21	22	22	28		27	26	26	29			21
22	20	20	23	23	29	27	30	25	27	24	30		29	27	31	32			22
23	23	26	25	26	32	30	33	28	30	26	32	22	31	29	34	34	25	27	23
24	25	28	26	29	35	32	35	31	32	28	34	30	32	32	36	35	27	29	24
25	26	30	29	31	38	35	37	33	34	30	36	33	33	33	37	36	29	32	25
26					40	37	39	34	36	33	38	34	34	34	39	37	31	33	26
27	32	35	33	36	40	38	41	36	38	36	40	35	35	34	40	38	33	33	27
28	33	37	35	37	41	39	43	37	39	37	42	37	36	36	41	39	34	35	28
29	34	39	37	38	43	41	44	38	41	38	43	38	37	37	42	40	34	36	29
30	36	41	39	40	44	43	46	40	44	40	45	39	37	37	42	41	35	37	30
31					46	44	47	41	45	41	46	41	38	38	43	42	37	38	31
32	40	44	42	43	47	46	49	43	46	42	47	42	38	39	44	43	38	39	32
33	41	45	43	44	48	47	50	45	47	44	48	43	39	40	44	44	38	40	33
34	43	46	44	45	49	48	51	46	48	45	49	44	40	40	45	44	40	40	34
35	44	47	46	47	50	49	52	47	49	46	50	46	41	41	46	45	40	41	35
36					51	50	53	49	51	47	51	47	42	42	46	46	41	42	36
37	47	49	48	50	52	51	54	50	52	48	52	48	43	43	46	47	42	44	37
38	48	50	49	51	53	51	55	51	53	50	53	49	43	44	47	47	43	45	38
39	50	52	50	52	54	52	56	52	53	51	54	49	44	44	48	48	44	45	39
40	51	53	52	53	55	53	56	54	54	52	55	50	45	45	48	49	45	46	40
41					56	54	57	55	56	53	56	51	45	46	49	50	46	47	41
42	54	56	54	55	57	55	58	56	57	54	57	51	46	46	50	51	47	47	42
43	55	57	55	56	58	56	60	57	57	55	57	52	47	47	50	52	48	48	43
44	56	58	56	57	59	57	60	58	57	57	57	53	47	48	51	52	49	49	44
45	57	59	57	59	60	58	61	59	58	58	58	54	48	49	52	53	49	49	45
46					60	59	61	60	59	59	58	54	48	49	53	54	50	50	46
47	60	60	59	61	61	60	62	61	60	60	59	55	49	50	53	55	51	51	47
48	61	61	60	62	62	61	63	61	61	60	60	56	50	51	54	56	51	52	48
49	61	62	61	63	63	62	64	61	62	61	60	57	51	52	55	57	53	53	49
50	62	63	62	64	63	62	65	62	62	61	61	58	52	53	57	57	54	54	50
51					64	63	66	64	64	62	61	58	53	54	58	58	55	56	51
52	64	65	63	66	65	64	66	65	64	62	61	59	53	55	59	59	56	57	52
53	65	67	64	66	66	65	66	65	66	63	62	60	54	55	59	60	57	58	53
54	66	68	65	67	66	66	66	66	67	63	62	61	55	56	59	61	57	60	54
55	67	69	66	68	67	67	67	66	68	64	62	62	56	57	59	62	58	61	55
56					68	67	68	67	69	66	63	62	57	57	60	63	59	62	56
57	69	71	68	69	68	68	69	67	69	66	63	62	58	58	60	64	59	62	57
58	70	72	69	71	69	69	70	67	71	67	63	63	58	59	61	64	61	63	58
59	72	73	70	72	69	69	71	68	72	67	64	63	59	60	61	65	62	64	59
60	73	73	71	73	69	69	71	69	73	67	64	64	59	60	62	66	63	65	60
61					69	69	71	69	74	68	65	65	60	61	63	66	64	66	61
62	76	75	72	74	70	69	72	69	76	69	66	67	60	62	64	66	65	67	62
63		76	73	74	71	70	73	70	76	69	66	68	61	62	64	66	65	67	63
64			73	75	71	70	74	70	76	70	67	69	61	63	64	66	66	68	64
65			75	76	73	72	74	70	76	70	69	69	62	64	65	66	66	69	65
66			77		75	74	74	72	76	72	69	70	62	65	66	66	66	70	66
67					77	74	74	74	76	76	70	71	63	66	66	66	67	72	67
68					77	75	74	74	76		71	71	64	67	67	67	69		68
69			69		77	77	75	74	76		71	71	65	68	68	68	70		69
70			70		79	79	76	75	78		71	71	66	69	68	70	71		70
71			71				76	76			71	71	67	70	68	72	71		71
72											71	71	68	71	68	74	72		72
73													69	72	69				73
74													70		70				74
75													72		71				75

*Solamente varones

*Solamente varones

Cuadro 2. Rangos percentiles para las escalas de Rasgo y Estado del IDARE

Punt. en bruto	Universitarios de primer año				Universitarios no graduados				Bachillerato				Pacientes NP*		Pacientes MGC*		Reclusos*		Punt. en bruto	
	Varones		Mujeres		Varones		Mujeres		Varones		Mujeres		Es.	Ra.	Es.	Ra.	Es.	Ra.		
	Es.	Ra.	Es.	Ra.	Es.	Ra.	Es.	Ra.	Es.	Ra.	Es.	Ra.								
20													1			1			20	
21					1	1	1				1		1	1		1	2		21	
22					2	1	2	1	1	1	2		2	1		3	3		22	
23		1	1	1	4	2	4	2	2	1	3		3	2		6	5	1	1	23
24	1	1	1	2	7	4	6	3	3	1	5	2	4	3		8	6	1	2	24
25	1	2	2	3	12	7	9	5	6	2	8	4	4	4	10	7	2	3		25
26	2	4	3	5	15	9	13	6	8	4	11	5	5	5	13	10	3	4		26
27	3	7	5	7	17	11	17	7	11	7	15	7	6	6	16	12	4	5		27
28	4	10	7	10	19	14	23	10	14	10	20	9	8	8	19	13	5	6		28
29	6	14	10	12	23	19	28	12	19	12	24	11	9	9	20	16	6	8		29
30	8	17	13	16	28	24	33	15	26	15	29	14	10	11	21	19	7	9		30
31	11	23	17	19	33	29	39	20	31	18	34	18	11	12	24	22	9	11		31
32	15	27	21	23	38	34	45	24	34	22	39	21	12	14	26	23	11	13		32
33	20	31	25	27	41	39	49	30	39	27	43	25	14	15	29	26	12	15		33
34	24	35	29	32	45	42	54	36	43	31	48	29	15	17	31	29	15	17		34
35	28	38	34	37	50	46	59	40	48	34	52	33	18	19	33	31	17	19		35
36	33	42	39	42	54	50	63	45	53	38	56	38	21	21	34	33	19	22		36
37	39	46	43	49	58	53	65	51	58	43	59	42	23	24	36	37	22	26		37
38	43	50	47	54	61	55	68	55	60	48	62	45	25	26	38	40	25	29		38
39	48	56	51	58	65	57	71	60	62	54	65	48	28	28	41	43	28	32		39
40	52	62	56	62	70	61	74	65	67	60	68	50	30	31	43	46	32	34		40
41	57	66	61	66	73	64	76	70	72	63	72	53	32	33	46	50	36	37		41
42	64	72	66	70	75	68	80	73	75	67	75	55	34	36	48	54	39	40		42
43	69	77	70	73	78	73	83	76	77	70	76	58	37	39	51	57	42	43		43
44	73	80	73	77	81	76	85	79	77	75	77	62	39	41	55	59	45	45		44
45	76	82	76	80	83	79	86	81	79	77	79	64	41	45	58	62	47	48		45
46	80	84	79	84	85	81	87	84	82	80	80	66	43	48	60	65	50	52		46
47	84	85	83	87	87	84	89	86	84	83	82	69	45	51	61	68	53	55		47
48	86	87	85	89	88	86	91	86	87	85	83	72	48	54	64	72	56	59		48
49	87	89	86	91	90	88	92	87	88	86	85	75	52	57	70	75	60	63		49
50	88	91	88	92	91	89	93	89	89	87	86	78	56	61	75	77	65	67		50
51	90	92	89	94	92	91	94	91	91	88	87	80	60	64	78	79	68	71		51
52	91	94	91	94	93	92	95	93	93	89	87	82	63	67	80	82	71	74		52
53	93	95	92	95	94	93	95	94	94	90	88	85	66	70	82	85	75	79		53
54	94	97	93	96	95	94	95	94	96	91	89	87	70	72	82	87	76	84		54
55	95	97	94	96	95	95	96	95	97	93	89	88	73	75	83	89	79	86		55
56	96	98	95	96	96	96	96	95	97	94	90	89	75	77	84	91	81	87		56
57	97	98	96	97	97	97	97	96	97	95	90	89	77	79	85	92	83	89		57
58	98	98	97	98	97	97	98	96	98	95	90	90	80	81	86	92	85	90		58
59	99	99	98	99	97	97	98	96	99	96	91	91	81	83	87	94	88	92		59
60			98		97	97	98	97		96	92	92	82	85	89	94	91	93		60
61			99		97	97	98	97		96	93	94	83	86	91	94	92	94		61
62					98	97	98	97		97	94	95	84	88	92	94	93	95		62
63					98	98	99	98		97	95	97	86	89	92	94	94	96		63
64					98	98		98		98	95	97	86	90	92	94	94	96		64
65					99	99		98		98	97	97	88	92	93	94	94	97		65
66								98		98	97	98	89	94	94	95	95	98		66
67								99		99		98	90	95	95	95	96	99		67
68											98	98	92	95	96	96	97			68
69											98	98	93	97	96	97	98			69
70											98	98	95	97	96	97	98			70
71											98	98	95	98	96	98	98			71
72											98	98	96	98	97	99	99			72
73													97	99	97					73
74													98		98					74
75													99		98					75

*Solamente varones

Cuadro 3. Promedios desviaciones estándar y confiabilidades alfa para estudiantes de bachillerato y universidad

	Universitarios de primer año		Universitarios no graduados		Estudiantes de bachillerato	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
A-Rasgo						
Promedio	38.07	38.22	37.68	38.25	39.37	41.61
N	332	644	253	231	190	187
Desv. Est.	8.20	8.20	9.69	9.14	9.40	11.29
Alfa	.86	.86	.90	.89	.89	.92
A-Estado						
Promedio	40.01	39.39	36.35	35.12	36.99	37.57
N	334	648	253	231	190	187
Desv. Est.	7.85	8.62	9.67	9.25	9.07	11.76
Alfa	.83	.86	.89	.89	.86	.92

Se obtuvo información diagnóstica para aproximadamente dos tercios de la muestra NP. Un poco más del 30% de estos pacientes habían sido diagnosticados como esquizofrénicos. Aproximadamente 15% fueron diagnosticados como neuróticos y menos del 10% recibieron un diagnóstico primario de reacción depresiva, lesión cerebral o algún otro procedimiento al carácter. En la muestra MGC 20% de los pacientes tenían diagnósticos secundarios que indicaban que sus condiciones médicas o quirúrgicas estaban complicadas con factores psiquiátricos. Los promedios y desviaciones estándar para las calificaciones de A-Rasgo y de A-Estado del IDARE en las muestras normativas de los pacientes NP y MGC quedan ilustradas en el cuadro 4 junto

Cuadro 4. Promedios de A-Rasgo y A-Estado del IDARE para los pacientes neuropsiquiátricos, los pacientes de medicina general y cirugía, y los reclusos jóvenes

	N	A-Rasgo		A-Estado	
		Pro-medio	Desv. est.	Pro-medio	Desv. est.
Total de pacientes NP	461	46.62	12.41	47.74	13.24
Reacción depresiva	28	53.43	12.91	54.43	13.02
Reacción de ansiedad	60	48.08	10.65	49.02	11.62
Esquizofrenia	161	45.72	12.37	45.70	13.44
Daño cerebral	31	44.64	11.20	46.94	13.41
Neurosis de carácter	22	40.32	13.06	40.54	14.27
Total de pacientes MGC	161	41.91	12.70	42.38	13.79
Pacientes con complicaciones psiquiátricas	34	44.62	14.12	42.35	15.66
Pacientes sin complicaciones psiquiátricas	110	41.33	12.55	42.68	13.76
Reclusos	212	44.64	10.47	45.96	11.04

con los datos descriptivos sobre aquellos pacientes cuya información diagnóstica diferencial estaba disponible.

Los promedios de A-Rasgo y de A-Estado del IDARE, tanto como las desviaciones estándar para los delinquentes también se presentan en el cuadro 4. La edad promedio de los reclusos era de 21 años, su nivel de estudios medio era de 10 años de escolaridad. Para la muestra de reclusos, como en el caso de los pacientes MGC, se encontró una correlación obtenida en las puntuaciones de la escala A-Rasgo.

Apéndice A

CALIFICACION POR MEDIO DE MAQUINA Y CALIFICACION MANUAL DEL IDARE PARA MUESTRAS GRANDES

Una copia del Inventario para el IDARE, se ilustra en las siguientes páginas de este Manual. La escala A-Estado es designada SXE, la escala A-Rasgo es designada SXR. Existen comercialmente plantillas para calificar el IDARE en forma manual. Un enfoque de calificación del IDARE por medio de máquina y un enfoque práctico para la calificación manual de grandes muestras se describen a continuación:

CALIFICACION POR MEDIO DE MAQUINA DEL IDARE

No es posible calificar en forma directa el IDARE con las máquinas comunes de calificación, ya que por lo general, éstas no permiten la asignación de pesos a cada una de las opciones de respuesta. Sin embargo, se puede utilizar una máquina IBM de calificación de pruebas 1230, que contenga las respuestas de los reactivos con sus pesos correspondientes para valorar las tarjetas IBM una vez perforadas. Estas tarjetas se pueden utilizar para obtener las calificaciones del IDARE con programas de computación diseñados para calificar las respuestas al inventario de acuerdo con su peso. El programa TESTAT descrito por Veldman (1967), puede ser adaptado para este propósito. Veldman proporciona también un listado completo del programa en lenguaje Fortran. Aun cuando la mayoría de los centros de computación que tienen máquinas de calificación IBM, tienen acceso a los programas de computadora que se necesitan, los autores del IDARE pueden proporcionar tales programas si se les solicitan.

CALIFICACION MANUAL DEL IDARE PARA GRANDES MUESTRAS

Un enfoque práctico para la calificación manual del IDARE para grandes muestras se recomienda a continuación. Las claves separadas para los reactivos directos y los reactivos inversos de A-Estado y A-Rasgo pueden confeccionarse. Con estas claves a la mano, las calificaciones de las escalas A-Estado y A-Rasgo pueden ser calculadas en la siguiente forma: **Primer paso**; determínese la suma de las calificaciones pesadas para los reactivos calificados directamente tanto en la escala A-Estado como en la escala A-Rasgo. **Segundo paso**, réstese la suma de las calificaciones pesadas para los reactivos inversos de estas escalas. **Tercer paso**, añádase la constante apropiada que es igual a cinco veces el número total de reactivos inversos en cada escala. **Cuarto paso**, las cantidades resultantes son las calificaciones adecuadamente determinadas para las escalas A-Estado y A-Rasgo. En seguida se presentan estos pasos en forma resumida:

	Estado	Rasgo
1. Determínese la suma de las calificaciones pesadas para los reactivos directos.	+	+
2. Réstese la suma de las calificaciones pesadas para los reactivos inversos.	-	-
3. Añádase la constante apropiada.	+50	+35
4. Los totales de las operaciones anteriores, nos dan las calificaciones de las escalas A-Estado y A-Rasgo.	_____	_____

El procedimiento arriba indicado automáticamente revierte el peso de la respuesta para cada reactivo para el cual una calificación alta indica baja ansiedad al sustraer la respuesta obtenida del valor de 5. Así, una valoración de 4 en un reactivo inverso resulta ser $(5-4) + 1$. De manera semejante, las valoraciones de 2, 3 y 4 cuando son invertidos se convierten en 3, 2 y 1 respectivamente.

Inventario de Autoevaluación

por

C. D. Spielberger, A. Martínez-Urrutia, F. González-Reigosa, L. Natalicio y R. Díaz-Guerrero

Nombre: _____ Fecha: _____

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea cada frase y llene el círculo del número que indique cómo se *siente ahora mismo*, o sea, en *este momento*. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora.

	NO EN LO ABSOLUTO	UN POCO	BASTANTE	MUCHO
1. Me siento calmado	①	②	③	④
2. Me siento seguro	①	②	③	④
3. Estoy tenso	①	②	③	④
4. Estoy contrariado	①	②	③	④
5. Estoy a gusto	①	②	③	④
6. Me siento alterado	①	②	③	④
7. Estoy preocupado actualmente por algún posible contratiempo	①	②	③	④
8. Me siento descansado	①	②	③	④
9. Me siento ansioso	①	②	③	④
10. Me siento cómodo	①	②	③	④
11. Me siento con confianza en mí mismo	①	②	③	④
12. Me siento nervioso	①	②	③	④
13. Me siento agitado	①	②	③	④
14. Me siento "a punto de explotar"	①	②	③	④
15. Me siento reposado	①	②	③	④
16. Me siento satisfecho	①	②	③	④
17. Estoy preocupado	①	②	③	④
18. Me siento muy excitado y aturdido	①	②	③	④
19. Me siento alegre	①	②	③	④
20. Me siento bien	①	②	③	④

IDARE

Inventario de Autoevaluación

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea cada frase y llene el círculo del número que indique cómo se siente *generalmente*. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa cómo se siente *generalmente*.

	CASI NUNCA	ALGUNAS VECES	FRECUENTEMENTE	CASI SIEMPRE
21. Me siento bien	①	②	③	④
22. Me canso rápidamente	①	②	③	④
23. Siento ganas de llorar	①	②	③	④
24. Quisiera ser tan feliz como otros parecen serlo	①	②	③	④
25. Pierdo oportunidades por no poder decidirme rápidamente	①	②	③	④
26. Me siento descansado	①	②	③	④
27. Soy una persona "tranquila, serena y sosegada"	①	②	③	④
28. Siento que las dificultades se me amontonan al punto de no poder superarlas	①	②	③	④
29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia	①	②	③	④
30. Soy feliz	①	②	③	④
31. Tomo las cosas muy a pecho	①	②	③	④
32. Me falta confianza en mí mismo	①	②	③	④
33. Me siento seguro	①	②	③	④
34. Trato de sacarle el cuerpo a las crisis y dificultades	①	②	③	④
35. Me siento melancólico	①	②	③	④
36. Me siento satisfecho	①	②	③	④
37. Algunas ideas poco importantes pasan por mi mente y me molestan	①	②	③	④
38. Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar de la cabeza	①	②	③	④
39. Soy una persona estable	①	②	③	④
40. Cuando pienso en los asuntos que tengo entre manos me pongo tenso y alterado	①	②	③	④

Apéndice B

DESARROLLO DEL INVENTARIO (STAI = IDARE)

El desarrollo del inventario fue iniciado por Charles D. Spielberger y R. L. Gorsuch en el Otoño de 1964 en la Universidad de Vanderbilt. Se deseaba construir un instrumento de investigación objetivo de autoevaluación que pudiese ser utilizado para medir la ansiedad-estado y la ansiedad-rasgo en adultos normales. En la primavera de 1967, se cambiaron las actividades del desarrollo del instrumento a la Universidad Estatal de Florida y las metas por alcanzar con el inventario, fueron ampliadas para incluir su utilización con individuos emocionalmente perturbados tanto para propósitos clínicos como de investigación. A partir del Otoño de 1967, la responsabilidad fundamental para el desarrollo del inventario, quedó en manos de C.D. Spielberger y de R. Lushene.

Los varios pasos en el proceso del desarrollo del instrumento y los procedimientos específicos empleados en la construcción y selección de los reactivos de las escalas A-Estado y A-Rasgo del inventario, se sintetizan enseguida:

1. Tres escalas de ansiedad ampliamente usadas, el IPAT Anxiety Scale, (Catell y Scheier, 1963), el Taylor (1953) Manifest Anxiety Scale, y el Welsh (1956) Anxiety Scale, fueron aplicados a 288 estudiantes de un curso de introducción a la psicología en la Universidad de Vanderbilt. Un total de 177 reactivos individuales correlacionó .25 o más con cada una de las tres escalas de ansiedad. Estos reactivos fueron modificados de tal manera que retuviesen su contenido psicológico esencial pero fueron alterados en su forma de tal manera que cada reactivo pudiese ser utilizado con distintas instrucciones para medir **ambos** aspectos A-Estado y A-Rasgo.
2. Los reactivos modificados fueron aplicados a un grupo pequeño de estudiantes de psicología de los últimos grados a los que se les pidió que comentaran en detalle el protocolo y la claridad del contenido de los reactivos. Sobre la base de los comentarios de los sujetos, el protocolo fue simplificado y se eliminaron los reactivos vagos o ambiguos. Se retuvo para una evaluación más completa, un total de 124 reactivos a los que se consideró que tenían potencial para medir tanto A-Estado como A-Rasgo.
3. Los reactivos retenidos fueron aplicados a una tercera muestra de estudiantes de la Universidad de Vanderbilt (54 estudiantes universitarios no graduados) a quienes se les pidió que indicaran para cada reactivo, que también describía "**cómo se siente generalmente**" al marcar "casi nunca", "algunas veces", "frecuentemente", "casi siempre". Después de responder a este tipo de instrucciones de A-Rasgo, se pidió a los estudiantes que leyeran cada reactivo una vez más e indicaran hasta qué punto describía "**cómo se siente en este momento**" al marcador "sí" o "no" o "no es aplicable". Para todos los reactivos marcados "sí" se instruyó a los estudiantes a fin de que reportaran la intensidad de sus sentimientos al marcador "relativamente débil", "moderado", "muy intenso", "fuerte". Los reactivos para los cuales las correlaciones de reactivo contra escala fueron de .35 o más altas tanto para las instrucciones de A-Rasgo como de A-Estado, y para las cuales, no más del 20% de los sujetos indicaron "no es aplicable" fueron retenidos para la validación posterior.
4. Los 66 reactivos que sobrevivieron al proceso de eliminación descrito en el paso número 3, fueron aplicados a una cuarta muestra de estudiantes universitarios (265 estudiantes no graduados de la Universidad de Vanderbilt) junto con una descripción breve de dos situaciones hipotéticas denominadas situación EXAM y situación RELAJ. Se pidió en primer lugar a los estudiantes que respondieran a cada uno de los reactivos indicando cómo se sentían generalmente (condición A-Rasgo). Luego se les pidió que imaginaran que estaban en realidad en la situación de EXAM y que respondiesen a los reactivos del inventario en acuerdo a cómo creían que se sentirían en tal situación. Se dieron instrucciones similares de A-Estado para la situación de RELAJ. La mayoría de estos mismos estudiantes había también contestado a la escala de ansiedad manifiesta de Taylor (TMAS) y a la escala IPAT de ansiedad (diez semanas antes de la aplicación del STAI). Un total de 44 reactivos sobrevivió todas las fases del proceso de validación de reactivos que se describe enseguida.
 - a. Se determinaron las correlaciones de reactivo contra escala para cada reactivo aplicado con instrucciones de A-Rasgo, tanto para varones como para mujeres en análisis separados de reactivos. Los reactivos que no tuviesen una correlación de reactivo contra escala mayor de .30 para hombres o para mujeres serían eliminados.
 - b. Las respuestas de A-Rasgo para cada reactivo fueron correlacionadas con las puntuaciones Z sumadas del TMAS y de la escala de ansiedad IPAT. Aquellos reactivos en los cuales el coeficiente de validez concurrente con las calificaciones combinadas del TMAS y del IPAT fuera menor de .20 se les excluiría de consideraciones posteriores.

- c. Para las condiciones substitutivas se encontró, como se esperaba, que las calificaciones de A-Estado fueran significativamente más altas para la situación de EXAM que para la situación de RELAJ. La utilidad potencial de cada uno de los reactivos del STAI como una medida de A-Estado fue evaluada por medio de un procedimiento de correlación punto biserial que determinó el grado en el cual un reactivo individual discriminaba entre la situación examen y la situación relajación (Spielberger y Gorsuch, 1966). Sólo aquellos reactivos que discriminaron significativamente entre las dos situaciones tanto para los varones como para las mujeres, fueron retenidos para su validación posterior.
5. Los 44 reactivos sobrevivientes del Inventario fueron validados en forma cruzada en una muestra grande de estudiantes del primer año de la Universidad de Vanderbilt (561 varones y 249 mujeres). A todos ellos se les intruyó para que respondiesen a cada uno de los reactivos en tres condiciones diferentes. Los reactivos fueron aplicados en primer lugar con instrucciones de A-Rasgo, luego con instrucciones substitutivas de A-Estado para situación de relajación y finalmente con instrucciones de examen para A-Estado. Para cada uno de los reactivos de A-Rasgo se calcularon correlaciones de reactivo contra escala y para cada reactivo de A-Estado correlaciones punto biserial separadamente para hombres y para mujeres. Un total de 33 reactivos obtuvieron correlaciones de reactivo contra escala para la escala A-Rasgo iguales o mayores de .24 tanto para los hombres como para las mujeres y correlaciones punto biserial para la escala A-Estado que discriminaban significativamente entre las condiciones de examen y de relajación. En el análisis de A-Rasgo dos de los reactivos aparecieron altamente correlacionados entre sí y se juzgó que eran casi idénticos en contenido. Después de que uno de estos reactivos fue eliminado, quedaron 32 reactivos aceptables.
 6. El siguiente paso en el proceso de validación de los reactivos del Inventario, se abocó a la consecución de mayor información acerca de la validez de los reactivos individuales como medidas de A-Estado. Los 32 reactivos restantes fueron aplicados con instrucciones de A-Estado aproximadamente a 400 estudiantes universitarios no graduados de Vanderbilt que se habían registrado en un curso de introducción a la psicología. Esta escala A-Estado de 32 reactivos fue aplicada primero en clase en un día en el que no hubo examen y luego se volvió a aplicar dos meses más tarde al principio de un período en el cual los estudiantes hicieron su examen final del curso. El grado en el que cada reactivo cambió, fue determinado calculando los coeficientes de correlación punto biserial entre las calificaciones de A-Estado y las situaciones examen vs. relajación. Se calcularon las correlaciones separadas para los 224 hombres y las 133 mujeres de quienes se tenían datos completos. De estos 32 reactivos, 23 tenían correlaciones punto biserial que eran significativas tanto para hombres como para mujeres.
 7. Originalmente se tenía la intención de construir una escala en la cual los mismos reactivos dados con instrucciones diferentes pudieran ser utilizados para medir tanto A-Estado como A-Rasgo. Puesto que existían menos reactivos A-Estado buenos, que reactivos de A-Rasgo en el conjunto original de reactivos, los 20 que mejor llenaron los criterios establecidos para medir A-Estado fueron seleccionados a fin de construir la forma A del STAI. Deberá recordarse, sin embargo, que los procedimientos de validación de reactivos descritos anteriormente, habían establecido requisitos exigentes para cada reactivo como medida de A-Rasgo. Así pues, los 20 reactivos que constituyen la forma A del STAI, fueron medidas razonablemente buenas tanto de A-Estado como de A-Rasgo.
 8. Se encontró una correlación moderadamente alta entre las escalas de A-Estado y de A-Rasgo para el STAI (Forma A). Puesto que los mismos reactivos fueron usados para medir tanto A-Estado como A-Rasgo, esta correlación reflejó cuando menos en parte, el contenido específico de los reactivos individuales. Por lo tanto, se desarrolló una segunda forma del STAI en la cual los distintos reactivos fueron utilizados para medir A-Estado y A-Rasgo. Para esta forma, los 20 reactivos no incluidos en la Forma A que llenaron mejor los criterios para la medición de A-Rasgo en los pasos de construcción del inventario que han sido descritos, fueron seleccionados del conjunto de reactivos. Muchos de estos reactivos eran realmente mejores medidas de A-Rasgo que aquéllos que se incluyeron en la forma A, pero habían sido rechazados porque no eran medidas aceptables de A-Estado. Así pues, la Forma B del STAI, consistió en 20 reactivos de la Forma A con instrucciones de A-Estado y los 20 reactivos nuevos que fueron aplicados con las instrucciones de A-Rasgo.
 9. En las formas A y B del STAI, cada reactivo de A-Rasgo fue valorado con una escala de cuatro puntos, en tanto que las instrucciones de A-Estado para estas formas requirieron que los sujetos valoraran cada reactivo con una escala de cinco puntos. Además, el primer punto de la escala de valoraciones de A-Estado ("la afirmación no describe mis sentimientos, condiciones, etc."), fue considerada ambigua por muchos sujetos. A fin de reducir la confusión y hacer las escalas A-Estado y A-Rasgo del Inventario más comparables estructuralmente, se eliminó la primera categoría en A-Estado. Para los reactivos en la escala revisada se pidió a los sujetos que indicaran cómo se sentían en este momento y marcando una de las siguientes categorías: (1) "No en lo absoluto"; (2) "Un poco"; (3) "Bastante"; (4) "Mucho". Además, los reactivos individuales de A-Estado fueron alterados a fin de subrayar lo inmediato de los sentimientos que se pedía a los sujetos que reportasen. Estos se llevó a cabo

añadiendo frases tales como: "ahora mismo", "en este instante", "ahorita" y "en este momento", a la mayoría de los reactivos de A-Estado del STAI (Forma B).

10. En su formato modificado, la forma B (revisada) consistió en los mismos reactivos de la Forma B, pero difirió de la Forma B en que los reactivos de A-Estado se valoraban en una escala de cuatro puntos y no de cinco y en el hecho de que muchos de los reactivos habían sido ligeramente alterados para enfatizar la condición de A-Estado. La Forma B (revisada), fue aplicada a una muestra de 468 hombres y 575 mujeres que se habían registrado en un curso de introducción a la psicología de la Universidad Estatal de Florida a bien de contar con los datos normativos presentados en el primer manual preliminar del inventario IDARE (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1967).
11. A fin de evaluar la relación entre el STAI (Forma B revisada) y otras medidas de la ansiedad, el inventario fue aplicado a una segunda muestra de más de 300 estudiantes no graduados de la Universidad Estatal de Florida junto con el TMAS, la escala de ansiedad IPAT, y las formas General y "De hoy" del AACL. Los resultados de este estudio que fueron reportados por Spielberger, et al. (1967) en el Manual preliminar del Inventario IDARE, mostraron que las escalas A-Rasgo y A-Estado del Inventario, correlacionaban altamente con otras medidas estándar de ansiedad-rasgo y ansiedad-estado.
12. En el paso final del procedimiento de construcción del inventario, el contenido de cada uno de los reactivos de A-Rasgo y de A-Estado fue revisado para determinar si alguno de los reactivos podría ser considerado inapropiado para su uso con poblaciones de estudiantes de bachillerato y universitarios porque fuese personalmente ofensivo. Aun cuando se reconoció que sería difícil el desarrollar reactivos de ansiedad que fuesen completamente inocuos, se hizo el esfuerzo para reemplazar aquellos reactivos más inapropiados con reactivos de contenido similar y de propiedades psicométricas equivalentes, pero que pudiesen expresarse de una manera que fuese juzgada como menos ofensiva. El proceso de reemplazamiento de reactivos incluyó los siguientes pasos:
 - a. Se preparó un conjunto de 40 afirmaciones de A-Rasgo que consistió en los 20 reactivos A-Rasgo de la Forma B (revisada) y 20 reactivos adicionales obtenidos del conjunto de reactivos del Inventario sobre la base de su validez demostrada como medidas de A-Rasgo.
 - b. Se preparó también un conjunto de 40 afirmaciones de A-Estado. Estos reactivos incluyeron 20 reactivos de A-Estado de la Forma B (revisada), los reactivos adicionales que habían demostrado validez de A-Estado obtenidos de la investigación previa del IDARE y los reactivos nuevos contruidos sobre la base de investigaciones relacionadas con la medición de ansiedad-estado (Nowlis, 1965; Nowlis y Green, 1965; Zuckerman, 1960; Zuckerman y Biase, 1962).
 - c. Se eliminaron los términos modificadores (por ejemplo, ahora mismo, en este instante), incluidos en los reactivos A-Estado de la Forma B (revisada) para enfatizar lo inmediato de los sentimientos de los sujetos. Estos modificadores hicieron que los reactivos A-Estado fuesen menos adaptables a situaciones en las cuales se pide a los sujetos que reporten cómo se sintieron en una sesión de terapia o mientras trabajan en una tarea experimental. Además, se observó que el énfasis puesto en los sentimientos inmediatos para cada uno de los reactivos individuales, era necesario, si las instrucciones enfatizaban la condición A-Estado.
13. Los reactivos de la Forma B (revisada) del STAI junto con los reactivos de reemplazo potenciales, fueron aplicados a una muestra de estudiantes no graduados de la Universidad Estatal de Florida (139 mujeres, 124 varones), que se habían registrado en un curso de introducción a la psicología. Los reactivos A-Estado fueron aplicados dos veces durante la misma sesión de examen, primero con instrucciones estándar (Normal), enseguida con instrucciones para responder de acuerdo con lo que los sujetos creían que sentirían al presentar un examen en su curso de psicología (EXAM). Para cada uno de los reactivos A-Rasgo y A-Estado, se calcularon las correlaciones reactivo contra escala y se determinaron las correlaciones punto biseriales para cada reactivo A-Estado en las condiciones NORMAL y EXAM.
14. Seis de los 20 reactivos de A-Rasgo del STAI, Forma B (revisada) fueron reemplazados con reactivos comparables en contenido pero expresado en una forma más aceptable y 7 de los reactivos de los 20 reactivos de A-Estado fueron reemplazados de manera similar. La correlación reactiva contra escala para cada uno de los reactivos de reemplazo, resultó igual o mayor que la correlación del reactivo reemplazado. Además, cada reactivo de reemplazo de A-Estado discriminó mejor entre las condiciones NORMAL y EXAM que el reactivo reemplazado. Así pues, para cada reactivo que fue eliminado de la escala A-Estado o de la escala A-Rasgo, el reactivo de reemplazo no sólo fue similar en contenido, sino más apropiado y tenía una correlación reactivo contra escala mayor. Además, los reactivos de reemplazo a A-Estado permitieron una mejor discriminación entre las dos condiciones experimentales investigadas en el estudio final de selección de reactivos.
15. La revisión del Inventario que resultó de este proceso de reemplazo de reactivos se denominó Inventario de Autoevaluación SXE y SXR. Una copia del Inventario más reciente del IDARE aparece en las páginas 20 y 21 de este manual.

CLAVE DE CALIFICACION

Forma SXE

		CASI NADA	ALGO	MODERADO	MUCHO
1.	Asegúrese que tiene el lado correcto de ésta clave sobre la hoja de la prueba. Después simplemente sume las calificaciones de pesos que se muestran sobre la clave para cada categoría de respuestas. Una simple calculadora de escritorio o contador manual harán la labor más sencilla, pero puede hacerse mentalmente. Refiérase al manual para datos normativos apropiados	4	3	2	1
2.		4	3	2	1
3.		1	2	3	4
4.		1	2	3	4
5.		4	3	2	1
6.		1	2	3	4
7.		1	2	3	4
8.		4	3	2	1
9.		1	2	3	4
10.		4	3	2	1
11.		4	3	2	1
12.		1	2	3	4
13.		1	2	3	4
14.		1	2	3	4
15.		4	3	2	1
16.		4	3	2	1
17.		1	2	3	4
18.		1	2	3	4
19.		4	3	2	1
20.		4	3	2	1

© El Manual Moderno, S.A., 1975

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema alguno de tarjetas perforadas o transmitida por otro medio electrónico, mecánico, fotocopiador, registrador, etc., sin permiso por escrito de la editorial.



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical photocopying, recording or otherwise, without permission in writing from the publisher.

IDARE

CLAVE DE CALIFICACION

Forma SXR

	CASI NUNCA	A VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
21.	4	3	2	1
22.	1	2	3	4
23.	1	2	3	4
24.	1	2	3	4
25.	1	2	3	4
26.	4	3	2	1
27.	4	3	2	1
28.	1	2	3	4
29.	1	2	3	4
30.	4	3	2	1
31.	1	2	3	4
32.	1	2	3	4
33.	4	3	2	1
34.	1	2	3	4
35.	1	2	3	4
36.	4	3	2	1
37.	1	2	3	4
38.	1	2	3	4
39.	4	3	2	1
40.	1	2	3	4