

TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD (TLP)

Guía de información para pacientes y familiares

¿QUÉ ES EL TLP?

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es una condición de salud mental caracterizada por un patrón persistente de inestabilidad en las emociones, las relaciones con los demás y la imagen de uno mismo, junto con una marcada impulsividad.

- El TLP es una condición médica real — no es una debilidad de carácter ni una elección.
- Es tratable: la psicoterapia especializada es muy efectiva y la mayoría de las personas mejoran significativamente.
- No es su culpa. Se desarrolla por una combinación de factores genéticos y experiencias vitales fuera de su control.
- La recuperación es posible — muchas personas alcanzan una vida satisfactoria con el tratamiento adecuado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

No todas las personas experimentan todos los síntomas, y la intensidad puede variar.

Inestabilidad emocional Emociones intensas que cambian rápidamente. Episodios de tristeza, irritabilidad o ansiedad intensa. Sentimientos crónicos de vacío.	Relaciones inestables Relaciones intensas pero inestables. Miedo intenso al abandono. Tendencia a ver a las personas como perfectas o terribles, sin término medio.	Impulsividad Comportamientos impulsivos potencialmente dañinos. Dificultad para controlar la ira. Autolesiones o conducta suicida como forma de manejar el malestar.
Identidad inestable Imagen de sí mismo/a poco clara o cambiante. Incertidumbre sobre los propios valores, metas y quién se es realmente.	Síntomas disociativos En momentos de estrés intenso pueden aparecer episodios de desconfianza excesiva o sensación de irrealidad o de estar fuera del cuerpo.	

TRATAMIENTO

La psicoterapia especializada es el tratamiento de primera línea para el TLP. La mayoría de las personas mejoran significativamente con tratamiento continuado.

Psicoterapia

- Es el tratamiento principal y el más eficaz para el TLP.
- Ayuda a desarrollar habilidades para manejar las emociones intensas, mejorar las relaciones y reducir las conductas impulsivas.
- Requiere tiempo y compromiso — los beneficios aparecen con la práctica continuada.
- Consulte a su médico sobre el tipo de psicoterapia más adecuado para su caso.

Medicación

- No existe ningún medicamento aprobado específicamente para el TLP.
- Puede usarse de forma temporal para tratar síntomas concretos (ansiedad intensa, episodios depresivos) o en momentos de crisis aguda.

- La medicación no sustituye a la psicoterapia — es un apoyo complementario cuando está indicada.
- No suspenda ni modifique la medicación sin consultar a su médico.

ESTRATEGIAS PARA MOMENTOS DIFÍCILES

Cuando las emociones se vuelven muy intensas, estas estrategias pueden ayudar a atravesar el momento sin empeorar la situación:

Lo que puede ayudar	Lo que empeora la situación
• Distráigase con una actividad que requiera concentración. • Haga ejercicio físico intenso durante unos minutos. • Use sensaciones físicas para calmarse: agua fría en la cara, respiración lenta. • Llame a una persona de confianza. • Recuerde: las emociones intensas son temporales y pasan.	• Tomar decisiones importantes durante la crisis. • El consumo de alcohol o drogas. • El aislamiento total. • Actuar de forma impulsiva sin esperar a que la emoción disminuya.

Para familiares y personas cercanas

- El TLP puede ser difícil de entender — infórmese sobre la condición para responder con más comprensión.
- Mantenga una comunicación calmada, sin críticas ni invalidación de las emociones de la persona.
- Establezca límites claros y respetuosos — es compatible con el apoyo afectivo.
- No asuma toda la responsabilidad del bienestar de la persona: eso no ayuda y agota.
- Cuide también su propio bienestar. Busque apoyo si lo necesita.



Busque ayuda urgente si:

- Hay pensamientos de suicidio o autolesión que no puede manejar.
- Se ha producido un intento de suicidio o una autolesión grave.
- Hay pensamientos de hacer daño a otras personas.
- La persona no puede cuidar de sí misma.

Línea de Atención a la Conducta Suicida (Ministerio de Sanidad)	024
Urgencias / Psiquiatría de guardia (cualquier hospital público)	112