

[DATA DA COLETA : 05/03/2025 08:10]

TEMPO DE PROTROMBINA (TAP)

Método: coagulométrico

Tempo do paciente 12,5 segundos

Tempo do controle 12,0 segundos

Atividade de protrombina . 98 %

INR 1,05

Valores de referência: Atividade de 70 a 100 % — INR de 0,80 a 1,20. Pacientes em uso de anticoagulante oral: alvo terapêutico definido pelo médico assistente.

TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)

Tempo do paciente 41,3 segundos

Relação (R) 1,31

Valor de referência: 25 a 35 segundos.

FIBRINOGÊNIO

Resultado 4,6 g/L

Valor de referência: 2,0 a 4,0 g/L.

IMUNOLOGIA

Fator reumatoide 28,4 UI/mL (VR: até 14,0 UI/mL)

Imunoglobulina G 1840 mg/dL (VR: 700 a 1600 mg/dL)

Imunoglobulina A 210 mg/dL

Imunoglobulina M 96 mg/dL

Imunoglobulina E total ... 340 UI/mL

Complemento C3 72 mg/dL (VR: 90 a 180 mg/dL)

Complemento C4 8 mg/dL

TIREOIDE

TSH 6,40 µUI/mL

T4 livre 0,82 ng/dL

Anticorpos antitireoperoxidase (anti-TPO) ... 212,0 UI/mL (VR: até 34,0 UI/mL)