

Descriptive Statistics stratified by Treatment using Macro ggBaseline

Variables	Total (N=312)	Male (N=276)	Female (N=36)	P Value
'age in years'				0.0002
Mean±SD	50.0±10.6	49.2±10.2	56.2±11.5	
Min-Max	26.3-78.4	26.3-76.7	33.5-78.4	
Median (IQR)	49.8 (42.1-56.7)	48.9 (41.4-56.4)	54.6 (48.8-66.6)	
'serum bilirubin in mg/dl'				0.3580
Mean±SD	3.3±4.5	3.3±4.7	2.9±2.2	
Min-Max	0.3-28.0	0.3-28.0	0.6-8.6	
Median (IQR)	1.4 (0.8-3.5)	1.3 (0.8-3.4)	2.2 (1.4-3.8)	
'serum cholesterol in mg/dl'				0.8129
Nmiss (%)	28 (9.0)	27 (9.8)	1 (2.8)	
Mean±SD	369.5±231.9	370.5±238.7	362.5±179.0	
Min-Max	120.0-1775.0	120.0-1775.0	151.0-1000.0	
Median (IQR)	309.5 (249.0-400.0)	309.0 (252.0-395.0)	317.0 (243.0-427.0)	
'Treatment'				0.3263
Dpenicillamine	158 (50.6)	137 (49.6)	21 (58.3)	
placebo	154 (49.4)	139 (50.4)	15 (41.7)	
'presence of edema'				0.7998
edema despite diuretic therapy	20 (6.4)	17 (6.2)	3 (8.3)	
edema present without diuretics, or edema resolved by diuretics	29 (9.3)	25 (9.1)	4 (11.1)	
no edema and no diuretic therapy for edema	263 (84.3)	234 (84.8)	29 (80.6)	
'presence of ascites'				0.6850
Missing	28 (9.0)	27 (9.8)	1 (2.8)	
no	263 (92.6)	230 (92.4)	33 (94.3)	
yes	21 (7.4)	19 (7.6)	2 (5.7)	