

Билет 10. Свойства интегралов, зависящих от параметра, в случае, когда пределы интегрирования также зависят от параметра.

Пусть задана функция $f(x, y)$, определённая на прямоугольнике $[a, b] \times [c, d]$.

Пусть также заданы функции $\alpha(y)$ и $\beta(y)$, определённые при $y \in [c, d]$, причём для всех $y \in [c, d]$ выполняется:

$$\alpha(y), \beta(y) \in [a, b]$$

Определим функцию $G(y)$ как интеграл с переменными пределами:

$$G(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$$

*Рисунок.

Теорема о непрерывности по параметру

Пусть $f(x, y)$ — непрерывная функция двух переменных на $[a, b] \times [c, d]$.

Тогда для любого $y_0 \in [c, d]$:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} G(y) = G(y_0)$$

Доказательство:

Рассмотрим разность:

$$G(y) - G(y_0) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx - \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y_0) dx$$

Представим её как сумму трёх слагаемых:

$$G(y) = \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y) dx + \int_{\alpha(y)}^{\alpha(y_0)} f(x, y) dx + \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$$

Первое слагаемое:

$$\int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y) dx \rightarrow \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y_0) dx = G(y_0) \quad \text{при } y \rightarrow y_0,$$

поскольку $f(x, y)$ непрерывна по y равномерно по x (как непрерывная на прямоугольнике).

Второе и третье слагаемые:

$$\left| \int_{\alpha(y)}^{\alpha(y_0)} f(x, y) dx \right| \leq M \cdot |\alpha(y) - \alpha(y_0)| \rightarrow 0 \quad \text{при } y \rightarrow y_0,$$

если $\alpha(y)$ непрерывна в точке y_0 , и аналогично для $\beta(y)$, где $|f(x, y)| \leq M$ на прямоугольнике.

Таким образом, $G(y) \rightarrow 0$ при $y \rightarrow y_0$, т.е. $G(y)$ непрерывна в точке y_0 .

Теорема о дифференцируемости по параметру

Пусть:

- $f(x, y)$ определена и непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$,
- $f'_y(x, y)$ существует и непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$,
- $\alpha(y), \beta(y)$ непрерывно дифференцируемы на $[c, d]$,
- $\alpha(y), \beta(y) \in [a, b]$ для всех $y \in [c, d]$.

Тогда $G(y)$ дифференцируема на $[c, d]$, и её производная вычисляется по формуле Лейбница:

$$\exists G'(y_0) = \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} F'_y(x, y) dx - \alpha'(y_0)f(\alpha(y_0), y_0) + \beta'(y_0)f(\beta(y_0), y_0)$$

Доказательство:

Произвольным образом выбираем $\forall y_0 \in [c, d]$. Рассматриваем $G(y)$ и снова записываем ее в форме

$$\int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y) dx + \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx + \int_{\alpha(y)}^{\alpha(y_0)} f(x, y) dx$$

Ищем производную от этой функции. Первое слагаемое - пределы не зависят от y и выполнены все условия о дифференцируемости под знаком интеграла. Значит у первого слагаемого производная есть, и она равна $\int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f'_y(x, y) dx$. Для второго слагаемого, которое мы обозначим $\Psi(y) = \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$, то чтобы вычислить производную (используя теорему о среднем значении интеграла)

$$\begin{aligned} \Psi(y_0) &= \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{\Psi(y) - \Psi(y_0)}{y - y_0} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{1}{y - y_0} \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx = \\ &= \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{(\beta(y) - \beta(y_0))}{y - y_0} f(\beta(y_0) + \theta(\beta(y) - \beta(y_0)), y_0), \theta \in [0, 1] \end{aligned}$$

А в пределе мы получим $(\beta'(y_0))f(\beta(y_0), y_0)$ (по определению производной первый множитель и по непрерывности f второй множитель). Аналогичным образом получим производную от третьего слагаемого, и она будет равна $-\alpha'(y_0)f(\alpha(y_0), y_0)$ (минус вылезет из-за того, что нам нужно будет перевернуть пределы интегрирования, чтобы $\alpha(y)$ было наверху). Собирая получим:

$$G'(y_0) = \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f'_y(x, y) dx + \beta'(y_0)f(\beta(y_0), y_0) - \alpha'(y_0)f(\alpha(y_0), y_0)$$

Теорема доказана.