


**Άσκηση 1 [5μ]**

Δείξτε γραφικά ποια θα είναι τα δυο πρώτα βήματα εύρεσης της ρίζας της συνάρτησης  $f(x)$  που φαίνεται στο παρακάτω γράφημα ξεκινώντας από τις δύο αρχικές τιμές  $x_1 = -0.5$  και  $x_2 = 0.0$  και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Secant.


**Απάντηση:**

Η μέθοδος της χορδής μοιάζει με την μέθοδο του Newton και η προσεγγιστική λύση είναι της μορφής:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Όπου τον ρόλο της παραγώγου (κλίση της καμπύλης στο σημείο  $x_n$ ) το παίζει η κλίση του ευθύγραμμου τμήματος (χορδής) που ορίζεται από δύο σημεία.

Επομένως προεκτείνουμε το ευθύγραμμο τμήμα μέχρι να τέμνει τον  $x$ -άξονα. Το σημείο στο οποίο τέμνει τον άξονα, το χρησιμοποιούμε μαζί με το 2<sup>ο</sup> σημείο του πρώτου ευθύγραμμου τμήματος για να ορίσουμε ένα νέο ευθύγραμμο τμήμα το οποίο θα τέμνει τον  $x$ -άξονα σε ένα σημείο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου το σημείο που θα βρεθεί δίνει είτε  $f(x)=0$  ή η τιμή της  $|f(x)| < \epsilon$ .



### Άσκηση 2 [5μ]

Χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Newton για να βρείτε μια λύση της  $f(x)$  όπου η συνάρτηση  $f(x) = x^3 - x^2 + 2$ . Αν η αρχική σας υπόθεση για λύση ήταν η  $x_0 = 2.0$ , ποια θα είναι η πρόβλεψη της μεθόδου Newton για την επόμενη προσεγγιστική λύση.

#### Απάντηση:

Η μέθοδος Newton δίνει την λύση της εξίσωσης σύμφωνα με τη σχέση:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - x_n^2 + 2}{3x_n^2 - 2x_n}$$

Όπου αντικαταστήσαμε για  $f(x_n) = x_n^3 - x_n^2 + 2$  και  $f'(x_n) = 3x_n^2 - 2x_n$ .

Επομένως η πρόβλεψη της μεθόδου Newton για την επόμενη προσεγγιστική λύση,  $x_{n+1}$ , όταν η  $x_n = 2.0$  θα είναι:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - x_n^2 + 1}{3x_n^2 - 2x_n} = 2.0 - \frac{8 - 4 + 2}{8} = 2 - \frac{6}{8} = 2 - \frac{3}{4} = \frac{5}{4} \Rightarrow x_{n+1} = 1.25$$

### Άσκηση 3 [5μ]

Η απόλυτη τιμή του σχετικού σφάλματος της προσεγγιστικής λύσης μιας εξίσωσης  $f(x) = 0$ , με τη μέθοδο της bisection δίνεται από την εξίσωση:  $|\epsilon_a| = \left| \frac{x_m^n - x_m^o}{x_m^n} \right|$  όπου  $x_m^n$  είναι η νέα λύση στο μέσο του διαστήματος και  $x_m^o$  είναι η προηγούμενη λύση. Θεωρήστε ότι τα όρια του διαστήματος είναι  $x_u$  και  $x_l$ . Στο τέλος της διεργασίας εύρεσης της λύσης, το σχετικό προσεγγιστικό σφάλμα στην εκτίμηση της τιμής της λύσης είναι ένα από τα παρακάτω. Δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας.

(α)  $\left| \frac{x_u}{x_u + x_l} \right|$     (β)  $\left| \frac{x_l}{x_u + x_l} \right|$     (γ)  $\left| \frac{x_u - x_l}{x_u + x_l} \right|$     (δ)  $\left| \frac{x_u + x_l}{x_u - x_l} \right|$

#### Απάντηση:

Ξέρουμε ότι η απόλυτη τιμή του σχετικού σφάλματος μιας προσεγγιστικής λύσης είναι:  $|\epsilon_a| = \left| \frac{x_m^n - x_m^o}{x_m^n} \right|$ . Σύμφωνα με την μέθοδο bisection, η λύση βρίσκεται στο μέσο του διαστήματος:  $x_m^n = \frac{x_u + x_l}{2}$ , όπου  $x_u$  και  $x_l$  τα όρια του εκάστοτε διαστήματος που περιέχει τη λύση. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας, η προηγούμενη προσεγγιστική λύση  $x_m^o$  αποτελεί είτε το πάνω ή το κάτω όριο του διαστήματος για την επόμενη λύση.

Έστω  $x_m^o = x_l$ . Θα έχουμε:  $|\epsilon_a| = \left| \frac{\frac{x_l + x_u}{2} - x_l}{\frac{x_l + x_u}{2}} \right| = \left| \frac{(x_l + x_u) - 2x_l}{(x_l + x_u)} \right| = \left| \frac{x_u - x_l}{x_l + x_u} \right|$

Έστω  $x_m^o = x_u$ . Θα έχουμε:  $|\epsilon_a| = \left| \frac{\frac{x_l + x_u}{2} - x_u}{\frac{x_l + x_u}{2}} \right| = \left| \frac{(x_l + x_u) - 2x_u}{(x_l + x_u)} \right| = \left| \frac{x_l - x_u}{x_l + x_u} \right| = \left| \frac{x_u - x_l}{x_l + x_u} \right|$

Η απάντηση είναι η ίδια, ανεξάρτητα αν η προηγούμενη λύση αποτελεί το πάνω ή κάτω όριο για το επόμενο διάστημα γιατί η νέα λύση είναι πάντοτε στο μέσο του διαστήματος.