

Материалы для подготовки к коллоквиуму
по дискретной математике
Теоремы

ПМИ 2016

Орлов Никита, Рубачев Иван, Ткачев Андрей, Евсеев Борис

12 декабря 2016 г.

1. Вывод принципа полной математической индукции из принципа математической индукции

Принцип математической индукции. Если для утверждения зависящего от положительного натурального n выполняются следующие условия:

- 1. Утверждение истинно при $n = 1$
- 2. Когда утверждение истинно при $n = k$, оно истинно и при $n = k + 1$

Тогда утверждение истинно при всех положительных n .

Принцип полной математической индукции. Если для утверждения зависящего от положительного натурального n выполняются следующие условия:

- 1. Утверждение истинно для $n = 1$
- 2. Если утверждение истинно для всех $n \leq k$, оно также истинно и для $n = k + 1$

Тогда утверждение истинно при всех положительных n .

Утверждение. Если уместна математическая индукция, то уместна и сильная индукция.

Доказательство. В дальнейших рассуждениях будем считать, что n - натуральное, большее или равное 1, а также обозначим утверждение зависящее от n за $\varphi(n)$.

Предположим, что для $\varphi(n)$ выполняются условия (1) и (2) для сильной индукции.

Пусть $\psi(k) \Leftrightarrow \langle \varphi(n) \text{ истинно для всех } n \leq k \rangle$.

Попытаемся доказать, что утверждение $\psi(n)$ истинно для всех положительных натуральных n по индукции. Как следствие, мы получим, что и $\varphi(n)$ верно для всех положительных n , т.е. тот же вывод, который должен дать принцип сильной индукции.

База. В силу нашего предположения $\varphi(1)$ истинно (гипотеза (1) сильной индукции верна), но тогда истинно и $\psi(1)$, по определению $\psi(n)$.

Предположение. Пусть верно $\psi(k)$.

Шаг. Мы предположили, что для $\varphi(n)$ выполняются гипотезы сильной индукции, а значит, если $\langle \varphi(n) \text{ верно для всех } n \leq k \rangle$, то и $\varphi(k + 1)$ - верно. По предположению индукции - $\psi(k) \Rightarrow \varphi(k + 1)$ (см. определение $\psi(n)$ и гипотезу (2) сильной индукции). Получаем, что $\psi(k + 1)$ - истинно, т.к. $\varphi(n)$ истинно для всех $n \leq k + 1 \Rightarrow \psi(k + 1)$.

Согласно принципу мат. индукции $\psi(k)$ - верно для всех положительных k , значит утверждение $\langle \varphi(n) \text{ истинно для всех } n \leq k \rangle$ верно при всех k , а значит $\varphi(n)$ - верно для всех n .

Таким образом, из принципа мат. индукции следует принцип полной мат. индукции. \square

2. Бином Ньютона. Формула для биномиальных коэффициентов

Число сочетаний из n по k равно:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Доказательство. На первое место можно поставить любой из n элементов, на второе любой из $n - 1$ оставшихся, ..., на k -е любой из $n - k + 1$. Тогда по правилу произведения существует $n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - k + 1)$ упорядоченных наборов. Но порядок нам не важен, поэтому существует $\frac{n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - k + 1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n - k)!}$ неупорядоченных наборов. \square

Формула бинома Ньютона имеет вид:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{k}a^{n-k}b^k + \dots + \binom{n}{n}b^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k$$

Доказательство. Раскрытие скобок даст все возможные комбинации a и b длины n . Так как умножение коммутативно, то элементы с одинаковым количеством b можно сгруппировать. Тогда перед $a^{n-k}b^k$ будет стоять коэффициент c . Количество слагаемых, в которых b встречается ровно k раз равно $\binom{n}{k}$. Тогда $c = \binom{n}{k}$, а значит:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}a^{n-k}b^k$$

□

4. Задача Муавра (решение уравнения $x_1 + \dots + x_m = k$)

Утверждение. Число решений уравнения $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ в неотрицательных целых числах равно $\binom{n+k-1}{k-1}$

Доказательство. Воспользуемся методом «шаров и перегородок». Пусть есть n шаров и $k-1$ перегородок, тогда какая-то их расстановка однозначно задаёт решение уравнения: x_1 — количество шаров перед первой перегородкой, x_2 — между 1 и 2, и так далее, количество шаров после последней перегородки — x_k . Тогда число решений равно $\binom{n+k-1}{k-1}$.

Докажем справедливость данной формулы. Рассмотрим n одинаковых объектов, добавим к ним ещё $k-1$ таких же объектов. Тогда, заменив какие-то $k-1$ объектов на перегородки, мы получим разбиение множества из n элементов на k непересекающихся подмножеств.

5. Доказательство формулы включений и исключений

Определение (Формула включений и исключений.). *Формула включений-исключений — комбинаторная формула, позволяющая определить мощность объединения конечного числа конечных множеств, которые в общем случае могут пересекаться друг с другом.*

Утверждение. Пусть A_1, A_2, \dots, A_n — конечные множества. Формула включений-исключений утверждает:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|.$$

Доказательство. Рассмотрим произвольный элемент $x \in \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right|$, входящий в ровно S множеств A_{q_1}, \dots, A_{q_S} и подсчитаем, сколько раз он учитывается в правой части формулы включений-исключений (вернее покажем, что учитывается ровно 1 раз):

- В первой сумме $\sum_i |A_i|$ элемент x посчитан ровно $\binom{S}{1} = S$ раз (В слагаемых A_{q_1}, \dots, A_{q_S}).
- Во второй сумме $\sum_{i < j} |A_i \cap A_j|$ элемент x посчитан ровно $\binom{S}{2}$ раз (количество попарных пересечений $A_i \cap A_j$, таких, что $A_i, A_j \in A_{q_1}, \dots, A_{q_S}$).
- В третьей сумме $\sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k|$ x будет посчитан $\binom{S}{3}$ раза (количество пересечений $A_i \cap A_j \cap A_k$ для которых $i, j \in q_1, \dots, q_S$).
- ...
- В S -ой сумме $\sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_S} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_S}|$ x будет посчитан $\binom{S}{S} = 1$ раз (x войдет только в слагаемое $|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$).
- суммы, содержащие $S+1$ и более пересечений, не учитывают элемент x , поскольку x не входит в пересечение более чем S множеств.

Таким образом x оказывается посчитанным ровно $S - \binom{S}{2} + \binom{S}{3} - \dots + (-1)^{S+1} \binom{S}{S}$ раз. Покажем, что эта сумма в точности равна 1. Воспользуемся биномом Ньютона:

$$0 = (1-1)^S = \sum_{k=0}^S \binom{S}{k} \cdot 1^{S-k} \cdot (-1)^k = 1 - \sum_{k=1}^S \binom{S}{k} \cdot 1^{S-k} \cdot (-1)^{k+1}$$

\Updownarrow

$$1 = \sum_{k=1}^S \binom{S}{k} \cdot (-1)^{k+1} = S - \binom{S}{2} + \binom{S}{3} - \dots + (-1)^{S+1} \binom{S}{S}$$

Таким образом, каждый $x \in \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right|$ учитывается и левой и правой частью формулы ровно 1 раз, и очевидно, что все прочие $y \notin \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right|$ не учитываются ни правой, ни левой частями. \square

6. Формулы для суммы степеней вершин в неориентированном и в ориентированном графе

Определение. Сумма степеней всех вершин в неориентированном графе равна удвоенному числу ребер. $\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2 \cdot |E(G)|$

Доказательство. Пусть в графе степень каждой вершины равна 0 (в графе нет ребер). При добавлении ребра, связывающего любые две вершины, сумма всех степеней увеличивается на 2 единицы. Таким образом, сумма всех степеней вершин четна и равна удвоенному числу ребер. \square

Определение. Число исходящих степеней вершин равно числу входящих, равно числу ребер.

Доказательство. Первая часть утверждения очевидна. Каждое ребро выходит из одной вершины и входит в другую, поэтому каждое ребро дает одинаковый вклад в суммы исходящих и входящих степеней вершин. Для доказательства второй части утверждения докажем что число ребер равно числу исходящих степеней вершин. Исходящая степень вершины равна числу ребер, которые из нее выходят. Ребро не может выходить более чем из одной вершины, поэтому сумма исходящих степеней вершин равна числу ребер. По транзитивности отношения «=» число ребер равно также и сумме исходящих вершин. \square

8. Критерий двураскрашиваемости графа.

Утверждение. Неориентированный граф является 2-раскрашиваемым тогда и только тогда, когда в нём нет циклов нечётной длины.

Доказательство. \Rightarrow Пусть в графе есть цикл нечётной длины. Покрасим какую-то вершину цикла в первый цвет и будем двигаться по нему в одном направлении, крася каждую следующую вершину в противоположный цвет. Тогда, вернувшись в исходную вершину, получим противоречие.

\Leftarrow Пусть циклов нечётной длины нет. Выберем произвольную вершину A и покрасим её в первый цвет. Для любой другой вершины B рассмотрим количество рёбер в пути $A \rightarrow B$.

Если есть два пути $A \rightarrow B$ таких, что в одном чётное число рёбер, а в другом – нечётное, то есть цикл с нечётным числом рёбер, который получается, если пройти $A \rightarrow B$ по первому пути и вернуться $B \rightarrow A$ по второму.

Следовательно, между любыми двумя вершинами все пути либо чётной, либо нечётной длины. Раскрасить граф можно следующим образом:

- выделим остовное дерево, раскрасим корень в первый цвет
- раскрасим его потомков во второй цвет

- для каждого из потомков раскрасим всех его потомков опять в первый цвет, и.т.д

Полученная раскраска будет корректной, так как в остовном дереве любой путь между вершинами одного цвета имеет чётную длину (по построению), а по доказанному выше путей нечётной длины между такими вершинами нет.

9-10. Деревья – это в точности минимально связные графы

Доказательство.

[\Rightarrow] Докажем индукцией по числу вершин. База: для $n = 2$ существует лишь одно дерево, для которого утверждение очевидно. Предположим это для некоторого дерева G_n на n вершинах, в котором $n - 1$ ребро. Шаг для $n + 1$: добавляя одну вершину u , нужно связать её с графом G_n , то есть соединить с некоторыми вершинами. Если бы мы соединили её с двумя вершинами v_1 и v_2 , то у нас в графе G_{n+1} получился бы цикл, так как в G_n уже существовал путь $v_1, a_1, a_2, \dots, a_k, v_2$, а значит в G_{n+1} существует цикл $v_1, a_1, a_2, \dots, a_k, v_2, u, v_1$, а значит G_{n+1} – не дерево. Значит, при добавлении вершины мы можем добавить не более одного ребра (а для сохранения связности ещё и более 0), значит G_{n+1} должен содержать $n - 1 + 1 = n$ рёбер, что означает, что предположение индукции выполнено и для $n + 1$.

[\Leftarrow] Для начала докажем что в связном графе не может меньше чем $n - 1$ ребро по индукции. База: для $n = 2$ граф на 2-ух вершинах, все очевидно. Шаг для $n + 1$: если для n вершин утверждение верно, то для $n + 1$ вершины оно тоже будет верно, так как нужно связать добавленную вершину как минимум с одним ребром (то есть ребер станет не менее чем $n - 1 + 1 = n$). Пусть у нас есть связный граф на n вершинах, с $n - 1$ ребрами и в этом графе есть циклы. Из некоторого цикла удалим ребро соединявшее вершины u и v , при этом граф останется связным, но в нем будет уже $n - 2$ ребра – получили противоречие. Значит в таком минимально связном графе нет циклов, то есть этот граф – дерево. \square

12. Эквивалентность определений дерева и графа с простым путём между любыми двумя вершинами.

Утверждение. *Дерева это в точности графы, в которых для любых двух вершин есть ровно один простой путь с концами в этих вершинах.*

Доказательство. \Rightarrow

По определению дерева оно является связным графом без циклов. Рассмотрим какие-то две вершины a и b . Докажем, что существует ровно один простой путь между ними.

Поскольку дерево по определению связно, путь есть. Докажем его единственность.

Если есть несколько путей, то маршрут из a в b по первому пути и обратно по другому пути будет являться циклом – значит, путь только один.

\Leftarrow

Рассмотрим две вершины a и b данного графа, по условию между ними существует простой путь. Если таких путей несколько, то маршрут из a в b по первому пути и обратно по другому пути будет являться циклом. Следовательно, путей не более одного. Если же такого пути нет, то вершина b не достижима из a , то есть граф не связен. Следовательно, такой граф является деревом.

13. Существование остовного дерева

Определение. *Частичный граф* исходного графа $G = (V, E)$ – граф $G' = (V, E')$, $E' \subseteq E$.

Определение. *Остовное дерево* связного графа $G = (V, E)$ – всякий его частичный граф, являющийся деревом.

Лемма. *Если граф связен, то у него есть остовное дерево.*

Доказательство. Для начала докажем вспомогательную лемму:

Лемма. *Если граф связен и содержит хотябы один цикл, то из него можно удалить ребро не нарушая связности.*

Доказательство леммы. Пусть $G = (V, E)$ и цикл в нем: $u_0 \rightarrow u_1 \rightarrow \dots u_n \rightarrow u_0$, $u_i \in V$. Поймем, что если удалить любое ребро принадлежащее циклу, связность не нарушится. Покажем в частности, что можно удалить ребро (u_0, u_1) . Действительно, если есть какой-нибудь путь из $v \in V$ в $w \in V$, проходящий через ребро (u_0, u_1) , то существует путь проходящий через прочие ребра цикла, ведь в цикле до каждой вершины можно дойти хотя бы двумя разными путями, значит удаление ребра не изменит того факта, что v соединено путем с w . Если пути из v к w не содержат ребра (u_0, u_1) , то очевидно, что его удаление на их связи не отразится \Rightarrow граф без этого ребра останется связанным. Тогда удалим его и получим связный граф. \square

Пусть теперь $G = (V, E)$ – связный граф, для которого нужно доказать существование остовного дерева. Возможны два сценария:

1. Граф G – связный граф без циклов.
2. В графе G есть хотя бы один цикл.

В первом случае G – дерево по определению, а значит сам является своим остовным деревом.

Во втором случае, по доказанной лемме, мы можем удалить из G ребро не нарушая связности. Так сделаем же это. Если полученный граф – циклический, то снова удалим ребро не нарушая связности, иначе остановимся и порадуемся; индуктивно будем повторять описанные

операции, на каждой итерации имея связный граф; число ребер в графе - конечно, значит процесс не может продолжаться вечно \Rightarrow в какой-то момент мы не сможем удалить ребро не нарушая связности, что было бы не возможно, если бы в графе остался цикл. В ходе описанных операций мы не добавляли новых ребер и не удаляли вершин \Rightarrow если $G' = (V', E')$ - итоговый граф, то $V' = V$, $E' \subseteq E \Rightarrow G'$ - частичный граф графа G , связный и без циклов, т.е. дерево $\Rightarrow G'$ по определению - остовное дерево графа G . \square

16. Критерий Дирака гамильтоновости графа.

Утверждение. Критерий Дирака: граф G на n вершинах содержит гамильтонов цикл, если каждая вершина графа имеет степень не меньшую, чем $\frac{n}{2}$.

Доказательство. Рассмотрим самую длинную простую цепь в графе, обозначим её $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \rightarrow x_m$. Докажем, что существует вершина x_i такая, что $x_i \rightarrow x_m$ и $x_{i+1} \rightarrow x_1$.

Выберем из множества вершин этой цепи два подмножества номеров вершин ($1 \leq i \leq m-1$):

- множество вершин из цепи, соединённых с последней вершиной x_m , то есть $A = \{i | (x_i, x_m) \in E\}$
- множество вершин из цепи, соединённых со первой вершиной x_1 , то есть $B = \{i | (x_1, x_{i+1}) \in E\}$

Все соседние с вершиной x_m , находятся среди $x_1 \dots x_{m-1}$, так как в противном случае существует некая вершина x_k вне цепи и данная цепь не является самой длинной. Тогда в A лежат не меньше, чем половина вершин в графе, то есть $|A| \geq \frac{n}{2}$, аналогично $|B| \geq \frac{n}{2}$.

Поскольку всего в графе n вершин, пересечение множеств A и B непусто, то есть найдётся вершина x_j с номером j такая, что она соединена с x_1 и x_m . Тогда рассмотрим цепь $x_{j+1} \rightarrow x_{j+2} \rightarrow \dots \rightarrow x_m \rightarrow x_j \rightarrow x_{j-1} \rightarrow \dots \rightarrow x_2 \rightarrow x_1 \rightarrow x_{j+1}$, то есть простой цикл на m вершинах.

Если существует некая вершина вне этой цепи, то данная цепь не является самой длинной. Следовательно, в ней присутствуют все вершины из графа, то есть $m = n$, а найденный цикл является гамильтоновым. \square

17. Сравнение $ax \equiv 1 \pmod{N}$ имеет решение тогда и только тогда, когда $(a, N) = 1$

Замечание. Здесь и далее условимся обозначать НОД(a, N), как (a, N) .

Утверждение. Сравнение $ax \equiv 1 \pmod{N}$ имеет решение $(1) \Leftrightarrow (a, N) = 1$ (2).

Доказательство. Докажем следствие $(1) \Rightarrow (2)$

$$ax - 1 \equiv 0 \pmod{N}$$

$$\Downarrow$$

$$N | (ax - 1)$$

$$\Downarrow$$

$$(ax - 1) = Nk, k \in \mathbb{Z}.$$

Пусть $(a, N) = b$ ($1 \leq b$, т.к. 1 - всегда делитель). Тогда $a = a' \cdot b$, $N = N' \cdot b \Rightarrow$

$$a'bx - 1 = N'bk$$

↓

$$1 = b(a'x - N'k)$$

По определению $b|1$, но тогда $|b| \leq 1$, но тогда $b = 1 \Rightarrow (a, N) = 1$.

Докажем следствие (2) \Rightarrow (1): (2) $\Rightarrow (a, N) = 1$, тогда по соотношению Безу $\exists m, k : am + Nk = 1 \Rightarrow am = 1 - Nk \Rightarrow am \equiv 1 \pmod{N}$, и $x = m$ - решение сравнения $ax \equiv 1 \pmod{N}$. \square

18. Признаки делимости на 3, 9 и 11

Число x делится на 3 (на 9) тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3 (на 9)

Доказательство. Пусть $x = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0} = 10^n a_n + 10^{n-1} a_{n-1} + \dots + 10a_1 + a_0$. Так как $10 \equiv 1 \pmod{3}$, то:

$$x \equiv \sum_{i=0}^n a_i \pmod{3}$$

Для делимости на 9 доказательство аналогично. \square

Число x делится на 11, тогда и только тогда, когда:

$$11 \mid \left(\sum_{2|i}^n a_i - \sum_{2 \nmid i}^n a_i \right)$$

Доказательство. $10 \equiv -1 \pmod{11}$, значит $10^n \equiv (-1)^n \pmod{11}$. Тогда:

$$x \equiv (-1)^n a_n + (-1)^{n-1} a_{n-1} + \dots + (-1)a_1 + a_0 \equiv \sum_{2|i}^n a_i - \sum_{2 \nmid i}^n a_i \pmod{11}$$

\square

21. Корректность алгоритма Евклида и расширенного алгоритма Евклида.

Алгоритм Евклида. Пусть a и b - целые числа одновременно не равные нулю, и последовательность чисел $x_0 > x_1 > x_2 > x_3 > \dots > x_n > 0$ определена тем, что $x_0 = a$, $x_1 = b$, каждое x_k , $k > 1$ — это остаток от деления предпредыдущего числа на предыдущее, а предпоследнее делится на последнее нацело, то есть:

$$a = x_0 q_1 + x_1,$$

$$b = x_1 q_2 + x_2,$$

$$x_2 = x_3 q_3 + x_4,$$

...

$$x_{k-2} = x_{k-1} q_{k-1} + x_k,$$

...

$$x_{n-2} = x_{n-1} q_{n-1} + x_n,$$

$$x_{n-1} = x_n q_n.$$

Тогда (a, b) равен x_n , последнему ненулевому члену этой последовательности.

Доказательство. Поймем, что такие $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_n$ - существуют, причем единственно: всегда можно найти остаток m (причем единственным образом) при делении x_k на x_{k+1} , если $x_{k+1} \neq 0$, причем $a > b > r_k > x_{k+1} > m$, т.е. каждый следующий член последовательности строго меньше предыдущего, но т.к. числа ее составляющие - целые, то убывать бесконечно она не может, а значит $\exists x_{n+1} = 0$ - последний член последовательности.

Докажем тогда, что если x_n - последний не нулевой член последовательности, то $(a, b) = (x_n, 0) = x_n \neq 0$. Для этого заметим две вещи:

1. $r \neq 0 \Rightarrow (r, 0) = |r|$ так как 0 делится на любое целое число, кроме нуля.
2. Пусть $a = bq + r$, тогда $(a, b) = (b, r)$. Пусть k - любой общий делитель чисел a и b , не обязательно наибольший, тогда $a = t_1 k$ и $b = t_2 k$, где t_1 и t_2 - целые числа из определения.

Тогда k является также общим делителем чисел b и r , так как b делится на k по определению, а $r = a - b \cdot q = (t_1 - t_2 \cdot q) \cdot k$ (выражение в скобках есть целое число, следовательно, k делит r без остатка).

Обратное также верно. Любой делитель k чисел b и r так же является делителем a и b : $a = b \cdot q + r = k \cdot (b'q + r') \Rightarrow k|a$.

Следовательно, все общие делители пар чисел a, b и b, r совпадают. Другими словами, нет общего делителя у чисел a, b , который не был бы также делителем b, r , и наоборот.

В частности, наибольший общий делитель остается тем же самым. Что и требовалось доказать.

Тогда по построению последовательности $\{x_i\} : (x_0, x_1) = (x_1, x_2) = (x_2, x_3) = \dots = (x_n, 0) = x_n$. \square

Алгоритм Евклида (Расширенный алгоритм Евклида). *Формулы для x_i могут быть переписаны следующим образом:*

$$\begin{aligned} x_0 &= aq_0 + bp_0, \\ x_1 &= aq_1 + bp_1, \\ x_2 &= aq_2 + bp_2, \\ x_3 &= aq_3 + bp_3, \\ &\vdots \\ (a, b) &= x_n = as + bt \end{aligned}$$

Т.е. $\text{НОД}(a, b)$ можно представить в виде $ax + by$, где x, y - какие-то целые числа.

Доказательство. Докажем по индукции по n .

База. $x_0 = a + b \cdot 0$, $x_1 = a \cdot 0 + b$. Т.е. $q_0 = P_1 = 1$, $p_0 = q_1 = 0$

Предположение. Пусть $x_{k-2} = aq_{k-2} + bp_{k-2}$ и $x_{k-1} = aq_{k-1} + bp_{k-1}$.

Шаг. Докажем, что $x_k = aq_k + bp_k$, где q_k, p_k - целые. Мы помним, что x_k - остаток от деления x_{k-2} на x_{k-1} , значит по определению: $m \cdot x_{k-1} + x_k = x_{k-2}$, где m - какое-то целое число. Тогда $x_k = x_{k-2} - m \cdot x_{k-1}$, по п.и., $x_k = aq_{k-2} + bp_{k-2} - m(aq_{k-1} + bp_{k-1}) = a(q_{k-2} - mq_{k-1}) + b(p_{k-2} - mp_{k-1}) = aq_k + bp_k$.

Таким образом каждое из чисел x_i представимо в виде линейной комбинации a и b (В частности, если $(a, b) = 1$, то $\exists x, y : ax + by = 1$). \square

25. Доказательство корректности определения классов эквивалентности

Теорема. Для любого отношения эквивалентности на множестве A множество классов эквивалентности образует разбиение множества A . Обратно, любое разбиение множества A задает на нем отношение эквивалентности, для которого классы эквивалентности совпадают с элементами разбиения.

Доказательство. Докажем прямое следствие.

Каждому $x \in A$ сопоставим $[x] = \{y \mid x \sim y\}$ - по-множеству множество всех элементов с которыми x вступает в отношение \sim .

Утверждается, что система подмножеств $[x]$ образует разбиение A . Действительно, во-первых, каждое подмножество $[x] \neq \emptyset$, так как в силу рефлексивности отношения $x \sim x \Rightarrow x \in [x]$.

Во-вторых, два различных подмножества $[x]$ и $[y]$ не имеют общих элементов. Рассуждая от противного, допустим существование элемента z такого, что $z \in [x]$ и $z \in [y]$. Тогда $z \sim x$ и $z \sim y$. Поэтому для любого элемента $t \in [x]$ из $t \sim x$, $z \sim x$ и $z \sim y$ в силу симметричности и транзитивности отношения а вытекает aPy ($t \sim x$ и $x \sim z \Rightarrow tPz$, но $z \sim y \Rightarrow t \sim y$), то есть $a \in [y]$. Следовательно, $[x] \subseteq [y]$. Аналогично получаем, что $[y] \subseteq [x]$. Полученные два включения влекут равенство $[x] = [y]$, противоречащее предположению о несовпадении подмножеств $[x]$ и $[y]$. Таким образом, $[x] \cap [y] = \emptyset$.

В-третьих, объединение всех подмножеств $[x]$ (классов эквивалентности) совпадает со множеством A , ибо для любого элемента $x \in A$ выполняется условие $x \in [x]$.

Итак, система подмножеств эквивалентности $[x]$, образует разбиение множества A .

Обратное следствие.

Пусть есть разбиение A на непересекающиеся множества M_0, \dots, M_1 . Тогда отношение эквивалентности на A задается так:

$$a \sim b \leftrightarrow (a \in M_i \wedge b \in M_i)$$

Свойства транзитивности, рефлексивности и симметричности очевидны (Например для транзитивности: $a \sim b$ и $b \sim c$, значит $(a \in M_i \wedge b \in M_i) \wedge (b \in M_i \wedge c \in M_i) \Leftrightarrow (a \in M_i \wedge c \in M_i) \Leftrightarrow a \sim c$). Тогда, два элемента принадлежат одному классу тогда и только тогда, когда они лежат в одном подмножестве M_i , т.е. классы задаются разбиением. \square

29. Критерий существования функции, обратной к данной. Критерий биекции в терминах обратной функции

Критерий существования функции, обратной к данной. Пусть f - функциональное соответствие $f : X \rightarrow Y$. Тогда обратное соответствие: $f^{-1} = (y, x) \mid (x, y) \in f \Leftrightarrow f(x) = y$.

Замечание. f^{-1} - функционально $\Leftrightarrow f$ - инъективно.

Доказательство. Докажем \rightarrow .

Из того, что f^{-1} - функционально $\Rightarrow \forall y \in Y : f^{-1}(y) = x$ и $f^{-1}(y) = x' \Leftrightarrow x = x' \Rightarrow$ если $f(x) = f(x') = y$, то $f^{-1}(y) = x = x'$, что и означает инъективность f .

Докажем \leftarrow .

Из инъективности $f \Rightarrow \forall y \in Y : f(x) = y$ и $f(x') = y \Leftrightarrow x = x' \Rightarrow$ если $(y, x) \in f^{-1}$ и $(y, x') \in f^{-1}$, то $x = x' \Rightarrow f^{-1}$ - функционально. \square

Критерий биекции в терминах обратной функции

Теорема. *Критерием биективности:*

1. Если f - биекция $A \leftrightarrow B$, то $f \circ f^{-1} = id_B$ и $f^{-1} \circ f = id_A$.
2. Если f - функция $A \rightarrow B$ и существует $g : B \rightarrow A$, такая что $f \circ g = id_B$ и $g \circ f = id_A$, то $f^{-1} = g$ и f - биекция.

Доказательство. Утверждение 1 проверяется непосредственно, по свойствам биекции: $\forall a \in A : f^{-1} \circ f(a) = a$ и $\forall b \in B : f \circ f^{-1}(b) = b$.

Докажем 2, проверив f на свойства биекции.

Всюду определенность. Если f не всюду определена, то $g \circ f(x) = g(f(x))$ - не всюду определена, а значит не тождественна, что противоречит гипотезе. Значит f - тотальна.

Инъективность. Пусть $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow x_1 = x_2$.

Сюръективность. Пусть f не принимает значение $b \in B$, тогда $f(g(\dots))$ не принимает значение b , значит $f \circ g$ - не тождественна, что противоречит условию. Тогда $\forall b \in B : \exists a \in A : f(a) = b$.

Таким образом f - биекция. Тогда очевидно, что $g = f^{-1}$ (проверяется поэлементно из композиции $g \circ f = id_A$, $f \circ g = id_B$: $(a, b) \in f \Rightarrow (b, a) \in g$ и аналогично, если $(b, a) \in g$, то $(a, b) \in f$). \square