

Evaluación de la transmisión vertical intrauterina de Covid-19 infección en nueve bebés nacidos a Madres infectadas, encontraron que ninguno de los Los bebés probaron positivos para el virus. \* ° Igualmente, No hubo evidencia de infección intrauterina. causado por la transmisión vertical en el SARS y Mers epidemias. \* °

El CDC afirma que los bebés nacen a las madres. con covid-19 confirmado se consideran Personas bajo investigación (PUI) y deben ser separado temporalmente de la madre y aislado. \* °

#### 7.1 Lactancia materna y cuidado infantil

Los datos disponibles hasta la fecha son limitados y no pueden confirmar si COVID-19 puede ser o no transmitido a través de la leche materna. \* ° Evaluación La presencia de COVID-19 en la leche materna. Las muestras de seis pacientes mostraron negativos. Resultado.4 ° El CDC señala que en caso de un infección confirmada o sospechada de COVID-19, la decisión de si o cómo comenzar o continuar La lactancia materna debe ser hecha por la madre en Colaboración con la familia y la atención médica. practicantes. \* 'Las precauciones cuidadosas deben ser Tomado por la madre para evitar transmitir el Enfermedad a su bebé a través de respiratorio. gotitas durante la lactancia materna. Esto incluye con una mascarilla y la mano practicante