

entre 4 y 70 ° C. Las muestras de orina también deben ser recogido con un recipiente estéril y almacenado En el laboratorio a una temperatura que varía. entre 4 y 70 ° C. ° \*\*

## Embarazo

Actualmente, hay una escasez de conocimiento y Datos relacionados con las consecuencias de COVID-19. durante el embarazo. \* ° \*\* Sin embargo, embarazada Las mujeres parecen tener un alto riesgo de desarrollar. Infección severa y complicaciones durante el Reciente brote de 2019-Ncov. \* ' \*? Esta La especulación se basó en anteriores disponibles. Informes científicos sobre coronavirus durante Embarazo (SARS-COV y Mers-COV), así como El número limitado de casos COVID-19. \*! - 4 ° Analizando las características clínicas y resultados de 10 recién nacidos (incluidos dos conjuntos de gemelos) en China, cuyas madres son confirmadas casos de COVID-19, reveló que la infección perinatal con 2019-Ncov puede llevar a resultados adversos para Los neonatos, por ejemplo, mano de obra prematura, angustia respiratoria, trombocitopenia con Función hepática anormal e incluso la muerte ". Está Todavía no está claro si el COVID-19-19 La infección puede ser transmitida durante el embarazo. al feto a través del transplacativo ruta. \*\* Un informe de series de casos reciente, que Evaluación de la transmisión vertical intrauterina de