

Número de casos de covid-19 confirmados alrededor de la
El mundo está en aumento. El éxito de la prevención.
Las medidas presentadas por cada país es principalmente.
dependiendo de su capacidad para anticipar el
Acercamiento de ondas de pacientes. Esto ayudará a
preparar adecuadamente los trabajadores de la salud y
Aumente la capacidad de la unidad de cuidados intensivos (ICU) (321).
En lugar de confiar por completo en los protocolos de bloqueo,
Los países deben centrarse principalmente en _ alternativa
estrategias de intervención, como pruebas a gran escala,
trazado de contrato, y cuarentena localizada de
Sospechosos de casos para limitar la propagación de esto.
virus pandémica. Tales estrategias de intervención serán
Útil ya sea al principio de la pandemia o
Después de la relajación de bloqueo (322). Bloqueo debe
ser impuesto solo para disminuir la progresión de la enfermedad
Entre la población, para que el sistema de atención médica.
no está sobrecargado.

El número de reproducción (R_0) de COVID-19
La infección se estimó anteriormente para estar en el rango de
1.4 a 2.5 (70); Recientemente, se estimó en 2.24
a 3.58 (76). En comparación con su coronavirus
Los predecesores, COVID-19 tienen un valor R_0 que es
mayor que el de los mers ($R_0 < 1$) (108) pero menos
que el de los SARS (valor R_0 de 2 a 5) (93). Aún así, a
evitar una mayor propagación de la enfermedad en reuniones en masa,