

Infección respiratoria (SARI) y respiratorio.  
angustia, shock o hipoxemia. Pacientes con  
SARI se le puede dar terapia conservadora de fluidos.  
Solo cuando no hay evidencia de shock.  
Se debe iniciar la terapia antimicrobiana empírica.  
para gestionar sari. Para pacientes con sepsis,  
Los antimicrobianos deben ser administrados dentro de 1  
Hora de evaluaciones iniciales. La OMS y CDC  
recomendar que los glucocorticoides no se usen en  
Pacientes con neumonía COVID-19, excepto  
donde hay otras indicaciones (exacerbación  
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica). °?

El deterioro clínico de los pacientes es de cerca.  
observado con sari; Sin embargo, rápidamente  
Fallo respiratorio progresivo y sepsis.  
requiere atención de apoyo inmediato  
Intervenciones que comprenden un uso rápido de  
Bloqueo neuromuscular y sedantes,  
Gestión hemodinámica, nutricional  
Soporte, mantenimiento de niveles de glucosa en sangre,  
Evaluación rápida y tratamiento de  
Neumonía nosocomial, y profilaxis.  
contra la trombosis venosa profunda (DVT) y  
sangrado gastrointestinal (GI). °° en general, tal  
Los pacientes dan paso a su enfermedad primaria a  
complicaciones secundarias como sepsis o  
Fallo del sistema multiorgan. \* °