

# ココシル測定結果のご報告

**PreMedica**

株式会社プリメディカ

## Agenda

1. プリメディカ社内測定事例共有
2. 貴社測定結果のご報告

## Agenda

1. プリメディカ社内測定事例共有
2. 貴社測定結果のご報告

## プリメディカのココシル測定実施フロー

➤ ストレスチェックと同様の座組で実施いたしました

### 事前の決め事

- 対象者 : 全正社員に原則実施
- 結果閲覧者の範囲 : 人事担当者のみ(役職者除く)
- アラート対象者への対応 : 産業医面談必須


### 実施の流れ

|             | 10月 |   |   |   | 11月 |   |   |   | 12月 |   |   |   |
|-------------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|
|             | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 |
| 検査キット・冷蔵庫手配 |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| 全社周知メール     |     | ★ |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| 検査キット配布     |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| 検体回収アナウンス   |     |   | ★ |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| 検体回収        |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| 結果返却        |     |   |   |   |     |   |   | ★ |     |   |   |   |
| 産業医面談       |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |

※実務としては概ね3か月ほどのスケジュールとなりますが、実際は事前のフロー作成とスケジュールリングに+1か月ほどかかっております

## プリメディカココシル測定実施結果（第三者結果開示同意者のみ）


- アラート対象者は2人（5%）で、ストレスチェックにおける高ストレス該当者・非該当者が各1名でした
- ストレススコア中央値は50でした（測定下限値未満を除く）




# 労務状況との相関解析（第三者結果開示同意者のみ）

➤ ストレススコアと時間外労働時間・有休取得日数の間に相関は見られませんでした


直近1カ月の時間外労働時間




24年度時間外労総時間



直近3カ月時間外労働時間




24年度の有給取得日数




## ストレスチェック高低との相関解析（第三者結果開示同意者のみ）

- 問診による高ストレス群と高ストレス以外群との間で、ストレススコアの有意差は見られませんでした



## (参考) 職業性ストレスモデル

- 厚生労働省ストレスチェック57項目は、NIOSHの職業性ストレスモデルをベースに構成されており、「ストレスの原因」「心身のストレス反応」「ストレスに影響を与えるその他因子」の項目に基づいております



NIOSH: アメリカ国立労働安全衛生研究所



# ストレスチェック中/小項目との相関解析（第三者結果開示同意者のみ）

## ➤ ストレスチェック中/小項目とバイオピリン値の相関は見られませんでした

| 中項目              | 相関係数(R) |
|------------------|---------|
| ストレスに影響を与えるその他因子 | -0.06   |
| 心身の反応            | -0.06   |
| ストレスの原因          | -0.09   |

| 中項目              | 小項目           | 相関係数(R) |
|------------------|---------------|---------|
| ストレスの原因          | 心理的な仕事の負担(質)  | 0.10    |
| ストレスの原因          | 技能の活用度        | 0.04    |
| 心身のストレス反応        | 活気            | 0.02    |
| 心身のストレス反応        | 疲労感           | 0.02    |
| 心身のストレス反応        | 身体愁訴          | 0.01    |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 家族・友人からのサポート  | 0.00    |
| 心身のストレス反応        | 不安感           | -0.01   |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 同僚からのサポート     | -0.01   |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 職場環境によるストレス   | -0.03   |
| ストレスの原因          | 働きがい          | -0.04   |
| ストレスの原因          | 職場の対人関係でのストレス | -0.05   |
| ストレスの原因          | 仕事のコントロール度    | -0.08   |
| ストレスの原因          | 仕事の適性度        | -0.11   |
| ストレスの原因          | 心理的な仕事の負担(量)  | -0.12   |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 上司からのサポート     | -0.13   |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 仕事や生活の満足度     | -0.14   |
| 心身のストレス反応        | 抑うつ感          | -0.14   |
| 心身のストレス反応        | イライラ感         | -0.14   |
| ストレスの原因          | 自覚的な身体的負担度    | -0.21   |

## Agenda

1. プリメディカ社内測定事例共有
2. 貴社測定結果のご報告

## ココシル測定概要


## ➤ 貴社社員様を対象にココシル検査を実施いたしました

## 方法

- 検体採取期間: 1回目: 2024年7月8日～12日  
2回目: 2024年10月10日～24日
- 対象被験者数: 1回目: 30人(男性21人、女性9人)  
2回目: 28人(男性20人、女性8人)  
※2回目受検者のうち26名は1回目受検
- 年齢分布: 1回目: 男性:  $36.5 \pm 9.2$ 歳  
女性:  $26.9 \pm 3.4$ 歳  
2回目: 男性:  $35.6 \pm 8.2$ 歳  
女性:  $27.4 \pm 3.5$ 歳
- 測定項目: バイオピリン
- 問診票: 厚生労働省ストレスチェック57項目
- 労務情報: 時間外労働時間、職位変更・顧客変更の有無


## 1回目受検者 性別年齢分布

人)





## ストレススコア分布

- 【1回目】 ストレススコアの中央値は35(定下限値未満を除く)、アラート発令者はおりませんでした
- 【2回目】 ストレススコアの中央値は51(定下限値未満を除く)、アラート発令対象者は3名でした  
(3名ともストレスチェックの高ストレス該当者以外でした)




## ストレススコアの変化

- 2回受検された26名の測定結果を比較すると、22名は1回目よりスコアが上昇し、4名は1回目よりスコアが減少しておりました



## ストレスチェック高低によるストレススコアの変化

- 問診による高ストレス群と、ストレススコアの変化率の相関は見られませんでした



# ストレスチェック中項目/小項目との相関解析（第三者開示同意取得済）

- ストレスチェックの中/小項目においては、自覚的な心身のストレス反応よりも、ストレスに影響を与える因子やストレスの原因等を反映している可能性が考えられます

## 1回目 (N=21)

| 中項目              | 相関係数(R)    |
|------------------|------------|
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 0.41837975 |
| ストレスの原因          | 0.17835063 |
| 心身のストレス反応        | 0.09514804 |

| 中項目              | 小項目           | 相関係数(R)      |
|------------------|---------------|--------------|
| 心身のストレス反応        | イライラ感         | 0.471170509  |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 家族・友人からのサポート  | 0.470853966  |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 上司からのサポート     | 0.380790069  |
| ストレスの原因          | 職場の対人関係でのストレス | 0.317845804  |
| 心身のストレス反応        | 抑うつ感          | 0.296312646  |
| ストレスの原因          | 働きがい          | 0.277117373  |
| ストレスの原因          | 心理的な仕事の負担(質)  | 0.266893423  |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 仕事や生活の満足度     | 0.194296811  |
| ストレスの原因          | 自覚的な身体的負担度    | 0.147236097  |
| ストレスの原因          | 心理的な仕事の負担(量)  | 0.102298816  |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 同僚からのサポート     | 0.099478458  |
| ストレスの原因          | 仕事の適性度        | 0.092753709  |
| 心身のストレス反応        | 活気            | 0.079930398  |
| ストレスの原因          | 技能の活用度        | 0.039399129  |
| ストレスの原因          | 職場環境によるストレス   | 0.007003442  |
| 心身のストレス反応        | 疲労感           | -0.004739887 |
| 心身のストレス反応        | 不安感           | -0.086636376 |
| 心身のストレス反応        | 身体愁訴          | -0.320604826 |
| ストレスの原因          | 仕事のコントロール度    | -0.347732927 |


## 2回目 (N=25)

| 中項目              | 相関係数(R)  |
|------------------|----------|
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 0.284823 |
| 心身のストレス反応        | 0.005768 |
| ストレスの原因          | -0.01419 |

| 中項目              | 小項目           | 相関係数(R)      |
|------------------|---------------|--------------|
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 家族・友人からのサポート  | 0.370580349  |
| ストレスの原因          | 心理的な仕事の負担(量)  | 0.261838852  |
| 心身のストレス反応        | 抑うつ感          | 0.220080308  |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 上司からのサポート     | 0.160131409  |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 同僚からのサポート     | 0.154499212  |
| ストレスの原因          | 仕事の適性度        | 0.07344203   |
| ストレスの原因          | 働きがい          | 0.069903023  |
| ストレスの原因          | 職場環境によるストレス   | 0.021386066  |
| ストレスに影響を与えるその他因子 | 仕事や生活の満足度     | 0.018484808  |
| 心身のストレス反応        | 不安感           | 0.01423584   |
| 心身のストレス反応        | イライラ感         | 0.01151539   |
| 心身のストレス反応        | 疲労感           | -0.00345257  |
| 心身のストレス反応        | 活気            | -0.021058815 |
| ストレスの原因          | 心理的な仕事の負担(質)  | -0.021151054 |
| ストレスの原因          | 自覚的な身体的負担度    | -0.06103472  |
| ストレスの原因          | 仕事のコントロール度    | -0.10109341  |
| ストレスの原因          | 職場の対人関係でのストレス | -0.162332807 |
| ストレスの原因          | 技能の活用度        | -0.176836629 |
| 心身のストレス反応        | 身体愁訴          | -0.262973351 |

## 時間外労働時間の多寡によるストレススコアの変化（第三者開示同意取得済）


➤ 直近1カ月の時間外労働時間と、ストレススコアの変化率の相関は認められませんでした





## 職位変更の有無によるストレススコアの変化（第三者開示同意取得済）


➤ 職位変更の有無とストレススコア変化率の相関は認められませんでした



※スコア10の被験者は除外

## 顧客変更の有無によるストレススコアの変化（第三者開示同意取得済）

➤ 顧客変更の有無と、ストレススコアの変化率の相関は認められませんでした



※スコア10の被験者は除外

## アラート(+)対象者インタビュー

## &lt;事例① 考えられるストレス要因&gt; ※現病歴:喘息

## ● 対人関係

個人業務が多い。実務上は困らないが、評価や意見をもらいづらいので、自分の仕事はどう見られているかわかりづらい

## ● 入眠困難

在宅勤務に伴う可能性もあり

→ いずれも主観的に大きなイベントではないため、結果解釈の妥当性含め、ココシル検査のさらなる理解・事例蓄積が必要

## &lt;事例② 考えられるストレス要因&gt; ※既往歴:適応障害

## ● 人事考課結果

納得できる部分がある一方、納得できない部分もあり考え込んでしまった

## ● 対人関係

職場の上司・同僚との関係性の問題(仕事内容自体ではない)

→ 第三者介入による適切な対人距離の保持や制度の見直し、およびご自身の考え方を尊重しつつ周囲の意見を過剰に気にしないように導くメンターの存在も必要かもしれない

## 考察


1. ココシルの測定値と、ストレスチェック総合判定結果および時間外労働時間の長さとの相関は認められなかった
  
1. ココシルの測定値は、自覚のあるストレス反応以外の環境要因と相関するかもしれない

## 企業トライアル

## 方法

- 検体採取期間: 2024年10月10日～24日
- 対象被験者数: 28人(男性20人、女性8人)
- 年齢分布: 男性: 35.6±8.2歳  
女性: 27.4±3.5歳
- 測定項目: バイオピリン
- 問診票: ストレスチェック57項目

## 結果



※スコア10の被験者は除外