
Reconstructed decay modes
MC decay modes
$B^+ \to K^+\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K_S^0\pi^+\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+\pi^-\pi^+\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K_S^0\pi^0\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+\pi^-\pi^+\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K_S^0\pi^+\pi^-\pi^+\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+\pi^-\pi^+\pi^-\pi^+\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K_S^0\pi^+\pi^-\pi^+\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+\pi^0\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K_S^0\pi^+\pi^0\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+\pi^-\pi^+\pi^0\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+K^-K^+\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+K^-K_S^0\pi^+\nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+K^-K^+\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+\pi^-\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+\pi^-\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0\pi^+\pi^-\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+\pi^-\pi^+\pi^-\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0\pi^+\pi^-\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+\pi^-\pi^+\pi^-\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0\pi^+\pi^-\pi^+\pi^-\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+\pi^0\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0\pi^0\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+\pi^-\pi^0\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0\pi^+\pi^-\pi^0\pi^0\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+K^-K_S^0\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+K^-K^+\pi^-\nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+K^-K_S^0\pi^0\nu\bar{\nu}$
12
10
8
6
4
2
0