Decay Modes

$B^+ \to K^+ \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+ \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K_S^0 \pi^+ \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+ \pi^- \pi^+ \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K_S^0 \pi^+ \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+ \pi^- \pi^+ \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K_S^0 \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+ \pi^- \pi^+ \pi^- \pi^+ \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K_S^0 \pi^+ \pi^- \pi^+ \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+ \pi^0 \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K_S^0 \pi^+ \pi^0 \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+ \pi^- \pi^+ \pi^0 \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+ K^- K^+ \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+ K^- K_S^0 \pi^+ \nu\bar{\nu}$
$B^+ \to K^+ K^- K^+ \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0 \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+ \pi^- \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0 \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+ \pi^- \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0 \pi^+ \pi^- \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+ \pi^- \pi^+ \pi^- \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0 \pi^+ \pi^- \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+ \pi^- \pi^+ \pi^- \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0 \pi^+ \pi^- \pi^+ \pi^- \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0 \pi^0 \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+ \pi^- \pi^0 \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K_S^0 \pi^+ \pi^- \pi^0 \pi^0 \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+ K^- K_S^0 \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+ K^- K^+ \pi^- \nu\bar{\nu}$
$B^0 \to K^+ K^- K_S^0 \pi^0 \nu\bar{\nu}$

0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006

Efficiency