

A cserjék és a gyepszint virágos növényei



A fa és a cserje felépítése



A kökény érett termése



A kökény virága és a virágból kialakuló termés

Az erdők uralkodó növényei a fák, melyek lombkoronájukkal elzárják az éltető fényt, gyökérzetükkel felveszik a tápanyagok nagy részét is. A cserjék és a gyepszint lágy szárú növényei kevesebb fénnyel és tápanyaggal is beérik, alkalmazkodnak a környezethez.

Figyeld meg a fa és cserje alakját! Hasonlítsd össze! Mely tulajdonságokban azonosak, és miben különböznek?

A lombhullató erdők **cserjeszintjét** fiatal fák és cserjefajok alkotják.

A cserjék is fásszárúak, de **nincs törzsük,** közvetlenül a **talaj felett elágaznak.** Jól alkalmazkodnak a fák által alakított környezeti feltételekhez. A föléjük tornyosuló fáknál előbb fejlesztik ki lombozatukat, így kora tavasszal sok fényhez jutnak, gyorsan fejlődnek. A virágzásuk is megelőzi az uralkodó fákét (tölgy, bükk), ezért a fák nem gátolják a széllel és rovarokkal történő beporzást.

Egyik leggyakoribb cserjénk a **kökény.** Sűrű, áthatolhatatlan a lombozata, akár 4 méter magasra is megnőhet. Oldalhajtásai szúrós **ágtövisekké** módosultak, melyeket kézzel nem tudunk lepattintani róla. Kora tavasszal virágzik. A virága és termése az előző tanévben megismert szilvafáéhoz hasonló.

A termő magházában zártan helyezkedik el a **magkezdemény,** amelyből a megporzás után kialakul a **mag,** a **termő** falából pedig a **termés.** Az ilyen növényeket **zárvatermőknek** nevezzük. A kökény ősszel beérő **csonthéjas termése** fanyar ízű. Ha „a dér megcsípte" – vagyis az első fagyos nap után –, az íze már kellemesebb.


Figyeld meg, hogy a virág mely részeiből alakul ki a csonthéjas termés!

A **mogyoró** az erdőszéleken él. Már február végén virágzik. Szélbeporzású növény, a termős virágokból sok tápanyagot tartalmazó **makktermés** fejlődik.

A **vadrózsa** (vagy gyepűrózsa) is a naposabb erdőszéleken él. Színes virágait a rovarok porozzák be. **Csipkebogyótermése** áltermés. A termés kialakulásában – az almaterméshez hasonlóan – a termő mellett a vacok és a csészelevelek is részt vesznek.

A vadrózsa hajtásain a növény külső részéből (a bőrszövetből) **tüskék fejlődnek.** Az ágtövistől eltérően a tüskét könnyen lepattinthatjuk.

Figyeld meg a rajzokon a vadrózsa és a mogyoró virágát (virágzatát) és a termés kialakulását!



A mogyoró szervei



A vadrózsa virága, levele és áltermése

A **cserjéknek** fontos szerepük van az erdő életközösségében. Sűrű, tüskés, tövises ágaik madárfajoknak nyújtanak védelmet és biztonságos **fészkelőhelyet.** A siklók, gyíkok szintén kedvelik az erdőszéli cserjéseket. Itt a napfényben sütkéreznek, veszély esetén a sűrű ágrendszer kiváló **búvóhelyet** biztosít számukra.

Cserjék az erdő szélén







Az ujjas keltike, a téltemető és a berki szellőrózsa a gyepszintben él

Az erdők gyepszintjében sok virágos és virágtalan lágyszárú él. Az évelő **hóvirág** lombfakadás előtt virágzik. A virágzás után kifejlődő levélzete táplálékot készít, melyet a talajban lévő módosult hajtás, a **hagyma** raktároz el. Őszre a talaj feletti részei elszáradnak, a fagyos hónapokat a talajban lévő hagyma vészeli át. Kora tavasszal az itt elraktározott tápanyagok felhasználásával képes gyorsan kihajtani és virágzani.

A cserjék levélzete és termése táplálékot ad a növényevőknek. Az erdőszéli cserjesor **felfogja a szelet,** védi az erdő fáit a szél pusztító hatásaitól. A téli időszakban a sűrű ágrendszer véd a hóviharokkal, hófúvásokkal szemben.



A hóvirág szervei

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hasonlítsd össze a cserjéket és a fákat! Melyek az azonosságok és a különbségek?
2. Mi a különbség a tövis és a tüske között?
3. Mely virágrészből alakul ki a termés és a mag? Hogy nevezzük a kökény, a vadrózsa és a mogyoró termését?
4. Miről ismerhetők fel a szél- és a rovarbeporzású virágok?
5. Mi a jelentőségük a cserjéknek?
6. Ismertesd a hóvirág szerveit! Hogyan alkalmazkodik a környezetéhez?