
Harkályok és énekesmadarak az erdőben

Az élőlények **alapvető életjelensége a táplálkozás és a szaporodás.** A táplálék hiányát a növények és az állatok rövid ideig viselik el. Különösen igaz ez a kis termetű énekesmadarakra, amelyek csak néhány napig bírják víz és szilárd táplálék nélkül.


Az élőlények között folyamatos **versengés** alakul ki a táplálkozási helyekért, a táplálék megszerzéséért. Az életrevalóbb, a jobban alkalmazkodó élőlények kiszorítják az élőhelyről a gyengébbeket. A madarak **a versengés eredményeként felosztják egymás között az élőhelyeket.** Más-más fajok táplálkoznak a lombkorona ágai között, mások a fák törzsén, a kéregrepedésekben, és mások a cserje- és a gyepszintben. Így például a tölgyerdőkben egy négyzetkilométeren 80-100 madárfaj is tud táplálkozni, fészkelni és utódokat felnevelni.

A hazai erdőkben a **harkályoknak** több fajuk él. Közös tulajdonságuk, hogy testfelépítésük alkalmazkodott a fák kérge alatt és az odvas fákban rejtőzködő táplálék megszerzéséhez.

Lábuk **kúszóláb,** ujjaik közül kettő előre-, kettő hátranéz. Karmaik hegyesek, erősek, **csőrük véső alakú.** Farktollaik erősek, amikor a fa törzsén kúsznak, alulról támasztják a testüket. **Nyelvük hosszú, kiölthető,** a vége ragadós. Táplálkozáskor csőrükkel kéregdarabokat hántanak le. Néha az elszáradt fa teljes kérgét lehántják, vagy a puha, odvas fába üregeket vésnek, így hozzáférnek a mélyen megbúvó rovarokhoz. A téli időszakban magvakat is fogyasztanak (fenyő, mogyoró, dió).



A harkályok odúban költenek



A harkály kiölthető nyelve és kúszólába

Figyeld meg a rajzon a harkály kiölthető nyelvét és zsákmányszerzését!



Nagy fakopáncs

Legismertebb harkályfélénk a **nagy fakopáncs.** Állandó madarunk. Maga készítette odúban fészkel, 4-6 fiókát nevel. Az elhagyott odúját cinegék foglalják el.

Figyeld meg a 24. oldali rajzon, hogyan alkalmazkodott a nagy fakopáncs testfelépítése a táplálék megszerzéséhez!

A csuszka szintén a fák törzsén, vastag ágakon kúszva szerzi meg táplálékát.

A csuszka fejjel lefelé és felfelé egyaránt remekül mozog a fák törzsén. Hegyes csőrével a kéreg repedései közül szedegeti ki a pókokat, hernyókat, kifejlett rovarokat. Állandó madarunk, télen gyakran behúzódik a nagyobb parkokba, gyümölcsösökbe.



Csuszka



Sárgarigó

A **sárgarigót** a hím citromsárga tollai miatt aranymálinkónak is nevezik. A lombkorona ágai között keresi főleg hernyókból és kifejlett bogarakból álló táplálékát. Érett gyümölcsöt is fogyaszt. A tojó a fészkét ágvillára függeszti, 3-4 tojást rak. Költöző madarunk. Májusban érkezik, és már augusztusban indul vissza Afrikába.

Az **örvös légykapó** is költöző madár. Neve arra utal, hogy repülő rovarokkal táplálkozik, amelyeket a levegőben fog el. Erdőszéleken, tisztásokon a fák külső ágain ülve figyeli ki táplálékállatait.



Örvös légykapó



Barátposzáta

A **fekete rigó** eredeti élőhelye a lombhullató erdő. Ma már nagy számban élnek a lakott területeken, falvakban és városokban. Ezek a rigók a telet is nálunk töltik. Az erdőben élő rigók táplálékukat – amely főleg férgekből, csigákból, rovarokból áll – az avarban keresik. Nyáron és ősszel gyümölcsöt (szedret, bodzát, galagonyát) is fogyasztanak.



A fülemüle a legszebb hangú énekesmadarunk

A sűrű tövises, tüskés cserjésekben és a gazdag aljnövényzetű erdőkben fészkel és keresi főleg rovarokból álló táplálékát a **barátposzáta.** A hímet a fekete tollsapkája különbözteti meg más énekesmadaraktól. Költöző madár.



Fekete rigó



Széncinege

Ellenőrizd tudásodat!

1. Miért tud azonos élőhelyen több madárfaj is megélni?
2. Hol keresik táplálékukat a harkályok és a megismert énekesmadarak?
3. Hogyan alkalmazkodott a harkálynak a testfelépítése az életmódjához?