Ragadozó madarak az erdőben

A **ragadozó életmódú** állatokra jellemző, hogy táplálkozásuk során különböző állatokat zsákmányolnak, és azokkal táplálkoznak. Testfelépítésük a zsákmány megszerzéséhez alkalmazkodott. Érzékszerveik (látás, hallás, szaglás) fejlettek, színükkel beleolvadnak a környezetükbe, így észrevétlenül, lesből csapnak le áldozatukra. A **ragadozó emlősöknek** hosszú, hegyes szemfogaik vannak, élesek a zápfogaik, erősek az állkapcsi izmaik. Egyes fajok (farkasok, hiénák) csapatokba verődve, hosszabb-rövidebb üldözés során szerzik meg táplálékukat, míg mások magányosan vadásznak (vadmacska, hiúz, puma). Számos ragadozó hüllőre, ízeltlábúra jellemző, hogy méreganyagukkal ölik meg áldozatukat.



A héja 60 cm nagyságú, szárnyainak fesztávolsága 110 cm

A **ragadozó madaraknak horgas, hegyes csőrük** és erős **markolólábuk** van, amely hosszú, hegyes karmokban végződik. A ragadozók bélcsatornája sokkal rövidebb, mint a növényevőké, ugyanis a hús emésztése könnyebb, mint a sok rostanyagot tartalmazó növényi tápanyagoké.

A **csúcsragadozók** a táplálkozási láncok végén állnak, és velük már más állatok nem táplálkoznak. Fontosak az életközösségekben, mivel szabályozzák a növényevők számát. A szabályozás révén **viszonylagos egyensúly** alakul ki a növények, a növényevők és a ragadozók között. A hazai életközösségekben a csúcsragadozók egy része már kipusztult, mások pedig csak a természetvédelmi területeken maradtak fenn (uhu, rétisas, parlagi sas, kerecsensólyom, parlagi vipera).



A héja zsákmányszerzése

A **héja** a fás élőhelyek (tölgyesek, kisebb erdőfoltok, fasorok, telepített akác- és nyárerdők) ragadozó madara. Nappal szerzi zsákmányát, amely egerekből, pockokból, énekesmadarakból, galambokból, fácánokból, nyulakból, fiatal rókákból áll. Képes elfogni még a gyors mozgású mókusokat is. Lesből figyel áldozatára, majd gyors, a fák között cikázó repüléssel üldözőbe veszi, és hirtelen zuhanással lecsap.

Figyeld meg a héja zsákmányszerzését!

A héja gyors repülését a fejlett **szárnymozgató mellizmok** biztosítják. A hosszú **farktollakkal** a mozgás irányát szabályozza. Lába **fogóláb.** Csüdje rövid, ujjai erősek, hegyes karmai 3-4 cm hosszúak. Áldozatával hegyes karmai és ujjainak szorítása végez. Csőre a ragadozó madarakra jellemzően horgas, hegyes **tépőcsőr.**



A héja tépőcsőre



A héja fogólába

A költőpár a fészket a magas fák lombkoronájába rakja. A tojó 2-4 tojást rak, a kotlás ideje alatt a hím hordja az eleséget. A kikelt madarak fészeklakók, mindkét szülő eteti őket. A héja a téli időszakban sem költözik el, **állandó madarunk.**



Az erdei fülesbagoly 30-37 cm hosszúságú szárnyának fesztávolsága 1 m

Az **erdei fülesbagoly** a legnagyobb egyedszámban élő bagolyfajunk. Nevét a fején lévő fülszerű tollazatáról kapta. Az erdőszéleket, a folyók ártéri erdőit, a ligetes facsoportos élőhelyeket kedveli. Gyakran megtelepszik az emberi települések környezetében, a tűlevelű fákon, temetők környékén.

A téli időszakban kisebb csapatokba verődnek, és **telelő csoportokat** alkotnak. A települések belterületét kedvelik, ahol fenyőfákon, tuják ágai közé gyűlnek össze. Nappal megbújnak az ágak között, mozdulatlanul pihennek, éjjel táplálkoznak.

Figyeld meg a rajzon az erdei fülesbagoly testfelépítését! Mi a különbség a héja és a fülesbagoly zsákmányszerzése között?

Az erdei fülesbagoly főleg egereket, pockokat, énekesmadarakat zsákmányol. Naponta 4-5 egeret is elfogyaszt. A táplálék megszerzésében kiváló hallása, látása és nesztelen repülése segíti.



Az erdei fülesbagoly vetélőujja



Fejletlen bagolyfiókák

Fő zsákmányszerző szerve a horgas, hegyes, éles csőr. Karmai hegyesek. Négy ujja közül az egyiket előre-hátra is tudja mozgatni, ez a **vetélőujj.** Amikor az ágakon kapaszkodik, két ujja előre-, kettő hátrafelé áll. Zsákmányszerzéskor három ujja néz előre. A táplálék emészthetetlen részeit (csontok, csőr, toll, szőr) kis gombócok formájában (bagolyköpet) visszaöklendezi. Fészket nem épít, többnyire elhagyott varjúfészekbe, ritkábban odvas fákban költ. 4-6 tojást rak. A költési időszak alatt a hím gondoskodik élelemről, később a fiókákat a szülőpár eteti.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Fogalmazd meg, mit jelent a ragadozó életmód!
2. Mi a jelentősége a ragadozóknak az életközösségekben?
3. Hasonlítsd össze a héja és az erdei fülesbagoly táplálkozását!
4. Mely érzékszervek segítik a két madárfajt a táplálék megszerzésében?
5. Mi a jellemző a héja és az erdei fülesbagoly fészkelésére és szaporodására?

