AZ ŐSHONOS FÜVES TERÜLETEK ÉS A MEZŐK ÉLETKÖZÖSSÉGE



Az őshonos füves puszták kialakulása, növényei

A mérsékelt éghajlati övezetben ott alakultak ki **őshonos füves puszták,** ahol az éves csapadék mennyisége 500 mm-nél kevesebb. Ezeken a területeken nagy az évi hőingás, és nyáron gyakoriak az aszályos hónapok. Hazánkban őshonos füves puszták csak az **Alföld egyes részein**, valamint az **Északi- és a Dunántúli-középhegység déli oldalán,** a hegyek lábánál találhatók. A mezőgazdaság térnyerésével e területek nagy részét felszántották. Füves pusztáink mára csak kis területen maradtak fenn, és védelem alatt állnak.

Figyeld meg a képeken az őshonos füves pusztáinkat!



Az őshonos árvalányhaj hazánkban védett növény



Szikes puszta

A mezőgazdasági területek helyén korábban erdők vagy őshonos füves területek voltak. Az erdőket kivágták, az őshonos füves területeket felszántották, helyükön szántóföldeket, kaszálóréteket, legelőket alakítottak ki, ezért ezeket a területeket másodlagos rétnek is nevezik.

A rétek füvét évente többször kaszálják, megszárítják – ez a széna, amely állati takarmány. A legelők füvét az állatokkal (szarvasmarha, juh) frissen etetik fel.

A rétek füvei elviselik az állatok taposását, a rendszeres legelést vagy a kaszálást. Bár a fűvek föld feletti része megcsonkul, a csonkból új levél képződik. A fűvek így folyamatosan megújítják önmagukat. Elviselik a szárazságot is, mivel sűrű gyökérzetükkel a talaj legkisebb nedvességét is képesek felvenni.

A füves területek nevüket az uralkodó növényzetükről, a fűfélékről kapták. Közös jellemzőjük, hogy gyökérzetük **mellékgyökérzet,** amely sűrűn behálózza a talajt. Száruk nem ágazik el, belül **üreges.** Leveleik hosszúak, alsó részükkel körülölelik a szárat, vagyis **szárölelő levelek.** Erezetük párhuzamosan fut, más néven mellékeresek. A virágaik különböző **virágzatot** alkotnak (buga, fürt, kalász), nem feltűnő színűek, a **szél porozza be** őket.

A **száraz rétek** gyakori fűféléje a **siskanád** és az **angolperje.**

Figyeld meg a rajzokon a fűfélék tulajdonságait!



Siskanád



Angolperje



Mezei zsálya

A **mezei zsálya** 60-80 cm magas, feltűnő virágzatú növény. Elviseli a száraz, meleg nyarat, mivel főgyökérzete mélyen hatol a talajba. Évelő növény, gyöktörzse tápanyagokat raktároz. Májustól nyár végéig folyamatosan virágzik. Virágait a rovarok porozzák be.

A zsályát **gyógynövényként** is használják. A leveleiből készített tea vértisztító, kiválóan alkalmas a légző- és az emésztőszervi panaszok enyhítésére.

A **mocsárrétek** a folyók árterein, a tartósan vízzel borított területeken alakultak ki. A fűféléken (kékperje, ecsetpázsit, csenkesz) és sásfajokon kívül virágtalan növények is élnek itt.

A **mocsári zsurló** ősei 200-300 millió évvel ezelőtt uralkodó növények voltak a Földön. 20-30 méter magasra nőttek. Földbe süllyedt maradványaikból alakultak ki a kőszéntelepek.

A mocsári zsurló 50 cm magasra nő. Spórákkal szaporodik. A **spóratartó** tokok a főhajtás csúcsi részén fejlődnek. A kihulló **spórákból** a nedves talajon először **előtelep** fejlődik ki, majd azon kialakul az **új növény.**

A zsurló levelei aprók, pikkelyszerűen a hajtásokhoz simulnak. A talajban lévő szerve a gyöktörzs, amelyből a gyökérszálak erednek. Frissen és szárítva is mérgező, a szénába keveredve az állatok bélgyulladását okozza.



Mocsári zsurló

Nedves rétek gyakori évelő növénye az 1 méter magasra is megnövő **réti boglárka.** Talajban lévő szerve a tápanyag-raktározó gyöktörzs, amely a mellékgyökérzetben folytatódik. A föld feletti szár elágazik, a nyélen ülő levelek a főérig bemetszettek. Az ilyen levelet **szeldelt levélnek** nevezzük. A virág csészelevelei és sziromlevelei egyformán élénksárga színűek, a rovarok porozzák be.

A réti boglárka megszárítva jó minőségű szénát ad, frissen azonban mérgező. Mindezt az állatok ösztönösen tudják, ezért nem legelik. Így alakulnak ki a nedves réteken a nagy, boglárkákkal borított területek.

Figyeld meg és hasonlítsd össze a tankönyv képei alapján a mezei zsálya és a réti boglárka virágait!



A réti boglárka virága és termése



A réti boglárka szeldelt levele

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hol alakultak ki a mérsékelt éghajlati övezetben a füves puszták?
2. Hazánkban mely földrajzi tájakon találhatók ilyen területek?
3. Magyarázd meg a fogalmat: másodlagos rét!
4. Sorold fel a nedves és a száraz rétek megismert növényeit! Mi alapján tudod megkülönböztetni őket?