
A fácán és a füves területek ragadozó madarai



A fácán tojójának testhossza 50-60 cm, a kakasé 70-90 cm. Testtömegük 1 kg körüli

Hazánkban a **fácánok** szinte mindenütt elterjedtek (mezőgazdasági területeken, réteken, erdei tisztások környékén), de **nem őshonos madaraink.** A középkorban vadászati célból telepítették őket Európába. Napjainkban is mesterséges körülmények között tenyésztik, majd szabadon engedik a fácánokat. Őshazájuk a Kaukázus hegység környéke. Kedvelik a ligetes, fás, cserjékben gazdag élőhelyeket és a vízparti, nádasokkal borított területeket.

Figyeld meg a rajzokon a két nem közötti különbségeket!



A fácán feje és kapirgálólába

A hím állat (kakas) tollazata díszes, farktollai hosszúak, a nőstény (tyúk) színe nem feltűnő, vörösesbarna. Testfelépítése a házi tyúkéhoz hasonló. **Kapirgálólába** és a magvak, rovarok felcsipegetésére alkalmas csőre van.

Magvakkal, rovarokkal táplálkozik. Nappal jár táplálléka után. Az éjszakát biztonságosabb helyen, a fákon tölti.

Fészkét a talajra, sűrű növényzet közé építi. 10-18 tojást is rak, melyekből közel egy hónap alatt kelnek ki a fészekhagyó fácáncsibék. Sok természetes ellenségük miatt a felnőttkort még a csibék fele sem éri el.

A füves területek csúcsragadozó madara az **egerészölyv.** Vele már más állat nem táplálkozik, vagyis a táplálkozási lánc csúcsán áll. Gyakran megfigyelhetjük útszéli fákon, villanyoszlopokon ülve, ahol áldozata mozgását figyeli.



Az egerészölyv 50 cm nagyságú

Testfelépítése az erdő életközösségében megismert héjáéhoz hasonló. Horgas, hegyes csőre és erős **fogólába** van, amellyel a zsákmányát ragadja meg. A zsákmány megszerzését éles látása segít. Nappali ragadozó, főleg egereket, pockokat és énekesmadarakat zsákmányol. Megeszi a frissen elpusztult állatokat is.



Az egerészölyv tépőcsőre és fogólába

Az egerészölyv kiterpesztett szárnyaival **vitorlázórepülésre** képes. Ilyenkor a felszálló légáramlatok tartják a magasban. Jellegzetes mozgása a **szitálórepülés** is. Ekkor nagy magasságban, gyors előre-hátra irányuló szárnycsapásokkal szinte egy helyben áll. Szitálás közben folyamatosan figyeli a talaj felszínén, a járataiból előmerészkedő egereket, pockokat, hörcsögöket. **Zuhanórepülésben** csap le áldozatára.

Közel 1 méter átmérőjű fészkét az erdőszéli fákra vagy az erdősávok magas fáira építi. A fészket több éven keresztül használja. 2-5 tojást rak, melyeket a hímmel felváltva költenek ki. A fészeklakó utódoknak mindkét szülő hordja az eleséget.

Állandó madarunk.



Az egerészölyv szárnyfesztávolsága 120 cm



Az egerészölyv szitálórepülésre is képes



A vörös vércse hímje

A **vörös vércse** galamb nagyságú (30 cm-es) ragadozó madár. Nevét tollazata színéről kapta.


Fészkét az erdőszélek fáira vagy a füves területeken szigetszerűen elhelyezkedő fákra építi. Gyakori, hogy a vetési varjú elhagyott fészkét foglalja el, amelybe 5-6 tojást rak. Megtelepszik a lakott területeken is, fészkét a magas épületekre, templomtornyokra építi.




A vörös vércse tépőcsőre és lába

A vörös vércse kiválóan repül. Áldozatát többnyire szitálórepülés közben figyeli ki, és nagy sebességgel csap le rá. Főleg egerekkel, pockokkal, gyíkokkal, békákkal és rovarokkal táplálkozik.

Télre **Afrikába vagy Dél-Európába vonul.** A hazánkban télen is megfigyelhető vércsék a tőlünk északabbról érkező madarak.




Ragadozó madaraink jellegzetes röpképei



Táplálkozási lánc a réten

A füves területek élőlényei között is **táplálkozási kapcsolatok** alakulnak ki. Ha mennyiségileg ábrázoljuk a táplálkozási kapcsolatokban részt vevő élőlényeket, akkor **táplálkozási piramist** kapunk. A piramis alján vannak a legnagyobb egyedszámú és tömegű termelő szervezetek. A piramis csúcsa felé haladva az élőlények egyedszáma csökken.



Táplálkozási piramis a füves területeken

- Készíts táplálkozási láncokat a füves területek élőlényeiből!
- Figyeld meg a rajzon a táplálkozási piramis felépítését!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Indokold meg, miért fontosak a ragadozó állatok az életközösségekben!
2. Milyen összefüggés van a ragadozó madarak testfelépítése és zsákmányszerzése között?
3. Fogalmazd meg a vitorlázó-, a szitáló- és a zuhanórepülés lényegét!
4. Ismertesd, mivel táplálkozik az egerészölyv és a vörös vércse!