Termesztett növényeink: a búza és a kukorica



Búza

Hazánkban a legfőbb kenyérgabona-növény a **búza.** Átlagosan évente 1 millió hektárnyi területen termesztik. (Egy hektár 100 × 100 méteres, vagyis körülbelül egy futballpályányi terület.) Átlagos terméshozama hektáronként 5 tonna.


A búza szervezeti felépítése a réteknél megismert fűfélékhez hasonló.

A **bojtos mellékgyökérzete** sűrűn behálózza a talajt. **Szára** belül **üreges,** melyet a szárcsomók, más néven az úgynevezett bütykök merevítenek, és függőlegesen tartják a növényt. Az ilyen típusú szárat **szalmaszárnak** nevezzük.

Hosszú **szárölelő levelei** nyél nélkül kapcsolódnak a szárhoz. A levéllemezen nem látható főér, az **erek** egymás mellett **párhuzamosan futnak.**



A búza szervezeti felépítése




A kalászka felépítése


A hazánkban termesztett búzafajták többségét őszszel vetik el. Májusban fejlődik ki a **kalászvirágzat.** A virágzatot alkotó virágok csupasz virágok, csak ivarlevelekből (porzókból és termőből) állnak. A porzót és a termőt a toklász védi. 2-4 csupasz virág alkotja a **kalászkát,** melyet a pelyva véd. A kalászkák egy közös virágzati tengelyen ülnek, így együttesen a kalászvirágzatot alkotják.

Tanulmányozd a kalászvirágzat részeit! Milyen részekből áll?


Figyeld meg a rajzon a búza fejlődését! Melyik hónapban milyen szerve jelenik meg?



A búza fejlődése



A búza szemtermésének részei



A kukorica gyökérzete és termése

Figyeld meg a rajzon a szemtermés részeit is! Miben különbözik a korábban megismert termésektől?


A virágokat a szél porozza be. A megporzás után kialakul a **szemtermés,** amelyben a termésfal és maghéj összenőtt.

A búzát nyár elején aratják. A szemtermést a malmokban megőrlik. Ennek első mozzanata, hogy a termésfalat leválasztják a búzaszemről. Ez a termék a korpa. A visszamaradott részt megőrlik, és ebből készül a liszt. A teljes kiőrlésű liszt azért barnás színű, mert a termésfalat és az alatta lévő magot együttesen őrlik meg. Az így kapott termékből készült élelmiszerek egészségesebbek, mivel sok rostanyagot és vitamint tartalmaznak.

A **kukorica** szemtermése magas tápértékű, az állatok fontos takarmánynövénye. A silókukoricát zölden aratják le, és felaprítva etetik fel a szarvasmarhákkal. A silózás során az összeaprított kukoricát megerjesztik, és a téli időszakban használják fel. A kukoricát évente átlagosan 1 millió 200 ezer hektár szántóföldön termesztik. 1 hektárról átlagosan 7 tonna szemtermést takarítanak be.

A kukorica mellékgyökérzete sűrűn elágazik, és mélyre hatol a talajban. A legalsó szárcsomóból **koronagyökerek** fejlődnek, amelyek oldalirányban támasztják a növényt.

Levelei a búzához hasonlóan szárölelő levelek, erei párhuzamosan futnak. Szára fajtától függően különböző magasra nő. A korai érésűek 1-1,5 méter magasak, a silózásra termesztettek elérik a 3 métert is.



A kukorica szervei

A szár csúcsán fejlődik ki a **porzós virágzat.** Az egyes virágok **bugavirágzatba** tömörülnek. A **termős virágok** a szár középső részén helyezkednek el, és **torzsavirágzatot** alkotnak. A virágzatot kívülről a burokelevelek védik. A virágzatból hosszan kinyúlnak a bibeszálak („kukoricahaj"), amelyek végén megtapadnak a porzós virágzatból kihulló virágporszemek. A virágporszemeket a szél szállítja a termős virágokra.

Az olyan virágot, amelyben csak egyféle ivarlevelek fejlődnek, **egyivarú virágnak** nevezzük. Ha az egyivarú virágok egy növényen helyezkednek el, akkor **egylaki** a növény.

Figyeld meg a tankönyv ábráin a kukorica szerveit!

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd a búza szervezeti felépítését és az egyes szervek jellemzőit!
2. A tankönyv rajzának segítségével ismertesd a kalászvirágzat felépítését!
3. Mi a jellemző a szemtermésre? Miben különbözik a korábban megismert termésektől?
4. Hasonlítsd össze a búza és a kukorica szerveit!
5. Foglald mondatokba a következő fogalmakat: egyivarú, egylaki, termős virágzat, porzós virágzat!