Rendszerezzük ismereteinket!

Az őshonos füves puszták kialakulása. A füves területek növényei	A mérsékelt éghajlati övezetben füves puszták ott alakultak ki, ahol az éves csapadék mennyisége 500 mm-nél kevesebb. Hazánkban ilyen területek a középhegységeink déli lábánál és az Alföld egyes részein találhatók. A másodlagos réteket az ember hozta létre az őshonos növények kiirtásával. A fűfélék közös jellemzői: mellékgyökérzet; üreges, el nem ágazó szár; szárölelő levelek, melyek erezete mellékeres. A száraz rétek jellegzetes növényei: az angolperje, a siskanád és a mezei zsálya. Nedves réteken él a réti boglárka és mocsári zsurló.
Ízeltlábúak a füves területeken	A füves területeken a leggyakoribb ízeltlábúak a sáskák, szöcskék és a tücskök. Túlszaporodásukat a természetes ellenségeik gátolják meg. Három pár ízelt lábuk és három testrészük van. A 3. pár lábuk erős ugróláb. Rágó szájszervük, két pár szárnyuk és összetett szemük van. Petékkel szaporodnak, fejlődésüket kifejlésnek nevezzük.
A fürge gyík és a vakond	A gyík testét száraz szarupikkelyek és szarupajzsok borítják. Növekedése során többször vedlik. Testhőmérséklete változó, a külső környezet hőmérsékletétől függ. Lábai gyengék, de hajlékony gerincoszlopa és erős izomzata segítségével gyorsan mozog. Tojásokkal szaporodik, melyeket a nap melege költ ki. A vakond testfelépítése és táplálkozása a föld alatti életmódhoz alkalmazkodott. Rovarevő fogazata van, mellső lába ásólábbá módosult. Téli álmot nem alszik.
A mezei nyúl és a füves területek rágcsáló kisemlősei	A mezei nyúl szemfogai hosszúak és élesek, a fogaknak nincs gyökerük, folyamatosan nőnek. Zápfogainak felülete redős, amiből növényevő életmódjára következtethetünk. Hátsó lába erős, izmos ugróláb. Évente háromszor is fiadzik, egy-egy alkalommal 2-4 utódot hoz a világra. A mezei pocok és a hörcsög rágcsálófogazatú, főleg magvakkal táplálkoznak. Éjjel járnak táplálékuk után, a nappalt föld alatti járataikban töltik. A pockok különösen szaporák. Túlszaporodásukat természetes ellenségeik (róka, menyét, bagoly, ölyv) akadályozzák meg.

A fácán és a füves területek ragadozó madarai	A fácán hazánkban nem őshonos, vadászati céllal telepítették meg. Kapirgálólába van, növényekkel, rovarokkal táplálkozik. A talajra fészkel. Az egerészölyv a füves területek csúcsragadozója, fontos szerepe van az életközösségben a termelő és a fogyasztó élőlények közötti egyensúly fenntartásában. Horgas tépőcsőre és fogólába van, mely hegyes karmokban végződik. Állandó madarunk. A vörös vércse galamb nagyságú ragadozó. Többnyire a varjak elhagyott fészkében költ. A telet Afrikában vagy Európa déli részén tölti. Táplálkozási piramist úgy kapunk, ha egyedszámuk és testtömegük alapján vizsgálunk egy életközösséget. A termelő szervezetek vannak a piramis alján, a piramis csúcsán a csúcsragadozó áll.
Termesztett növényeink: a búza és a kukorica	A búza a legfontosabb kenyérgabona-növényünk. Több fajtáját termesztik. Főbb jellemzői: mellékgyökérzet, üreges, bütykös szár, szárölelő levél, kalászvirágzat, amely 2-4 virágból álló kalászkákból tevődik össze. A virágokat a szél porozza be. A kukorica fontos takarmánynövény. Zölden learatva silótakarmányt készítenek belőle. Éretten a szemtermése fontos tápláléka a tenyésztett állatoknak. Porzós virágai a szár csúcsán bugavirágzatot alkotnak, a termős virágok torzsavirágzatba tömörülnek. Szélbeporzású, egylaki növény.
Termesztett növényeink: a napraforgó, a repce és a lucerna	A napraforgót a kaszattermésben lévő mag magas olajtartalmáért termesztjük. Magvetéssel szaporítják. Főgyökérzete van, a levelek nyéllel kapcsolódnak a szárhoz, főeresek. A szár csúcsán helyezkedik el a fészekvirágzat, amely kívül sárga színű, meddő nyelves virágokból és belül csöves virágokból áll. Rovarok porozzák be. A repce értékes növény, mivel az élelmiszeriparban a magjából olajat állítanak elő. Sárga színű keresztes virágai fürtvirágzatot alkotnak. Az éretten száraz becőtermésében helyezkednek el a magvak. A lucerna takarmánynövény. Frissen lekaszálva vagy megszárítva a háziállatok fehérjékben gazdag takarmánya. Száraz területeken is megél. Évelő, a talajban lévő gyöktörzse telel át.

