
Lágyszárúak a vízben és a vízparton

A vízpartokon élő lágy és fás szárú **növények** fontosak a vízi életközösség számára. Megvédik a partot a víz romboló munkájától, és felfogják a part felől jövő szennyeződéseket. A bemosódó tápanyagokat saját testükbe építik, így meggátolják azok feldúsulását. A parti öv növényzete **élő szűrőberendezésként** működik.

A vízi, vízparti **növények oxigént** juttatnak a környezetükbe, és sok állat számára **táplálékforrást** is jelentenek. A növényzet egyben **fészkelő-** és **búvóhelyet** is biztosít, ezért a hinarasokban és a parti övben gazdag az állatvilág.

A **hinarasok** a tápanyagban dús, sekély tavakban és a folyók iszapos öbleiben élnek. Az ide tartozó növények sokfélék. Közös tulajdonságuk, hogy az aljzatba gyökereznek vagy lebegnek. A gyökerezők szára, levele a víz alá merül, más fajoknál a levél a víz felszínén szétterül. **Nappal** sok **oxigént termelnek,** de **éjszaka** maguk is **oxigénfogyasztók,** ezért ha túlszaporodnak, oxigénhiányt okoznak.

A **fonalas zöldmoszatok** (más néven békanyálmoszatok) a mohákhoz hasonlóan **telepes felépítésű növények.** Sekély vizekben tömegesen elszaporodnak. A víz felszínén úsznak, vagy bevonatokat képeznek a köveken, vízi építményeken, csónakok alján, de megtelepednek a nád és gyékény szárán is. Gyökerük, száruk, levelük, viráguk nincs.



A zöldmoszat telepes felépítésű



A hínáros békaszőlő porzós virágzata

Gyakori hínárféle a **hínáros békaszőlő.** Gyökérzete és módosult szára, a gyöktörzs az iszapban sűrű hálózatot alkot. A gyöktörzsből ered a szár, rajta fejlődnek a 3-4 cm hosszú levelek. A levélerek párhuzamosan futnak. Az egész növényből csak a zöldes színű porzós és a termős virágzat emelkedik a víz fölé. A beporzást az áramló víz végzi el.

A **tündérrózsa és a vízitök** is az iszapban gyökerezik, de viaszos bevonatú levelük a víz felszínén szétterül. A levegőt a levelek veszik fel, az üreges száron keresztül a gyöktörzshöz áramoltatják. Ha bőségesen van táplálék, rövid idő alatt az egész vízfelületet benövik. A tápanyagot a gyöktörzs tárolja, amelynek rügyeiből tavasszal az új növény fejlődik.



Fehér tündérrózsa



Békalencse

Az **apró békalencse** 1 cm nagyságú. Összefüggő állománya helyenként teljesen ellepi a víz felszínét. **Szára** lencse alakú, **szétterül a vízen,** gyökérszál lóg belőle lefelé. Levele elcsökevényesedett, apró virágát a víz porozza be.

A **közönséges nád** a part felől 2 méteres vízmélységig is behatol. **Mellékgyökérzetével** és vastag, elágazó gyöktörzsével kapaszkodik az iszapba. A gyöktörzs rügyéből fejlődik a több méter magasra megnövő, belül **üreges, bütykös,** el nem ágazó **szár.** A szár igen erős, ellenáll a szélviharnak, a hullámzó víznek, a téli hóviharoknak. A **párhuzamos erezetű levelek** körbeölelik a szárat, a levél széle éles. Nyár végén fejlődik ki a **bugavirágzata,** amelyet a szél poroz be. Apró magvait a szél terjeszti.

Nádas a tó partján

Az összefüggő vízparti **nádasok** nemcsak élőhelyet biztosítanak, hanem a partvédelemben is nélkülözhetetlenek.

Meggátolják bizonyos tápanyagok (foszfor, nitrogén) feldúsulását, mivel ezeket felveszik, és saját testük anyagává alakítják át.

A **széleslevelű gyékény** a náddal közös élőhelyen telepszik meg. Gyökérzete és gyöktörzse a nádéhoz hasonlít. Párhuzamos erezetű levelei a nádénál szélesebbek, vaskosabbak.

Virágzati tengelye 2 méter hosszú is lehet, végén a **torzsavirágzat** ül (buzogánynak is nevezik). A torzsavirágzat felső részén a **porzós,** az alsón a **termős virágok** vannak. A beporzást és a repítőszőrös magvak terjesztését a szél végzi.



A nád és a gyékény felépítése



Gyékény

Ellenőrizd tudásodat!

1. Miért fontosak a vizek életközösségében a hinarasok és a parti öv növényei?
2. Mi a jellemző a hínáros békaszőlő, a békalencse és fonalas zöldmoszat testfelépítésére?
3. Miért hívhatjuk a parti öv növényeit élő szűrőberendezésnek?
4. Hasonlítsd össze a nád és a gyékény felépítését!