Békák a vízben és a vízparton

A vizes élőhelyek környezetében számos békafaj is él. Közülük a leggyakoribb a közel 10 cm nagyságú **kecskebéka.**

Kültakarója a bőrében lévő mirigyek váladékától nyálkás. Csupasz bőrének színe rejtőszín, így a mozdulatlan béka jól beleolvad a környezetébe.


Négy végtagja közül a hátsó pár láb erős **ugróláb.** A vízben jól úszik, amit az ujjai között kifeszülő **úszóhártyák** segítenek.

Egyszerű felépítésű tüdővel lélegzik, a légzésben a bőr is részt vesz.

A békák életmódja **ragadozó.** A kecskebéka mozdulatlan testhelyzetben, lesből szerzi meg táplálékát, amely legyekből, szúnyogokból, szitakötőkből, férgekből, csigákból tevődik össze. A zsákmányát kicsapható nyelvével fogja el, majd rágás nélkül lenyeli. Gyakran a kisebb fajtársait is elfogja.




Kecskebéka



A békák kicsapható nyelvükkel fogják meg áldozatukat



Úszóhártyás láb



A békák szaporodása

Testhőmérséklete a halakéhoz hasonlóan **változó.** Ősszel beássa magát az iszapba, és téli álmot alszik. Ilyenkor életműködései szinte teljesen leállnak. A téli álomból kora tavasszal ébred.

Figyeld meg az ábrán a kecskebéka fejlődését!

Petékkel szaporodik, melyeket a hím az anyaállat testén kívül termékenyít meg. Ezt nevezzük **külső megtermékenyítésnek.**

A petéket kocsonyás burok veszi körül, amely nemcsak védelmet biztosít, hanem a petékből kikelő lárvák első tápláléka is.

A lárvák a vízben élnek, külső kopoltyúval lélegeznek, és planktonokkal táplálkoznak. Sokkal inkább hasonlítanak a halakra, mint a kifejlett békára, ezért ebihalnak is nevezik őket. **Átalakulásos fejlődésük** során először a hátsó, aztán a mellső végtagjuk nő ki, majd a farkuk és a külső kopoltyújuk visszafejlődik. A kopoltyús légzést felváltja a tüdővel és a bőrön keresztül történő légzés. A kifejlett kecskebéka elhagyja a vizet, de mindig annak környezetében él tovább.

A **barna varangy** 15 cm hosszúságával a legnagyobb hazai békafajunk. Nyirkos, hűvös erdőkben, zöldségeskertekben, szántóföldek környékén él. Csak a szaporodási időszakban keresi fel a vizet. Védekező szerve a fej két oldalán kidülledő fültőmirigy, amely mérgező váladékot termel. Veszély esetén a valódi méretének a kétszeresére is képes felfújni magát, ami számos támadójával szemben hatásos védekezési mód.



Barna varangy

Éjjel jár tápláléka után. Főleg rovarokat, csigákat, férgeket zsákmányol, de megeszi a fiatal egereket, pockokat is. A zöldséges- és gyümölcsöskertek környékén különösen sok kártevőt fogyaszt, ezért a varangy is fontos a kártevők elleni természetes védekezésben. Csak a tudatlan emberek pusztítják a békákat.

Kora tavasszal a párzási időszakban tömegesen vonulnak a békák a szaporodási helyükre, valamilyen vizes élőhelyre. Ilyenkor gyakran másznak át az úttesteken, ahol tömegesen taposssák el őket a gépjárművek.
Az ország számos helyén van már békamentő akció. A békák vonulási útvonalában, az úttest szélére fóliából kerítést építenek. A békák, miközben keresik az átjárást, a talajba süllyesztett gyűjtőedényekbe esnek. A gyűjtőedényekbe került békákat aztán átviszik a vizes élőhelyre, ahol majd szaporodhatnak. Sok helyütt táblákat is kihelyeznek, óvatos vezetésre figyelmeztetve az autósokat.





Békamentő akció Hont határában

A békák rokonai a gőték és a szalamandrák is. Testfelépítésükben lényeges különbség, hogy törzsük hengeres, és farokban végződik. A pettyes és a tarajos gőte az ország minden vizében megtalálható. A foltos szalamandra a Bükk hegységben és az Alpokalján él.



Tarajos gőte



Foltos szalamandra



Pettyes gőte

A békák, gőték és szalamandrák a **kétéltűek** állatcsoportjába tartoznak. Az elnevezés arra utal, hogy két életterük van. Mindegyik állat a **vizbe rakja petéit,** a lárvák ott fejlődnek ki. Ezt követően a kifejlett egyedek vagy a vízben, a víz közelében élnek (kecskebéka), vagy elhagyják azt (barna varangy, foltos szalamandra).

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi a jellemző a kecskebéka kültakarójára, légzésére és testhőmérsékletére?
2. Hogyan mozog a szárazföldön és a vízben?
3. Mi segíti mozgását?
4. Hova rakja a petéit? Melyek a lárvák fejlődésének főbb változásai?
5. Mi a jellemző a kecskebéka és barna varangy életmódjára?
6. Mi a különbség a kecskebéka és a barna varangy élőhelye között?