
A vízisikló és a mocsári teknős


A vízisikló 1-1,5 méter hosszú. A többi kígyóhoz hasonlóan a mellső és a hátsó végtagjai elcsökevényesedtek. Színe többnyire szürkéskék, hasán fehér foltokkal. A többi hazai kígyótól a feje két oldalán lévő élénksárga, félhold alakú folt alapján lehet megkülönböztetni.



A keresztes vipera és a vízisikló feje

Testét a háztetők cserepeihez hasonlóan egymásra boruló, **száraz szarupikkelyek** fedik. A pikkelyek védik a környezeti hatásoktól, és meggátolják testének kiszáradását. A fejét és hasi oldalát a pikkelyek összenövésével képződött **szarupajzsok** borítják.

Légzőszerve fejlett **tüdő.** A szorosan záródó száraz pikkelyek nem is teszik lehetővé, hogy a bőrén keresztül lélegezzen.



A vízisikló testfelépítése

Figyeld meg a rajzon a vízisikló testrészeit! Különítsd el a fejet, a törzset és a farki részt!

Jól **úszik** a víz felszínén és a vízbe merülve is. A szárazföldön jellegzetes hullámvonalban, **S alakú mozgással** halad előre. Ezt nevezzük **kígyózó mozgásnak.** Egerek, pockok után kutatva ügyesen **kúszik** a szűk járatokban. Ilyenkor a haspajzsait külön-külön, hullámszerűen mozgatva halad előre.

Változatos mozgásformáit a **hajlékony gerincoszlopa** és a hozzátapadó erős izomzata biztosítja. Gerincoszlopa 100-nál is több csigolyából tevődik össze. Kétágú nyelve tapogató- és szaglószerv is egyben.

Ragadozó, főleg halakkal és békákkal táplálkozik, melyeket a nagyra nyíló szájában lévő apró, hátrahajló fogaival ragad meg. Méregfogai nincsenek, áldozatait egyben nyeli le. Nemcsak a **szája, a bélcsatornája** is **tágulékony,** így a testénél szélesebb állatokat is képes lenyelni.



A vízisikló halat zsákmányol

Természetes ellenségei a gólyák, a gémek és a rétihéják.

Változó testhőmérsékletű állat. Ősszel a vízisiklók fagymentes helyeken összegyűlnek, telelőközösséget alkotva, és téli álmot alszanak.

A szaporodási időszakban puha talajba vagy korhadt, nyirkos fába 20-30 **lágy héjú tojást rak.** A tojásokat a nap melege költi ki. Az utódok növekedésük során többször vedlenek, ilyenkor egyben vetik le kültakarójuk külső felszínét.




A vízisikló tojásaival



A mocsári teknős szarupáncélja

A **mocsári teknős** 20 cm nagyságú. Jellegzetessége, hogy a hasi és a háti oldalon **szarupajzsokból** felépülő **páncél** védi testét. Veszély esetén a páncélba visszahúzza fejét és a végtagjait.

Figyeld meg a tankönyv rajzán a teknős vázát!



A teknős váza

A teknős életmódja **ragadozó.** Kisebb halakkal, csigákkal, férgekkel, lárvákkal táplálkozik, de elfogyasztja az elhullott állatokat is. A nagyobb dögöket hegyes karmaival szétmarcangolja, majd éles szarukávával fedett állkapcsaival felaprítja. Rágás nélkül nyeli le táplálékát.

Lágy héjú tojásokkal szaporodik. 9-10 tojását a parti öv homokos talajába ássa el. Nyár végén kelnek ki a 2 cm nagyságú kis teknősök.

A siklókéhoz hasonlóan **a mocsári teknős testhőmérséklete is változó.** A téli időszakot az iszapba ásva vészeli át, téli álmot alszik.

Mely tulajdonságokban hasonlít a mocsári teknős a vízisiklóhoz?



A mocsári teknős tojásaival



A keresztes vipera a hazánkban élő mérges kígyók egyike. Jellegzetes mintázatáról kapta a nevét. 60-80 cm nagyságú, a Zempléni-hegységben, a Tisza felső folyásánál, Zala és Somogy vármegyében fordul elő. Élőhelye csökkenése miatt ma már csak kis számban találkozhatunk vele. Ritkán kerül a szemünk elé, mivel igen óvatos állat, többnyire az ember közeledtére már rejtekhelyére húzódik. Ha valakit mégis megmarna, azonnal orvoshoz kell fordulni, mivel mérge súlyos tünetek kialakulását okozhatja.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi borítja a vízisikló és a mocsári teknős testét?
2. Ismertesd a vízisikló mozgását a vízben és a szárazföldön!
3. Miből épül fel a teknős páncélja?
4. Hasonlítsd össze a vízisikló és a mocsári teknős táplálkozását és szaporodását!