A vizek, vízpartok madarai



A tőkés réce gácsér, nászruhában

Az erdő és a füves területek életközösségeinek megismerésekor tanultuk, hogy az élőlények felosztják egymás között az élőhelyet. Így mindegyiknek elegendő táplálék, búvó- vagy fészkelőhely jut. Mindez előnyös számukra, mivel nem versengenek egymással, és biztonságban felnevelhetik utódaikat.

A **tőkés réce** a házi kacsa őse. A vízi növényzetben gazdag élőhelyeket kedveli, de megtelepszik a települések környezetében lévő mesterséges tavakon is.

Testfelépítése a **vízi életmódhoz** alkalmazkodott. Csónak alakú testével kis ellenállással tud úszni. Az úszást segíti a lábujjai között feszülő **úszóhártya.** Tollászkodás során fartőmirigye zsíros váladékával bekeni tollait, így azok puhák maradnak, és a víz lepereg róluk. Kiválóan repül.




A tőkés réce tojója és fészekhagyó fiókái

A táplálék megszerzését **lemezes csőre** segíti. Kiszűri a vízből és az iszapból az apró férgeket, rovarlárvákat, csigákat. Friss növényi hajtásokat, elhullatott gabonaszemeket és kisebb halakat is fogyaszt.

A parti öv növényzete között fészkel. 8-10 tojást rak, melyekből 28 nap után kelnek ki a **fészekhagyó** kiskacsák. Az anyjuk a teljes kifejlődésükig együtt tartja őket.

Figyeld meg a rajzokon, hogyan alkalmazkodott a tőkés réce testfelépítése a vízi életmódhoz!



A tőkés réce testfelépítése




Az úszó- és gázlómadarak csőre és lába

A **fehér gólya** természetes élőhelye a fákkal tarkított vizes rét. Többségük azonban ma már az emberi települések környezetében telepszik meg. Ágakból készített nagy fészkét villanyoszlopokra, a házak kéményeire építi. Így lett a magyar emberek egyik legkedveltebb madara, amelyről számos népdal, mese és egyéb irodalmi mű is szól.



A gólya és a gém repülése

A gólya kiválóan repül, nagy szárnyai mozgatásával gyorsan halad. Jellemző mozgása a **vitorlázórepülés.** Kiterpesztett szárnyakkal – kihasználva a felfelé szálló légáramlatokat –, a szárnyak mozgatása nélkül nagy távolságokat tesz meg.



A fehér gólya csőre és lába

A gólya lába **gázlóláb.** Lábujjai között felületnövelő hártya van, így biztonságosan mozog mocsaras területeken is. Az ujjak feletti rész hosszú, tollatlan, pikkelyekkel fedett, ezt **csüdnek** nevezzük. A csüd feletti rész a **lábszár,** amely szintén hosszú, és tollak fedik.

Figyeld meg a rajzon a fehér gólya testfelépítését és tollazatának színét!



Táplálékot kereső fehér gólyák

Táplálékát nyílt füves területeken vagy vízparti élőhelyek környékén keresi, ahol szabad kilátása van. Nádasba, sűrű növényzet közé nem megy. A táplálék megszerzését éles látása segíti. **Hosszú, hegyes csőrével** szinte minden mozgó és elejthető élőlényt zsákmányul ejt. Főleg egerekkel, pockokkal, békákkal, siklókkal, férgekkel és csigákkal táplálkozik, de elfogja a földön fészkelő madarak fiókáit is.

A kora tavasszal visszatérő gólyapárok felújítják régi fészküket. A tojó 4-5 meszes héjú tojást rak. A **fészeklakó** fiókákat a két szülő felváltva eteti. Néhány hónap után a fiókák megerősödnek, és kirepülnek.

A fehér gólya **költöző madarunk.** Nyár végén nagy csapatokba verődnek, és Afrika középső és déli részére vonulnak.



A gólyák vonulási útvonala

A gólyáéhoz hasonló a testfelépítésük a gémfélék családját alkotó madaraknak. Idetartozik a szürke gém, a vörös gém, a kis kócsag és a nagy kócsag. Nagy telepekben költenek, ezeket akár 80-100 madár is alkothatja. Főleg halakkal, siklókkal, egerekkel, pockokkal, madárfiókákkal táplálkoznak. Áldozatukat hegyes csőrükkel szinte felnyársalják, majd egyben lenyelik.



Nagy kócsag

Figyeld meg az ábrán a fehér gólyák vonulási útvonalát!



Barna rétihéja

A nagyobb, nádasokkal szegélyezett vizes élőhelyek csúcsragadozó madara a **barna rétihéja.** Közel 60 cm nagyságú, szárnyainak fesztávolsága eléri a 130 cm-t.

Testfelépítése, életmódja az erdő életközösségében megismert héjáéhoz hasonló. Kiválóan repül, békákkal, vízimadarakkal, siklókkal, egerekkel, pockokkal táplálkozik.

Nádasokban rakja 0,5 méter magas, 1 méter átmérőjű fészkét.

A vizes élőhelyeken sok sirályfaj is él. Leggyakoribb közülük a dankasirály. Főleg rovarokkal táplálkozik, ezért gyakran láthatjuk a frissen felszántott földeken. Megeszi a hulladékokat is. A nem megfelelően kezelt szemétlerakó helyeket tömegesen ellepik.
A kárókatona (más néven kormorán) is telepekben fészkel. Zsákmányszerzéskor a víz alá bukik, lábait evezőként használja. Gyakori, hogy a sikeres zsákmányszerzésért több kormorán társul egymással. A vízben tollazatuk átnedvesedik. Ezért gyakran láthatjuk őket szétterpesztett szárnyakkal, amikor is tollazatukat szárítják.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd, hogyan alkalmazkodott a tőkés réce teste a vízi életmódhoz!
2. Mi jellemző a fehér gólya testfelépítésére, táplálkozására és szaporodására?
3. Indokold meg, mi lehet a gólyák költözésének az oka!
4. Mi árulja el a barna rétihéja testfelépítésén, hogy ragadozó madár?