Az erdő életközössége

agancs: A szarvasfélék hímjei fején növő csontképződmény, amelyet évente elhullatnak.

agyar: A disznófélék meghosszabbodott szemfoga, amely a csukott szájból kilóg, a táplálék megszerzését segíti, egyben védekezőfegyver is.

aljnövényzet: A több szintre tagozódó növénytakaró legalsó szintje.

alkalmazkodás: Egy élőlény testfelépítésének, életmódjának és viselkedésének azok a sajátosságai, amelyek biztosítják a túlélést, alkalmassá teszik az élőlényt arra, hogy adott környezetben élhessen és fennmaradjon. Az élőlényeknek ezek a képességei több millió éves fejlődés során alakultak ki, és a természetes kiválasztódás révén maradtak fenn.

avar: A talaj felszínére hullott, le nem bomlott növényi eredetű anyag (főleg elszáradt levelek).

barkavirágzat: Lefelé csüngő virágzati tengelyen ülnek a virágok.

belső megtermékenyítés: Olyan szaporodási forma, amikor a petesejt és a hímivarsejt az anya testén belül egyesül.

beporzás: A virágpor szállítása egyik virágról a másikra, ami a szél, a víz és rovarok által történhet. Célja, hogy a virágok megtermékenyüljenek, és termést, magot érleljenek.

cserje: Olyan fás szárú növény, amelynek nincs törzse, ágai közvetlenül a talaj felett elágaznak.

csírázás: Az a folyamat, amikor a magból kifejlődik a csíranövény.

egyensúly (dinamikus) **az életközösségben:** Olyan állapot, amelyben hosszabb időszakot figyelembe véve nem változik a növények, a növényevők, a ragadozók és a lebontó szervezetek száma. Az egyensúly fennmaradását alapvetően a táplálkozási láncok zavartalan működése biztosítja.

egylaki növény: Egy növényen helyezkednek el a porzós és a termős virágok.

életközösség: Az élőhelyből és az ott élő élőlényekből áll, amelyek szoros, önfenntartó kapcsolatban állnak egymással.

élettelen környezeti tényezők: Azok a fizikai és kémiai sajátosságok (talaj, víz, levegő, fény, hőmérséklet stb.), amelyek az adott élőhelyen az élő szervezetekre hatnak.

élőhely: Egy növény- vagy állatcsoport természetes otthona, olyan terület, amely az ott élő élőlények életfeltételeit biztosítja. Más megfogalmazásban: annak a környezetnek az egésze (erdő, szántóföld, tó stb.), amelyben egy élőlény él. Az élőlények alkalmazkodnak az élőhely környezeti feltételeihez, kapcsolatban vannak a környezetükkel, hatnak rá, onnan anyagokat vesznek fel, és anyagokat adnak le.

élő környezeti tényezők: Az életközösségen belül az élőlények között kialakult kapcsolatok, kölcsönhatások. Ezek közül a legfontosabbak a táplálkozási kapcsolatok, táplálékhálózatok.

emésztés: Olyan folyamat, melynek során az összetett anyagok egyszerűbb vegyületekké bomlanak le, majd ezek az anyagok felszívódnak, és energiaforrásként vagy a test építőanyagaiként szolgálnak.

erdőpusztulás: Az erdős területek fáinak fokozott mértékű kihalása. Legfőbb oka a fák tömeges betegsége, a fertőzés és a környezetszennyezés is (savas esők).

erdőszél: Az erdőnek az a része, amely a szomszédos életközösséggel határos. Ez lehet egy füves terület, szántóföld, egy tó vagy akár egy közút is.

erdő szintjei: Az erdő felosztása aszerint, hogy a növényzet a talajtól a lombkorona csúcsáig hogyan helyezkedik el.

fenntartható fejlődés: A természeti erőforrásokkal való észszerű gazdálkodás, takarékoskodás a környezet védelme érdekében. Jelenti olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását, amelyek nem fordulnak szembe a természetes folyamatokkal.

fesztávolság: A kiterpesztett szárnyak két végpontja közötti távolság.

fotoszintézis: Az a folyamat, melynek során a zöld növények szén-dioxidból és vízből a napenergia felhasználásával szerves (összetett) anyagot (cukrot) készítenek.

gerincesek: Azok az állatok, amelyek testének középvonalában gerincoszlop húzódik.

gerinctelenek: Azok az állatok, amelyeknél hiányzik a gerincoszlop.

gombák: Olyan élőlények, amelyek elpusztult vagy élő növények és állatok összetett anyagaival táplálkoznak. Lehetnek egysejtűek vagy többsejtű telepes felépítésűek.

gyapjúréteg: Az emlősök hosszabb, vastagabb fedőszőrei alatt kialakuló puha, finom szerkezetű szőrzet.

gyöktörzs (idegen szóval rizóma): Föld alatti módosult szár.

hagyma: A talajban lévő módosult hajtás, a növények áttelelő szerve, sok tápanyagot raktároz. Magvastagodott alsó levelekből (hagymalevelekből) áll.

hímnős (kétivarú) **virág:** Olyan virág, amelyben porzók és termők is vannak, vagy kétivarúak.

kérődző: Olyan állat, amelynek összetett gyomra van, és a részben megemésztett táplálékot felöklendezi, és újra megrágja.

kihalás, kipusztulás: Egy faj teljes eltűnése akár egy kisebb élőhelyről, akár az egész Földről. A kihalás oka lehet természetes ok (például az alkalmazkodási képesség hiánya) vagy mesterséges ok (például környezetszennyezés, vadászat).

korhadékevő (idegen szóval szaprofita): Olyan élőlény, amely elhalt élőlények összetett anyagaival táplálkozik.

környezetszennyezés: Az emberi tevékenység nyomán káros anyagok felhalmozódása a környezetben.

lárva: Fiatalkori fejlődési állapot valamely állat életciklusában. A lárva testfelépítése és életmódja legtöbbször eltérő a kifejlett állatétól.

lebontás folyamata: Az élőlények maradványainak szétesése, amelyet többnyire a baktériumok és gombák életműködése biztosít. A folyamat során ásványi anyagok szabadulnak fel, amelyek újra hasznosulnak a környezetben.

lebontó szervezetek: Elhalt élőlények maradványaival táplálkoznak, így jutnak energiához. A lebontó szervezetek az összetett anyagokat egyszerűbb anyagokká bontják le.

leples virág: Egynemű takarólevelekből álló virág, nem különül csésze- és sziromlevelekre.

levegő: A Földet körülvevő gázok keveréke; legnagyobb mennyiségben nitrogént és oxigént tartalmaz.

lombhullató: Olyan fás szárú növény, amely nyugalmi állapotban rendszeresen lehullatja leveleit. A lombhullató fák levelei szélesek, erezetük jól látható, nyéllel kapcsolódnak a vesszőhöz.

mag: A nyitvatermő és a zárvatermő növények virágának megtermékenyítése után a magkezdeményből alakul ki. Tartalmazza az embriót (gyököcskét, rügyecskét, sziklevelet) és számos esetben az elterjedést segítő részt is (szárnyas magokat, repítőszőröket).

makktermés: Egymagú, száraz, fel nem nyíló termés.

mar: A talpszinttől nézve az állat hátának legmagasabb pontja. A marmagasság ennek a távolságnak a mértékegységben kifejezett nagysága.

mesterséges életközösség: Az ember hozza létre, benne az anyagforgalmat az emberi tevékenységek szabályozzák. Ilyen például a telepített erdő, a halastó, gyümölcsöskert stb.

mindenevő: Olyan állat, amely növényi és állati eredetű táplálékot egyaránt fogyaszt.

mirigyek: Olyan szervek, amelyek sajátos anyagokat (mérget, nyálkát stb.) termelnek.

növényevő: Olyan állat, amely élő növényi részekkel táplálkozik.

ragadozó: Olyan állat, amely más, élő állatokat zsákmányol.

sokféleség: Az életközösség összetettsége, fajgazdagsága. Minél változatosabb a környezet (optimum), annál nagyobb lesz az adott élőhelyen a fajok száma.

spóra: Olyan ivartalan szaporítósejt, amelyből kedvező környezeti feltételek mellett új, többsejtű növény vagy gomba fejlődik. A spórákkal szaporodó növényeknek (zuzmóknak, moháknak, páfrányoknak) nincs viráguk és magjuk sem.

szintezettség: Egy élőhely (például erdő vagy víz) függőleges tagozódása. Minden szintnek jellegzetes növény- és állatvilága van.

talajpusztulás (idegen szóval erózió): A talaj legfontosabb, felső rétegének lepusztulása, főleg a szél vagy az eső hatására. Okozhatja a helytelen mezőgazdasági tevékenység, az erdőpusztítás, a nem megfelelő öntözés.

tápanyagok: Az élőlények növekedéséhez, fejlődéséhez szükséges egyszerű (szervetlen) és összetett (szerves) anyagok.

táplálkozás: Olyan életjelenség, melynek során az élőlények a környezetükből tápanyagokat vesznek fel. Az életközösségen belül az anyagforgalom első mozzanata. A növények táplálkozásukban önellátók, környezetük egyszerű (szervetlen) anyagait veszik fel, és összetett anyagokká alakítják azokat. Az állatok közvetlenül vagy közvetve a növények által készített összetett anyagokkal táplálkoznak, a növények által termelt oxigént lélegzik be. Az állatok szervezetében képződött szén-dioxidot a növények hasznosítják az összetett anyagok képzése (a fotoszintézis) során.

táplálkozási hálózat: A táplálékláncok sokféleségének az összekapcsolódása, szövedéke, aminek oka, hogy egy élőlény több táplálkozási láncnak is tagja lehet. Például egy macskabagoly kb. 30 különböző faj egyedeivel táplálkozik. A táplálékhálózatokon keresztül valósul meg az anyagok körforgása.

táplálkozási lánc: A táplálékforrások alapján egymással táplálkozási kapcsolatban lévő élőlények együttese. A termelő szervezetek a zöld növények, a fogyasztó élőlények a növényevők vagy más állatokkal táplálkozó húsevők (ragadozók). A csúcsragadozók azok az állatok, melyekkel más állatok már nem táplálkoznak.

táplálkozási piramis: Piramis alakú diagram, amely a táplálkozási lánc egyes szintjein található élőlények egyedszámát és össztömegét mutatja.

tobozvirágzat: A nyitvatermő fenyőfélék termős virágait tartalmazó elfásodó virágzat.

tövis: Az ág, a levél szúrós, hegyes módosulása.

túlélés: Az élőlények életben maradási képessége valamilyen kedvezőtlen környezeti hatással szemben (táplálékhiány, hőmérséklet-változások, versengés stb.). A túlélésre – a környezeti feltételekhez alkalmazkodva – az élőlények különböző szervezeti sajátosságokat fejlesztettek ki (zsír-, vízraktározás, párologtatáscsökkentés, téli álom, költözés stb.).

tűlevél: A fenyőfélékre jellemző olyan levél, amelyek többnyire vékonyak, hegyesek, nincs levélnyelük, és nagyobb részük örökzöld.

vacok: A virágtengely kiszélesedő része.

vándorlás: Az állatoknak különböző élőhelyek közötti, évszakokhoz köthető mozgása, melynek célja a táplálkozás vagy a szaporodás.

váz: Támaszt nyújt a testnek. Lehet külső váz, például a csigák, kagylók meszes váza vagy a rovarok kitines váza, és lehet belső váz, ilyenek a csontok és porcok.

Kölcsönhatások. Az energia

belső energia: A testek belső szerkezetével, a részecskék rendezetlen mozgásával összefüggő energia.

csillag: A Földhöz viszonyítva hatalmas méretű égitest. A benne lezajló fizikai folyamatok következtében fényt és hőt sugároz.

elektromos kölcsönhatás: A különböző elektromos állapotú testek között jelentkező vonzó- vagy taszítóhatás.

elektromos mező: Az elektromos állapotú testeket körülvevő, sajátságos környezet. Más testekre kifejtett hatása vonzó- vagy taszítóhatás.

energia: A testek változtatóképessége.

erőhatás: A testek mozgásállapotát megváltoztató hatás.

gravitációs kölcsönhatás: A testek között jelentkező vonzóhatás.

gravitációs mező: A testeket körülvevő sajátságos környezet. Más testekre kifejtett hatása mindig vonzóhatás.

helyzeti energia: A felemelt testek változtatóképessége.

hőenergia (hő): A belsőenergia-változással járó folyamatok során átadott, illetve átvett energia.

kémiai változás: Olyan változás, amelyben megváltozik a részt vevő anyagok minősége, és új anyagok keletkeznek.

kölcsönhatás: A testek egymásra kifejtett hatása.

környezetszennyező anyag: Az embert, illetve a környezetet veszélyeztető vagy károsító anyag.

mágneses kölcsönhatás: Mágnes és mágnes, illetve mágnes és mágnesezhető anyag közötti kölcsönhatás.

mágneses mező: A mágneseket körülvevő, sajátságos környezet. Mágnesekre vonzó- vagy taszító-, mágnesezhető anyagokra vonzóhatást fejt ki.

mechanikai energia: Gyűjtőfogalom; idetartozik a rugalmas, a helyzeti és a mozgási energia.

mechanikai kölcsönhatás: Gyűjtőfogalom; idetartozik minden, a mozgásállapot-változással járó kölcsönhatás.

megújuló energiaforrás: Olyan energiaforrás, amely a természeti folyamatok révén állandóan rendelkezésünkre áll vagy újratermelődik (például napenergia, szélenergia, vízenergia).

mozgásállapot: Gyűjtőfogalom; azt fejezi ki, hogy egy test más testekhez viszonyítva hogyan mozog.

mozgási energia: A mozgó testek változtatóképessége.

napelem: A napsugárzás hasznosításának egyik eszköze. A napsugárzás energiáját elektromos energiává alakítja át.

napenergia: A Nap belsejében lejátszódó folyamatokban termelődő energia. Hétköznapi értelemben a Föld felszínét elérő, általunk hasznosítható napsugárzást értjük alatta.

napkollektor: A napsugárzás hasznosításának egyik eszköze. A napsugarak a kollektor csőrendszerében keringő folyadékot melegítik fel.

nem megújuló energiaforrás: Olyan energiaforrás, amely nem vagy csak nagyon hosszú idő alatt tud újratermelődni (például a kőszén, a kőolaj és a földgáz).

radioaktív anyag: Részecskéi külső beavatkozás nélkül más anyagokká alakulnak át, miközben különböző sugárzásokat bocsát ki.

rugalmas energia: Az összenyomott (vagy megnyújtott) rugó változtatóképessége.

termikus kölcsönhatás: A testek között különböző hőmérsékletük miatt fellépő hatás.

A Föld bolygó

Baktérítő: Nevezetes szélességi kör az északi szélesség 23,5°-án.

bolygó: Saját fénnyel nem rendelkező nagy méretű égitest a Naprendszerben. A Naprendszer bolygói a Naptól távolodó sorrendben: A Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz.

csillagok: Magas hőmérsékletű égitestek, saját fénnyel rendelkeznek, akárcsak a Nap.

déli félgömb: Az Egyenlítőtől délre található félgömb.

déli sarkkör: Nevezetes szélességi kör a déli szélesség 66,5°-án.

Déli-sark: A déli félgömbön, a déli szélesség 90°-án található legkisebb szélességi kör, a Föld legdélebbi pontja.

déli szélesség: A déli félgömbön található szélességi körök jelzőjeként használjuk; rövidítése: d. sz.

éghajlati övezet: A Föld gömb alakjának következtében alakul ki. A napsugarak beesési szögének megfelelően forró vagy trópusi, mérsékelt és hideg éghajlati övezetről beszélhetünk. Csaknem megszakítás nélkül fogják körbe a Földet.

Egyenlítő: Kör alakú vonal, amely a Földet széltében két egyenlő félgömbre osztja. A leghosszabb szélességi kör.

északi félgömb: Az Egyenlítőtől északra található félgömb.

Északi-sark: Az északi félgömbön, az északi szélesség 90°-án található legkisebb szélességi kör, a Föld legészakibb pontja.

északi sarkkör: Nevezetes szélességi kör az északi szélesség 66,5°-án.

északi szélesség: Az északi félgömbön található szélességi körök jelzőjeként használjuk; rövidítése: é. sz.

év: Az évi időszámítás alapegysége, vagyis az az időszak, ami alatt a Föld egyszer körbejárja a Nap körüli pályáját. Időtartama (kerekítve): 365 és 1/4 nap.

forró (trópusi) éghajlati övezet: Az Egyenlítő két oldalán, a térítők között elhelyezkedő éghajlati övezet; a legmelegebb éghajlati övezet változatos éghajlatokkal.

Föld forgástengelye: Az Északi- és a Déli-sarkon keresztülfutó képzeletbeli tengely, 66,5°-ot zár be a keringés síkjára.

földrajzi fokhálózat: A szélességi és a hosszúsági körök által alkotott képzeletbeli háló a földgömbön.

földrajzi hosszúság: A kezdő hosszúsági körhöz (Greenwichhez) viszonyított távolság fokokban kifejezve.

földrajzi szélesség: A kezdő szélességi körhöz, az Egyenlítőhöz viszonyított távolság fokokban kifejezve.

földrész (kontinens): A legnagyobb kiterjedésű szárazföld.

GPS: Egy helymeghatározó rendszer. A segítségével bárhol – szárazföldön, vízen és levegőben egyaránt – és bármikor meghatározható egy adott pont helye.

hideg éghajlati övezet: A sarkkörökön belül húzódó éghajlati övezet, amelynek jellemzője a nagyon alacsony hőmérséklet.

hosszúsági körök: É–D irányú, egyenlő nagyságú, olyan, a földgömbre rajzolt képzeletbeli körök, amelyek a sarkpontokon metszik egymást.

keleti hosszúság: A kezdő hosszúsági körtől (Greenwichtől) keletre elhelyezkedő hosszúsági körök jelzője; rövidítése: k. h.

kezdő hosszúsági kör: 0°, London külvárosán, Greenwichen húzódik keresztül, innen kapta a nevét is.

mérsékelt éghajlati övezet: A térítők és a sarkkörök között elhelyezkedő éghajlati övezet. Általában négy évszak jellemzi. A légmozgás nyugati irányú. Az északi félgömbön az északi, a déli félgömbön pedig a déli mérsékelt övezet található.

Nap: 1. A Naprendszer középpontjában található csillag, amely fényt és meleget sugároz a Földre. 2. nap: A Nap két egymást követő delelése között eltelt idő. Minden napot éjféltől a következő éjfélig számítunk, és 24 órára osztjuk be.

Naprendszer: Részei a Nap, a bolygók és a holdjaik, a kisbolygók, az üstökösök, a meteorok és a bolygók közötti gáz- és porfelhők, valamint mesterséges égitestek. Középpontjában a Nap található.

nevezetes szélességi körök: Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-sark. Kijelölik az éghajlati övezetek határait.

nyári napforduló: Június 22-én délben a napsugarak a Ráktérítőre esnek merőlegesen, ezért az északi félgömbön ezen a napon a leghosszabbak a nappalok. Az északi félgömbön a csillagászati nyár kezdete.

nyugati hosszúság: A kezdő hosszúsági körtől (Greenwichtől) nyugatra elhelyezkedő hosszúsági körök jelzője; rövidítése: ny. h.

óceán: A legnagyobb kiterjedésű állóvíz.

óceáni hatás: Az óceánok irányából érkező légtömegeknek a szárazföld éghajlatára gyakorolt hatása: állandó páradús légtömegek és az óceánok hűtő-fűtő hatása.

őszi nap-éj egyenlőség: A Nap szeptember 23-án egyformán világítja meg az északi és a déli félgömböt. Emiatt a nappal és az éjszaka egyaránt 12-12 óra hosszat tart. Az északi félgömbön a csillagászati ősz kezdete.

Ráktérítő: Nevezetes szélességi kör a déli szélesség 23,5°-án.

szélességi körök: Ny–K irányú, különböző nagyságú, olyan, a földgömbre rajzolt képzeletbeli körök, amelyek az Egyenlítővel párhuzamosan helyezkednek el.

tavaszi nap-éj egyenlőség: Március 21-én délben a napsugarak az Egyenlítőre esnek merőlegesen, ezen a napon a Nap egyformán világítja meg az északi és a déli félgömböt, emiatt a nappal és az éjszaka egyaránt 12-12 óra hosszat tart. Az északi félgömbön a csillagászati tavasz kezdete.

téli napforduló: December 21-én délben a napsugarak a Baktérítőre esnek merőlegesen, ezért az északi félgömbön ezen a napon a legrövidebbek a nappalok. Az északi félgömbön a csillagászati nyár kezdete.

tényleges földrajzi helyzet: Azt mutatja, hogy egy adott hely hol helyezkedik el a Földön, vagyis melyik szélességi és hosszúsági körök futnak rajta keresztül, és mi jellemzi a tengerszint feletti magasságát.

világegyetem: Része a Naprendszer és minden, amit akkor látunk, ha felnézünk az égboltra.

viszonylagos földrajzi helyzet: Más területekhez, például a szomszédos földrajzi helyekhez való viszonyt jelenti.

A természet erői

andezit: A magmás kőzetek csoportjába tartozó, a vulkánkitörések közben a felszínre ömlő láva megszilárdulásával keletkezett finom szemcsés, kemény kőzet.

aprózódás: Amikor a külső erők hatására a kőzetek darabjaikra esnek szét.

bazalt: A magmás kőzetek csoportjába tartozó, a vulkánkitörések során felszínre került kőzetolvadék megszilárdulása után keletkezett rendkívül kemény kőzet. A színe a szürkétől a feketéig terjedhet.

belső erők: A Föld belsejéből ható erők, ezeknek köszönhető a gyűrődés, a vetődés, ezek emelik magasra a hegységeket, hozzák létre a vulkánokat.

deltatorkolat: A tengerhez közeledő folyó által lerakott hordalékból létrejövő torkolat.

erózió: A talaj pusztulása; a legnagyobb kárt a víz és a szél pusztító tevékenysége okozza.

futóhomok: A szél által szállított, görgetett homok.

gleccser: A hegy lejtőjén lefelé mozgó jégtömeg.

gyűrődés: A Föld mélyén a nagyon magas hőmérsékleten képlékennyé váló kőzetrétegek tartós oldalirányú erők hatására meggyűrődnek.

humusz (televény): A talajban felhalmozódó növényi és állati maradványok.

karsztformák: A karsztosodás során a csapadékvíz oldó hatására kialakult formák (például víznyelő, dolina, barlang, cseppkő).

karsztosodás: A csapadékvíz oldó hatására a mészkőhegységekben bekövetkező változások.

kialudt vulkán: Olyan vulkán, amely többé már nem tör ki, múltbeli kitöréseiről csak a felépítő kőzetük és a formájuk árulkodik.

komposztálás: A komposzt előállításának a folyamata. A komposzt egy olyan, tápanyagban gazdag anyag, ami a növényi hulladékok oxigén jelenlétében végbement bomlása során keletkezik. A talaj tápanyag-utánpótlására használják.

kőzet: A földfelszín szilárd alkotói, melyek lehetnek magmás, üledékes és átalakult kőzetek.

kráter: A vulkán része, ezen keresztül ömlik a felszínre a láva.

külső erők: A hőingás, a szél, a víz, a jég, az élővilág. Nagy szerepük van a felszínformálásban.

lánchegység: Gyűrődés során kialakult hegység, melynek a vonulatai láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz. Párhuzamos hegyvonulatok és hosszanti völgyek jellemzik. Magasságukból következik, hogy felszínüket a jég által kialakított hegyes, sziklás csúcsok, éles, csipkézett gerincek és meredek, szakadékos lejtőjű hegyoldalak jellemzik.

láva: A felszínre került izzó kőzetolvadék.

lepusztulás: Amikor a földfelszín anyagai a külső erők (hőingás, fagy, szél, folyóvizek, jég) hatására lepusztulnak.

lösz: Nagyon puha, a szél által felhalmozott finom porból kialakult üledékes kőzet.

magma: Nagy mélységben található izzó kőzetolvadék.

magmakamra: Nagy mélységben található üreg, amelyben az izzó kőzetolvadék, a magma helyezkedik el.

magmás kőzetek: Az olvadt kőzetanyag kihűlésével keletkeztek nagy mélységben vagy a felszínen (például gránit, andezit, bazalt).

mészkő: A leggyakoribb üledékes kőzet; a tengerek és a tavak medencéjében alakult ki, ahol az üledékek az elpusztult élőlények mészvázaival cementálódnak össze.

ökológiai kertművelés: Olyan gazdálkodási forma, mely tiltja vagy nagymértékben korlátozza a növényvédő szerek, műtrágyák és bizonyos talajjavító szerek alkalmazását.

rétegvulkán: A vulkánkitörés többszöri megismétlődése következményeként az egymást váltó lávaömlések és törmelékszórások anyagából alakul ki. Vulkáni és vulkáni törmelékes kőzet váltakozva építi fel.

röghegység: Vetődéssel kialakult, rögökből álló, lesüllyedt árkokkal és medencékkel tagolt hegység.

sivatagok: Ott alakulnak ki, ahol az időjárás miatt a felszínen nem képes megtelepedni a növényzet. Ennek oka lehet a csapadék hiánya, de a nagy hideg is kialakíthatja.

talaj: A földfelszín legfelső, laza, termékeny takarója.

talajpusztulás: Amikor a víz a talaj felső rétegeiből kimossa és elszállítja a kisebb részecskéket, fokozatosan elvékonyodik a termőréteg. A szél a száraz területeken a talajpusztító tevékenysége során kifújja a talajszemcséket.

sziget: Vízzel körülvett szárazföld álló- és folyóvizekben.

törésvonal: Akkor alakul ki, amikor az egymásra rakódott kőzetrétegek a belső erők hatására megpattannak; ezek mentén emelkednek ki vagy süllyednek le a kőzetrétegek egyes részei.

üledékes kőzetek: Lepusztuló kőzetek törmelékeiből, valamint élőlények maradványaiból épülnek fel, legtöbbször a tengerek és a tavak fenekén ülepednek le, ahol összecementálódnak, de kialakulhatnak a szárazföldek felszínén is.

V alakú völgy: Nagy esésű folyók által kialakított völgy.

vetődés: A törésvonalak mentén a belső erők hatására az egyes rétegek kiemelkednek, míg mások lesüllyednek.

vízjárás: A folyók vízszintjének az ingadozása.

vízhozam: A folyómeder keresztmetszetén egységnyi idő (másodperc, perc) alatt átfolyó víz térfogata.

víznyelő: Tölcsér alakú, felszíni karsztjelenség.

vulkáni tufa: A vulkáni működés során a törmelékekből kialakuló puha kőzet.

zátony: A folyó által lerakott hordalékból álló, a víz felszíne alatt található képződmény a folyómederben; tengerekben is jellemző, ott a hullámzás hordja össze.

U alakú völgy: A gleccserjég csiszoló munkája által kialakított völgy.

Az őshonos füves területek és a mezők életközössége

áttelelés: Téli nyugalmi állapot, melynek célja a kedvezőtlen időszak átvészelése. A növényeknél ilyenek például az áttelelő szervek (rügy, hagyma, gyöktörzs stb.), az állatoknál a téli álom (sün) vagy a részleges téli álom (denevérek).

cellulóz: Összetett anyag (szénhidrát), amely a növények sejtfalát alkotja. A növényevők számára nehezen emészthető, rostos tápanyag. Az emésztését (lebontását) a növényevő állatok bélcsatornájában élő baktériumok segítik.

egynyári növény: Olyan lágy szárú növény, amelynek élete tavasztól őszig tart, ilyen például a paprika, a paradicsom, az uborka, a bab vagy a borsó.

együttélés (szimbiózis): Két élőlény közötti szoros kapcsolat, amely mindkét faj számára hasznos.

élőlények sokfélesége: Az élővilág teljes változatossága, amely az evolúció során alakult ki.

globális felmelegedés (éghajlatváltozás): A Földön az átlagos hőmérséklet mérhető növekedése a korábbi adatokhoz képest.

hüvelytermés: Száraz, felnyíló termés, például a borsó vagy a bab.

ivaros szaporodás: A szaporodás egyik módja, ivarilag különböző egyedektől származó hím- és női ivarsejtek egyesülésével (megtermékenyítés) kezdődik az új egyed kifejlődése.

kaszattermés: A fészekvirágzatúak egymagvú, zárt, száraz termése.

kloáka: A tápcsatorna, a kiválasztó szerv és az ivarszervek közös kivezető nyílása.

műtrágya: Kémiai anyag, melyet a termesztett növények növekedésének serkentésére használnak.

zárt termések: Olyan termések, amelyek nem nyílnak fel, a mag csak a termésfal felnyitása, lebomlása után válik szabaddá.

Vizek, vízpartok életközössége

álcázás: Egy állat kültakarójának olyan színezete, mintázata, viselkedése, amelynek segítségével jól beleolvad a környezetébe.

bőrlégzés: A testfelszínen keresztül történő gázcsere.

dögevő: Olyan állat, amely elpusztult állatok maradványaival táplálkozik, vagy más állatok által otthagyott tetemek maradványait fogyasztja el.

élősködő (parazita): Olyan élőlény, amely egy másik élőlényben vagy annak testfelszínén él, és annak anyagaival táplálkozik.

gazdaszervezet: Állat vagy növény, amelyből az élősködők táplálkoznak.

gyökérsarj: Gyökerekből kifejlődő hajtás (leveles szár).

ivartalan szaporodás: A szaporodás nem ivarsejtek egyesülésével kezdődik, ilyen például az osztódás, sarjadzás.

kétlaki növény: Az egyivarú porzós és termős virágok külön-külön növényen helyezkednek el.

kopoltyú: A vízben élő állatok légzőszerve, amelyen keresztül felveszik az oxigént, és leadják a szén-dioxidot.

külső megtermékenyítés: Az ivarsejtek (petesejtek, hímivarsejtek) a nőstény testén kívül egyesülnek.

moszatok: Egyszerű testfelépítésű, egysejtű vagy többsejtű növények, melyeknek nincs gyökerük, száruk, levelük és viráguk.

oldalvonal: A halak testén hosszirányban húzódó érzékszerv, mellyel érzékelik a vízben az áramlásokat, rezgéseket.

önszabályozás: Egy életközösségben az élőlények olyan működése, amellyel a kedvezőtlen, zavaró hatásokat életműködéseikkel szabályozzák, kiküszöbölik vagy kiegyensúlyozzák. Ilyen például a vizek öntisztuló képessége.

öntisztuló képesség: A természetes vizek olyan tulajdonsága, melynek köszönhetően a bennük élő parányi élőlények képesek lebontani, hatástalanítani a szennyeződéseket.

plankton: Növények és állatok tömege, melyek a vízben lebegnek, szabad szemmel nem vagy alig láthatók. Gyorsan szaporodnak.

tápanyag-feldúsulás (idegen szóval eutrofizáció): A vizekben bizonyos tápanyagok (nitrogén, foszfor) felhalmozódása, mely a növényzet túlzott elszaporodását váltja ki.

torzsa: Megvastagodott virágzati tengely.

tűrőképesség: Az a mérték (a minimum és a maximum közötti távolság), amelyen belül az élőlények a környezet hatásait elviselik.

vízszennyezés: Olyan oldott és oldhatatlan anyagok jelenléte a vízben, amelyek a vízi életfeltételeket kedvezőtlenül befolyásolják.