

# โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคความดันโลหิตสูง สามารถตรวจพบได้จากการวัดความดันโลหิตได้ในระดับที่สูงกว่าปกติ และเรื้อรังเป็นเวลานาน โดยองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ผู้ที่มีความดันโลหิต มากกว่า 140/90 มม.ปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง หากไม่รักษา หรือควบคุมระดับความดันโลหิตจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่ตามมา

ประเภทของความดันโลหิต


| ประเภท                                   | ตัวบน (มม.ปรอท) | ตัวล่าง (มม.ปรอท) | คำแนะนำ                                                             |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| เหมาะสม                                  | น้อยกว่า 120    | น้อยกว่า 80       | 1. ควบคุมอาหาร<br>2. ออกกำลังกาย<br>3. วัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ |
| ปกติ                                     | 120 - 129       | 80 - 84           |                                                                     |
| สูงกว่าปกติ                              | 130 - 139       | 85 - 89           | ปรึกษาแพทย์                                                         |
| โรคความดันโลหิตสูง<br>ระยะที่ 1 เริ่มแรก | 140 - 159       | 90 - 99           | พบแพทย์                                                             |
| โรคความดันโลหิตสูง<br>ระยะที่ 1 ปานกลาง  | 160 - 179       | 100 - 109         |                                                                     |
| ระยะที่ 3 รุนแรง                         | 180 ขึ้นไป      | 110 ขึ้นไป        | พบแพทย์โดยด่วน                                                      |

ที่มา : สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2562

## ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตสูง



อายุที่เพิ่มขึ้น



พันธุกรรม คนครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง



เวลา ความดันโลหิตจะขึ้นๆ ลงๆ ไม่เท่ากันทั้งวัน ช่วงบ่ายวัดได้มากกว่าเช้า และวัดได้ต่ำสุดขณะนอนหลับ



เกลือ ผู้ที่กินอาหารเค็มมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้มากกว่า




จิตใจและอารมณ์ หากมีความเครียด หรือรู้สึกเจ็บปวด ก็เป็นเหตุให้ความดันโลหิตสูงได้



ผู้ที่อยู่ในสังคมเมือง จะพบภาวะความดันโลหิตสูงกว่าสังคมชนบท

## อาการของผู้มีความดันโลหิตสูง

ส่วนใหญ่ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอาจไม่มีอาการ หรืออาจจะมีอาการต่างๆ ดังนี้



ปวดศีรษะ



เวียนศีรษะ



มึนงง



เหนื่อยง่ายผิดปกติ

## ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

**ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง** เป็นเวลานาน และควบคุมความดันโลหิตไม่ดี จะเกิดผลตามมา

### ระยะสั้น

เกิดในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงจะมีอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอย

- ตามัวจากจักษุประสาทตาบวม
- ซึมลงและชัก
- เจ็บหน้าอก กลางหน้าอก ร้าวมาที่คอหรือแขนซ้าย
- เหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้
- ปวดบริเวณหน้าอกหรือท้องทะลุหลังอย่างเฉียบพลัน
- แขนขาชาหรืออ่อนแรงเฉียบพลัน

### ผลระยะยาว

เกิดในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงโดยไม่มีอาการระยะแรก แต่เกิดอาการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เมื่อเป็นมากกว่า 10 ปี

- เหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกาย
- เจ็บหน้าอกเวลาออกกำลังกาย หรือเวลาอยู่เฉยๆ ก็ได้
- แขน ขา อ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก
- อ่อนเพลียจากภาวะขาด บวมตามขาและหน้า
- เดินระยะสั้นๆ จะปวดขาข้างเดียวหรือสองข้างจนต้องหยุดพัก


# ความดันโลหิตผิดปกติ แก้ไขได้ทัน

## 1 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉิน


คือต้องการรักษา กินยาไม่สม่ำเสมอ มีโรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง มีอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ติดบุหรี่ สุราเรื้อรัง มีภาวะเครียด อารมณ์แปรปรวน

## 2 อาการที่มีความผิดปกติและต้องรีบแก้ไข

- เหนื่อยง่ายผิดปกติ
- ตื่นกลางดึก ลูกขึ้นมาหอบ นอนราบไม่ได้
- ชีตผิดปกติร่วมกับเท้าบวมตอนบ่าย ปัสสาวะบ่อยกลางคืน
- ปวดศีรษะ ตามัวโดยไม่ได้เป็นต้อกระจก
- สับสนกระวนกระวาย ซึมจนถึงชัก
- แขนขา ชา อ่อนแรงซีกเดียวทันทีหรือมองไม่เห็นชั่วคราวข้างหนึ่งและหายได้เองใน 24 ชม.
- เจ็บแน่นหน้าอกตรงกลาง อาจร้าวไปที่คอหรือแขนซ้าย
- ปวดบริเวณหน้าอกหรือท้องอย่างรุนแรงเฉียบพลัน ร้าวไปข้างหลัง
- ลูกขึ้นหน้ามืดบ่อยๆ
- ใจสั่นผิดปกติ ชีพจรเต้นไม่เป็นจังหวะ



## แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น




1 หากมีเครื่องวัดความดันที่บ้าน ให้วัดว่าสูงหรือต่ำผิดปกติหรือไม่



2 กรณีความดันโลหิตสูง เพราะหยุดยาไป ให้กินยาเดิม



3 กรณีความดันโลหิตต่ำ อาจมีสาเหตุจาก ท้องเสีย อาเจียน เลือดออกทางเดินอาหาร หรือได้รับยาลดความดันโลหิตเกินขนาด ให้นอนราบ และดื่มน้ำเกลือแร่ปริมาณเท่าที่ดื่มได้ และหยุดยาลดความดันโลหิตไปก่อน



4 กรณีเหนื่อย นอนราบไม่ได้ ให้นอนหัวสูง

หลังดูแลตนเองเบื้องต้น ให้รีบไปพบแพทย์ ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรเรียกรถฉุกเฉิน

ที่มา : สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2565

## การป้องกันภาวะแทรกซ้อน จากความดันโลหิตสูง



1. ควบคุมควบคุมความดันโลหิต
  - อายุต่ำกว่า 50 ปี ควรต่ำกว่า 130/80 มม.ปรอท
  - อายุ 50 ปีขึ้นไป และมีโรคเรื้อรัง ความดันโลหิตต้องต่ำกว่า 140/90 มม.ปรอท
  - อายุ 60 ปี ขึ้นไป ต่ำกว่า 150/90 มม.ปรอท
2. ลดอาหารเค็มในอาหาร โดยคำนึงถึงปริมาณเกลือ ผงชูรส เครื่องปรุงรสต่างๆ เสี่ยงของหมักดอง
3. กินอาหารในปริมาณที่พออิ่ม จดอาหารหนักก่อนนอน และไม่ควรไปงานเลี้ยงหรือกินบุฟเฟต์บ่อย
4. งดสูบบุหรี่ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
5. ออกกำลังกายทุกครั้งที่มีโอกาส หรือ ทำงานบ้านต่อเนื่องประมาณ 30 นาที
6. หลีกเลี่ยงความเครียด ทำจิตใจให้แจ่มใส ฟังทำสมาธิ ดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นกีฬา
7. กินยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง
8. ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทุกปี

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักงานฯ กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2203 2855 [www.bangkok.go.th/health](http://www.bangkok.go.th/health)

สำนักงานฯ กรุงเทพมหานคร

สปส.02/01/65



# ความดันโลหิตสูง...อันตรายกว่าที่คุณคิด

