Семинар 6.

Семинары: Погорелова П.В.

Блочные матрицы и безусловное прогнозирование.

Сложение блочных матриц. Две матрицы, разбитые на блоки одинаковым образом, можно складывать:

$$\left[\begin{array}{c|c}A&B\\\hline C&D\end{array}\right]+\left[\begin{array}{c|c}E&F\\\hline G&H\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c|c}A+E&B+F\\\hline C+G&D+H\end{array}\right].$$

Умножение блочных матриц. Если размеры блоков допускают операцию умножения, то:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ \hline C & D \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E & F \\ \hline G & H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AE + BG & AF + BH \\ \hline CE + DG & CF + DH \end{bmatrix}.$$

Транспонирование блочных матриц. Пусть матрица

$$M = \left[\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right].$$

Тогда

$$M' = \left[\begin{array}{c|c} A' & C' \\ \hline B' & D' \end{array} \right].$$

Формула Фробениуса (блочное обращение).

$$\left\lceil \begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right\rceil^{-1} = \left\lceil \begin{array}{c|c} A^{-1} + A^{-1}BH^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BH^{-1} \\ \hline -H^{-1}CA^{-1} & H^{-1} \end{array} \right],$$

где A — невырожденная квадратная матрица размерности $n \times n$, D — квадратная матрица размерности $k \times k$, $H = D - CA^{-1}B$.

Домашнее задание: используя метод Гаусса, докажите формулу Фробениуса.

Задание 1. Для блочной матрицы

$$\begin{bmatrix} A & B \\ \hline 0 & D \end{bmatrix}$$

найдите обратную матрицу с помощью метода Гаусса. Проверьте полученный результат с помощью формулы Фробениуса.

Предположения: $\det A_{n\times n} \neq 0$; $\det D_{k\times k} \neq 0$.

Задание 2. Вместо того чтобы оценивать параметры β_1, β_2 в модели

$$y = X_1 \beta_1 + X_2 \beta_2 + \varepsilon$$

Семинары: Погорелова П.В.

($X_1, X_2 - n \times k_1, n \times k_2$ матрицы соответственно, β_1, β_2 — векторы размерности k_1, k_2 соответственно), строятся МНК–оценки этих параметров исходя из модели

$$y = X_1^* \beta_1 + X_2 \beta_2 + \varepsilon^*,$$

где X_1^* — матрица остатков, полученных в результате регрессии каждого столбца матрицы X_1 на X_2 .

- (a) Покажите, что полученная таким образом оценка вектора β_2 совпадает с оценкой, полученной в результате регрессии y только на X_2 .
- (b) Найдите смещение оценки вектора β_2 .

Задание 3.

(а) Рассмотрим модель множественной регрессии:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \varepsilon_i.$$

Что произойдет с МНК—оценками коэффициентов модели, если добавить константу c_1 к каждому наблюдению признака X_2 и другую константу c_2 к каждому наблюдению признака X_3 ?

(b) Что произойдет с МНК-оценками коэффициентов множественной регрессии, если умножить зависимую переменную y на константу c? А если на константу умножить какой-нибудь регрессор?

Задание 4. Проверьте формулу (из лекции)

$$\mathbb{E}(\tilde{y_0} - y_0)^2 = \sigma^2 \left(1 + x_0' (X'X)^{-1} x_0 \right)$$

для среднеквадратической ошибки прогноза.

Здесь $\tilde{y_0}$ — прогнозное значение зависимой переменной для нового наблюдения, y_0 — истинное значение зависимой переменной для нового наблюдения, x_0 — $k \times 1$ векторстолбец объясняющих переменных для нового наблюдения.

Задание 5. Докажите равенство

$$\mathbb{E}(\tilde{y_0} - y_0)^2 = \sigma^2 \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \right)$$

для среднеквадратической ошибки прогноза в случае парной регрессии с константой.

Задача 6. Для модели парной регрессии $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + \varepsilon_i, i = 1,...,10$, известно, что

Семинары: Погорелова П.В.

$$\sum_{i=1}^{10} Y_i = 8, \sum_{i=1}^{10} X_i = 40, \sum_{i=1}^{10} Y_i^2 = 26, \sum_{i=1}^{10} X_i^2 = 200, \sum_{i=1}^{10} Y_i X_i = 20.$$

Для некоторого наблюдения дано $X_0=10$. Предполагая, что данное наблюдение удовлетворяет исходной модели,

- (a) вычислите наилучший линейный несмещенный прогноз величины y_0 ;
- (b) оцените стандартную ошибку прогноза.