

Лекция №6 «Группа автоморфизмов. Норма и след». Курс А-І

Иванова Ксения Юрьевна 619/1

14 октября 2025

В прошлый раз

$F_q = F_p[x]/(f) \quad q = p^n \quad n = \deg f \quad f - \text{непрерыв}$

Теорема 1. $\forall n \quad \exists F_q \quad q = p^n$

Теорема 2. F_q^* – циклическая группа с $\varphi(q-1)$

Расширение полей L/K

Конечное расширение, если $\dim_k L < \infty \quad [L : K] = \dim_k L$

$\alpha \in L$ – алгебр. $\Leftrightarrow \exists f \in K(x) \quad f(\alpha) = 0$

L/K – алгебр. $\Leftrightarrow \forall \alpha \in L$ – алгебр.

Теорема 3. L/K – конечное расширение, то \Rightarrow алгебр.

L/K называется простым, если $\exists \theta \in L \quad L = K(\theta)$

$F_q = F_p[x]/(f)$ – простое построение

$F_q[x] \rightarrow F_p[x]/(f)$

$x \rightarrow \theta : \quad f(\theta) = 0$

$F_q = F_p(\theta)$

Лемма 1. 1) $a \in Z_{>0} \quad a^L - 1 \mid a^m - 1 \Leftrightarrow L \mid m$

2) $x^L - 1 \mid x^m - 1 \Leftrightarrow F_q[x] \Leftrightarrow L \mid m$

□ Упражнение ■

Теорема 4. F_{p^d} – подполе $F_{p^n} \Leftrightarrow d \mid n$

□

$\Rightarrow F$ – подполе $F_{p^n} \quad F_{p^n}/F/F_p, \quad d = [F : F_p]$

$|F| = p^d \quad |F^*| = p^d - 1$

$\forall x \in F^* \quad x^{p^d-1} - 1 = 0$

$\forall x \in F_{p^n}^* \quad x^{p^n-1} - 1 = 0$

$F^* \subset F_{p^n}^* \Rightarrow x^{p^d-1} - 1 \mid x^{p^n-1} - 1 \Rightarrow (\text{лемма}) \quad d \mid n$

\Leftarrow Пусть $d \mid n$

$F = \{\alpha \in F_{p^n} : \alpha^{p^d} = \alpha\}$

$\forall \alpha, \beta \quad (\alpha + \beta)^{p^d} = \alpha^{p^d} + \beta^{p^d}$

F – поле

$d \mid n \Leftrightarrow \text{лемма} \quad x^{p^d} - x \mid x^{p^n} - x \quad (x^{p^d} - x \text{ имеет } p \text{ различных корней}) \Rightarrow |F| = p^d \text{ элементов}$

$F = F_{p^d}$ – подполе F_{p^n} ■

Следствие. F_{q^d} – подполе $F_{q^n} \Leftrightarrow d|n$

$$\square \quad q = p^t \quad F_{p^{nt}}/F_{p^{dt}} \Leftrightarrow dt|nt \Leftrightarrow d|n \quad \blacksquare$$

Определение 1. $\sigma : K \rightarrow K$ – автоморфизм, если сохраняется структура поля.

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta)$$

$$\sigma(\alpha\beta) = \sigma(\alpha)\sigma(\beta)$$

Определение 2. L/K Рассмотрим автоморфизмы $\sigma : L \rightarrow L$

$$\sigma(a) = a \quad \forall a \in K$$

$$Gal(L/K) = \{\sigma : L \rightarrow L \mid \sigma(a) = a, \quad a \in K\}$$

$$F_q/F_p, \quad F_q = F_p(\theta)$$

Определение 3. Сопост $\sigma : \theta \rightarrow \theta^p$ индуцир отобра $\sigma : F_q \rightarrow F_q$

$$\alpha = a_1\theta^{n-1} + \dots + a_0 \rightarrow a_1((\theta)^p)^{n-1} + \dots \quad a \in F_p \quad \sigma(a) = a^p = a$$

$\Rightarrow \sigma \in Gal(F_q/F_p)$ называется афтормофизм Фробениуса

Теорема 5. $Gal(F_q/F_p) = \langle \sigma \rangle$ – циклическая с порождающим элементом σ

$$|Gal(F_q/F_p)| = n = [F_q : F_p]$$

$$\square \quad \text{Рассмотрим } \sigma^i \quad \sigma(\alpha) = \alpha^p$$

$$\sigma^i(\alpha) = \alpha^{p^i} \quad 0 \leq i \leq n-1$$

$$\sigma^i \in Gal(F_q/F_p) = G$$

$$\sigma^i \neq \sigma^k$$

$$F_q = F_p[x]/(f) = F_p[\theta]$$

$$f(\theta) = 0, \quad f = x^n + a_1x^{n-1} + \dots$$

$$f(\theta^p) = (\theta^p)^n + a_1(\theta^p)^{n-1} + \dots = (\theta^n + a_1\theta^{n-1} + \dots)^p = f(\theta)^p = 0 \quad \theta^p - \text{корень } f$$

$$\theta, \theta^p, \theta^{p^2}, \dots, \theta^{p^{n-1}} - \text{корень } f$$

$$F_q^* = \langle \eta \rangle \quad \eta - \text{порождающий } q-1$$

$$\eta = b_1\theta^{n-1} + \dots$$

$$\text{если } 0 \leq j \leq k \leq n-1 \quad \theta^{p^j} = \theta^{p^k}$$

$$\eta^{p^j} = \eta^{p^k} \Rightarrow \eta^{p^k - p^j} = 1$$

$$p^k - p^j < q-1 \quad (\text{получаем противоречие с } q)$$

$$\text{Значит } f(x) = \prod_{j=0}^{n-1} (x - \theta^{p^j})$$

$$\varphi \in Gal(F_q/F_p)$$

$$0 = \varphi(f(\theta)) = f(\varphi(\theta)) \Rightarrow \varphi(\theta) - \text{корень } f$$

$$\varphi(\theta) = \theta^{p^j} \quad \blacksquare$$

Пусть $G_n = Gal(F_{p^n}/F_p)$

$$[F_{p^n} : F_p] = n = |G_n|$$

F_{p^d} – подполе $F_{p^n} \Leftrightarrow d|n \Leftrightarrow$ существует цикл подгруппа порядка d в G_n

Общий случай : $L/K, \quad G = Gal(L/K)$

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{подполя } F \\ L/F/K \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{подгруппы} \\ H < G \end{array} \right\}$$

$$F \rightarrow Gal(F/K)$$

$$L^H \leftarrow H \quad (\text{для } L : \{\alpha \in L : \quad \forall \sigma \in H \quad \sigma\alpha = \alpha\})$$

Определение 4. Конечное расширение L/K называется расширением Галуа,

если $|Gal(L/K)| = [L:K]$

Лемма 2. $|Gal(L/K)| \leq [L : K]$

Норма и след

L/K - конечное расширение

$[L:K]=n$

$\forall \alpha \in L \quad \zeta \rightarrow \alpha \zeta$

$\{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ - базис L/K

$A_\alpha = (a_{ij})$ - матрица $\zeta \rightarrow \alpha \zeta$

$\alpha w_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} w_j \quad a_{ij} \in K$

$g_\alpha(x) = \det(xE_n - A) \in K[x]$

Лемма 3. $\alpha \in L, f_\alpha \in K[x]$ - линейный многочлен α , g_α - характеристический многочлен. Тогда $g_\alpha = f_\alpha^s$

□ $L/K(\alpha)/K$

$n = [L : K] = [L : K(\alpha)][K(\alpha) : K] \quad ([L : K(\alpha)] = s, \quad [K(\alpha) : K] = m)$

Упражнение ■

Лемма 4. g_α не зависит от выбора базиса!

□ ... ■

Определение 5. $N_{L/K}(\alpha) = \det A_\alpha$

$Tr_{L/K}(\alpha) = tr A_\alpha$

Лемма 5. 1) $a \in K \quad N_{L/K}(a) = a^n \quad Tr_{L/K}(a) = na$

2) $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta) \quad Tr(\alpha + \beta) = Tr\alpha + Tr\beta$

Лемма 6. $M/L/K$

$N_{M/K} = N_{M/L} * N_{L/K}$

$Tr_{M/K} = Tr_{M/L} * Tr_{L/K}$

Определение 6. L/K - конечное расширение называется сепарабельным $\Leftrightarrow Tr_{L/K} \not\equiv 0$

Пример. $char h = p$

$Tr_{L/K}(1) = n \neq 0, \quad p \nmid n$

Определение 7. L/K называется нормальным, если $\forall \alpha \in L$
 $f_\alpha(x)$ полностью раскладывается на линейные множители (L)

Теорема 6. L/K - нормально, сепарабельно $\Leftrightarrow |Gal(L/K)| = [L : K]$

Лемма 7. F_q/F_p

1) $N(\alpha) = \prod_{j=0}^{n-1} \sigma^j(\alpha) = \prod_{j=0}^{n-1} \alpha^{p^j}$

$Tr(\alpha) = \sum_{j=0}^{n-1} \sigma^j(\alpha) = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha^{p^j}$

2) $N : F_q^* \rightarrow F_p^*, \quad Tr : F_q \rightarrow F_p$ отображение на

□ 2) $Tr \quad x + x^p + \dots + x^{p^{n-1}} \leq p^{n-1}$ корней, $a \quad |F_q^*| = p^n - 1$ ■