

Листок 4

Тема 4 (1.4). Квадратичные вычеты

Упражнения и задачи

1. Докажите, что существует бесконечно много простых $p \equiv 1 \pmod{4}$ и $p \equiv 3 \pmod{4}$.
2. Пусть $p > 2$ — простое (здесь и далее). Докажите, что $\left\lceil \frac{p-1}{4} \right\rceil$ четно $\Leftrightarrow p = 8k \pm 1$.
3. Докажите свойства символа Якоби:
 - $a \equiv b \pmod{P} \Rightarrow \left(\frac{a}{P}\right) = \left(\frac{b}{P}\right)$;
 - $\left(\frac{ab}{P}\right) = \left(\frac{a}{P}\right) \left(\frac{b}{P}\right)$;
 - $\left(\frac{a}{PQ}\right) = \left(\frac{a}{P}\right) \left(\frac{a}{Q}\right)$.
4. Пусть $(a, p) = 1$. Докажите, что число решений сравнения $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ равно $1 + \left(\frac{b^2 - 4ac}{p}\right)$.
5. Докажите, что если $(a, p) = 1$ то $\sum_{x \bmod p} \left(\frac{ax+b}{p}\right) = 0$.
6. Используя замену переменных, докажите, что число решений сравнения $x^2 - y^2 \equiv a \pmod{p}$ равно $p - 1$, если $(a, p) = 1$, и $2p - 1$, если $p|a$. Выразите число решений этого сравнения через сумму с символом Лежандра. Используя эти выражения, найдите значение для суммы $\sum_{y \bmod p} \left(\frac{y^2+a}{p}\right)$.
7. Докажите, что если $(a, p) = 1$ то $\sum_{x \bmod p} \left(\frac{x(x+a)}{p}\right) = -1$.
8. Пусть $r_1, \dots, r_{(p-1)/2}$ — квадратичные вычеты в промежутке $[1; p]$. Докажите, что их произведение $\equiv 1 \pmod{p}$, если $p \equiv 3 \pmod{4}$, и $\equiv -1 \pmod{p}$, если $p \equiv 1 \pmod{4}$.
9. Пусть $p \equiv 1 \pmod{4}$ — простое, $(a, p) = 1$, $S(a) = \sum_{x \bmod p} \left(\frac{x(x^2+a)}{p}\right)$. Докажите, что
 - $S(a) \equiv 0 \pmod{2}$;
 - для $(t, p) = 1$ $S(at^2) = \left(\frac{t}{p}\right) S(a)$;
 - если r, n — такие, что $\left(\frac{r}{p}\right) = 1$, $\left(\frac{n}{p}\right) = -1$, то $p = \left(\frac{1}{2}S(r)\right)^2 + \left(\frac{1}{2}S(n)\right)^2$.
10. Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Будем говорить, что простое p делит $f(x)$, если $\exists n \in \mathbb{Z}$ такое, что $p|f(n)$. Опишите простые делители многочленов $x^2 + 1$ и $x^2 - 2$. Докажите, что если p делит $x^4 - x^2 + 1$, то $p \equiv 1 \pmod{12}$.
11. Пусть $D > 1$ — нечетное и свободное от квадратов. Докажите, что $\exists b \in \mathbb{Z}$, $(b, D) = 1$ такое, что $\left(\frac{b}{D}\right) = -1$. Докажите также, что $\sum' \left(\frac{a}{D}\right) = 0$, где суммирование берется по приведенной системе вычетов $\bmod D$.
12. Пусть α — иррациональное число. Докажите, что последовательность $(\{n\alpha\})_{n=1}^{\infty}$ равномерно распределена $\bmod 1$ (используя критерий (Вейля) из лекции).

Темы для самостоятельного изучения

- Когда простое q является квадратичным вычетом по модулю простого p ? (Приложение квадратичного закона взаимности, [IR, §5.2, теорема 2]).

- Существует бесконечно много простых таких, что $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$, где a — целое, отличное от квадрата. ([ИР, §5.2, теорема 3]).
- Критерий разрешимости сравнения $x^2 \equiv a \pmod{m}$ для произвольного m . ([ИР, §5.1, предложение 5.1.1], [Вин, §V.4]).