





$$\begin{cases} \dfrac{d\psi_r^u}{dt} = -\omega\left[\psi^m \sin(\vartheta) - 5h_5\psi^m \sin(-5\vartheta)\right] \\ \dfrac{d\psi_r^v}{dt} = -\omega\left[\psi^m \sin\left(\vartheta - \dfrac{2\pi}{3}\right) - 5h_5\psi^m \sin\left(-5\vartheta - \dfrac{2\pi}{3}\right)\right] \\ \dfrac{d\psi_r^w}{dt} = -\omega\left[\psi^m \sin\left(\vartheta + \dfrac{2\pi}{3}\right) - 5h_5\psi^m \sin\left(-5\vartheta + \dfrac{2\pi}{3}\right)\right] \end{cases}$$

$$L_s(\vartheta) = \begin{bmatrix} l_\mu + l_a - l_b\cos(2\vartheta) & -\frac{1}{2}l_a - l_b\cos\left(2\left(\vartheta - \frac{\pi}{3}\right)\right) & -\frac{1}{2}l_a - l_b\cos\left(2\left(\vartheta + \frac{\pi}{3}\right)\right) \\ -\frac{1}{2}l_a - l_b\cos\left(2\left(\vartheta - \frac{\pi}{3}\right)\right) & l_\mu + l_a - l_b\cos\left(2\left(\vartheta - \frac{2\pi}{3}\right)\right) & -\frac{1}{2}l_a - l_b\cos(2(\vartheta + \pi)) \\ -\frac{1}{2}l_a - l_b\cos\left(2\left(\vartheta + \frac{\pi}{3}\right)\right) & -\frac{1}{2}l_a - l_b\cos(2(\vartheta + \pi)) & l_\mu + l_a - l_b\cos\left(2\left(\vartheta + \frac{2\pi}{3}\right)\right) \end{bmatrix}$$