DOI:10.19335/j.cnki.2096-1219.2020.9.036

器具辅助口部运动训练对孤独症儿童言语康复的疗效

周蕊，刘春

（菏泽医学专科学校，山东　菏泽　274000）

摘　要：目的　研究器具辅助口部运动训练对孤独症儿童言语康复的疗效及可行性。**方法**　选择本院 2018 年 1 月至 2018 年 12 月收治的孤独症语言障碍患儿 90 例为研究对象，观察组采用常规训练的基础上增加器具辅助口部运动对患儿进行语言功能康复训练，对照组采用常规训练，利用 SPSS 19.0 统计分析。**结果**　两组研究对象训练前情况基本一致；训练结束后，观察组在治疗效果、语言改善及图片表达等方面比对照组要好，具有差异统计学意义（P<0.05）；证实器具辅助口部运动对患儿语言功能康复训练效果良好。**结论**　辅助口部运动训练对孤独症语言交康复有良好的治疗效果，此方法具有较好的医学及临床推广价值。

关键词：器具辅助；口部运动；孤独症儿童；言语康复；疗效

本文引用格式：周蕊 , 刘春 . 器具辅助口部运动训练对孤独症儿童言语康复的疗效 [J]. 智慧健康 ,2020,6(9):73-74.

Curative Effect of Appliance-assisted Oral Exercise Training on Speech Rehabilitation of Autism Children

ZHOU Rui, LIU Chun

(Heze Medical College, Heze Shandong 274000)

ABSTRACT：Objective　to study effect and feasibility of appliance-assisted oral exercise training for speech rehabilitation on autism children. Methods　choose 90 cases autism children with language disorders treated in our hospital from January 2018 to December 2018 as research objects. Observation group was treated with increasing appliance-assisted oral exercise for language function rehabilitation based on routine training, control group with routine training and statistical analysis with SPSS19.0. Results　Pre-training conditions of two groups were basically the same. After training, treatment effect, language improvement and picture expression of observation group was better than control group, with statistical significance (*P*<0.05), which showed, exercise has good effect on language function rehabilitation training of children. Conclusion　assisted oral exercise training has good therapeutic effect on rehabilitation of autistic speech communication, with good medical and clinical value.

KEY WORDS：Instrumental assistance; Mouth movement; Autistic children; Speech rehabilitation; Curative effect

0　引言

目前，儿童孤独症作为一种先天性疾病，约占总出生婴儿数的 0.4%，具体发病病因还不太确定，可能与先天性因素、免疫反应及环境等有关 [1]。研究显示：孤独症儿童患者中，约有一半的人将会面临终身保持沉默、不能利用语言交流、语言理解及表达能力低下等问题，且随着年龄的增大其症状可能加重 [2]。因此，对儿童孤独症言语的治疗成了国内外医学研究机构研究的热点之一。本课题组希望通过此课题的分析与研究为相关患者提供新的治疗手段，并进行了临床实验，选取本院 2018 年 1 月至 2018 年 12 月收治的孤独症语言障碍患儿 90 例为研究对象，下面就临床对照效果进行论述。

1　对象与方法

1.1　研究对象

本课题研究在征得患者及其家属同意的前提下，通过选取所在医院 2018 年 1 月至 2018 年 12 月治疗的 90 名进行语言康复治疗的孤独症儿童患者作为研究对象，将 90 名研究对象随机均分成两组：观察组、对照组；本实验研究过程中将方案进行了充分的准备，设计的方案科学、合理，得到伦理委员会批准。

（1）研究对象 [3]。按照疾病判断的基本特征及要求，患者要满足孤独症 DSM-IV 中基本条件；患者的耳朵功能及眼睛功能均是正常的；按照口语评判规则显示迟缓的，难以通过语言沟通者；年龄范围处于 2-10 岁；对本研究患者家属知情并同意者。

（2）研究对象情况。观察组男 35 例，女 10 例，年龄 2-7 岁，平均（3.89±1.06）岁。对照组男 36 例，女 9 例，年龄 2-7 岁，平均（3.94±1.01）岁。通过分析及检验，两组研究对象在性别、年龄等要素上，均无统计学意义（P>0.05）。

1.2　研究方法和实施步骤

作者简介：周蕊（1993-），女，汉族，山东济宁，本科，助教，研究方向：康复治疗学；刘春（1993-），女，汉族，山东菏泽，本科，助教，研究方向：康复治疗学。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.2.1 研究方法

（1）对照组：在进行研究对象发音治疗过程中，只进行常规的训练及锻炼，通过采用灯光、色彩鲜艳等刺激性物体对患儿的视觉神经反复刺激；通过悠扬的音乐、鼓声等刺激性声音对患儿的听觉神经进行刺激，激发患儿寻找声源的兴趣；言语康复师锻炼患儿学习发音，并不断进行发音锻炼；进行半年的治疗，每周 5-7 次训练，每次时长 40min-50min[4]。

（2）观察组：在上述对照组包括视觉、注意力、感知、听觉及语言的学习及表达训练等认知训练的基础上，利用口部运动训练器 AM5300288，通过言语康复训练人员按照使用、训练说明书对患儿进行口部运动锻炼，同时结合孤独症患儿在指令配合、语言动作等有困难的，在临床治疗中要通过利用刺激口部、发音等语言关键部位来训练，在医护人员的指导下让患儿进行口腔下颌的升降、伸缩、前后等方向的口部动作练习，更好的对患儿唇部、舌部分别进行刺激，引导患儿做出发音动作训练[3]。进行半年的治疗，每周 5 次专业的训练，每次时长 30-40 min。

1.2.2 评定方法

（1）研究对象干预措施后康复情况比较：通过半年训练后利用 S-S 评分、对全部患儿的沟通、观察、评估治疗的效果，较佳：S-S 评分证实患儿语言功能最少提高一个等级，患儿能够自主进行言语表达；良好情况：S-S 评分证实患儿语言取得一定的成效，在一定条件下可以进行一定程度的语言表达；无效情况：患儿语言功能没有改善或变差；患者治疗的有效率是患者治疗效果较佳与治疗效果良好患者总和与参加治疗的总患者数量的百分比。

（2）在对参加语言功能治疗的两组患者训练前后的效果进行对比：结合 S-S 评分表、言语评估等标准表来评估，全部测试题数是二十、每题五分，全部加起来是一百分，并将该评定表进行预实验，显示其可信度、效度均 >0.8，统计结果中患儿语言、图片表达功能越好其分数就会越高，通过对患儿治疗干预前后的语言功能情况进行对比分析[5]。

1.3 统计学分析

利用 SPSS 19.0 对两组结果对比，采用 t 检验模式，结果按照均数 ± 标准差也就是（$\bar{x}\pm s$）方式表达，结果证实数据具有统计学意义 $P<0.05$[4]。

2 实验结果与分析

两组患者情况的观察与调查。两组临床效果对比及比例，见表 1。

表 1 两组临床效果统计 [n（%）]

组别	例数	效果较佳	效果良好	效果无效
观察组	45	22（48.89）	20（44.44）	3（6.67）
对照组	45	14（31.11）	15（33.33）	16（35.56）

两组研究对象在治疗前、后，他们的语言表达及图片表达得分情况，见表 2。

2.2 结果分析

通过表 1 可知，观察组组研究对象在训练后语言表达能力治疗效果比对照组要好很多。观察组：效果较佳有 22 位，占 48.89%；效果良好有 20 位，占 44.44%；效果无效有 3 位，占 6.67%。对照组：效果较佳有 14 位，占 31.11%；效果良好有 15 位，占 33.33%；效果无效有 16 位，占 35.56%

表 2 临床得分情况统计

组别	例数	语言表达		图片表达	
		干预前	干预后	干预前	干预后
观察组	45	27.83 ± 2.54	61.36 ± 5.12	30.12 ± 2.67	52.82 ± 4.63
对照组	45	27.81 ± 2.83	39.78 ± 4.26	30.36 ± 2.58	40.16 ± 3.89
t	–	0.095	20.614	0.817	13.92
P	–	0.821	0.000	0.936	0.000

通过表 2 可知，两组研究对象在治疗前，统计数据没有明显差异（$P>0.05$）。观察组：干预前语言表达（27.83±2.54）；干预前图片表达（30.12±2.67）；干预后语言表达（61.36±5.12）；干预后图片表达（52.82±4.63）。对照组：干预前语言表达（27.81±2.83）；干预前图片表达（30.36±2.58）；干预后语言表达（39.78±4.26）；干预后图片表达（40.16±3.89）。两组研究对象在干预后，观察组的分数远远好于对照组，有差异统计学意义（$P<0.05$）[6]。

3 讨论

孤独症儿童存在言语障碍的主要原因之一就是口部运动功能障碍，口部器官不能灵活使用，阻碍了言语的表达及社会交流，给患者及其家属造成较大的痛苦。目前，常规的针对性训练、药物、心理治疗等手段对患儿的治疗效果一般。因此，是研究的热点课题。

本课题主要进行孤独症儿童语言改善的方法进行研究，临床数据表明，器具辅助口部运动训练对孤独症儿童有较好的治疗效果。课题组通过此方法对患儿的语言影响，通过对两组患儿对照治疗证实：观察组在治疗效果、语言改善及图片表达功能等方面均高于对照组，表明此方法对孤独症患儿的语言治疗有明显的效果。

参考文献

[1] 张艳军 . 口部肌肉训练和感知训练治疗孤独症儿童语言交流障碍的疗效观察 [J]. 齐齐哈尔医学院学报 ,2016(12):4541-4542.
[2] 张瑞先 , 张海涛 , 刘壮凤 , 等 . 口部肌肉运动治疗自闭症儿童摄食障碍疗效观察 [J]. 中国妇幼健康研究 ,2016(7):521.
[3] 娄新华 , 黄强 , 陈春生 , 等 . 循证护理对儿童口腔正畸治疗依从性及口腔健康的干预效果 [J]. 智慧健康 ,2018(8):81-83.
[4] 王花敏 , 张素娟 , 陈红敏 . 器具辅助口部运动训练联合语言认知训练治疗孤独症语言交流障碍患儿效果及对语言、图片表达功能的影响 [J]. 中国医学工程 ,2019(2):85-87.
[5] 黄培红 . 感觉统合训练对自闭症儿童行为改善的作用 [J]. 中国卫生工程学 ,2018(6):434-435.
[6] 陈玉美 , 陈卓铭 , 严嘉健 , 等 . 器具辅助口部运动训练对孤独症儿童言语康复的疗效 [J]. 广东医学 ,2017(2):574-576+580.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net