了心脏康复的应用。本研究结果为今后我国心脏康复的定向推广提供了直接有力的数据支持。

【关键词】心脏康复；认知态度；问卷调查

护理在心肺运动试验及量化运动处方中的价值

陈苗苗

中国人民解放军海军特色医学中心

【摘要】目的 本研究观察护理干预对心肺运动试验及量化运动处方的影响，研究护理干预对减少动态心电图波形及呼吸参数和血压干扰因素，获得有效数据的价值，同时通过规范护理，确保志愿者安全，保证试验安全有效进行。**方法** 招募 240 名志愿者，对 240 名志愿者行心肺运动试验及量化运动处方的前、中、后进行护理干预，并对护理干预下，得到相关数据的有效率进行分析总结。**结果** 试验发现，在心肺运动试验及量化运动处方的过程中，通过对志愿者进行有效的护理干预，取得数据的有效率大幅度上升。**结论** 数据分析充分说明，心肺运动试验及量化运动处方过程中，护理干预的作用不容小觑。通过提高护理质量，有效

的减少了测试过程中的干扰因素，提高了心肺运动试验及量化运动处方的准确率。

【关键词】心肺运动试验；运动处方；心电图；呼吸参数；血压；护理质量；心脏康复

小组模式在卒中后运动性失语患者言语康复护理中的应用观察

陈晓娥

上海市普陀区中心医院

【摘要】目的 探讨小组模式在卒中后运动性失语患者言语康复护理中的应用效果。**方法** 选择 2020 年 4 月-2021 年 3 月收治于本院神经内科及全科病房的脑卒中伴运动性失语患者 60 例。随机分为常规组和观察组，各 30 例。常规组接受常规的言语康复治疗与护理，观察组患者辅以小组模式进行语言康复训练。应用西方失语成套测验（WAB）和日常生活交流能力量表（CADL）评估比较两组患者在治疗前及治疗后 30 天的言语功能恢复情况。**结果** 观察组患者的 WAB 及 CADL 评分较常规组有明显提高（P＜0.05）。**结论** 小组模式结合言语康复训练能明显促进患者的言语功能恢复，提高实用性语言交流能力，改善患者生活质量。

中国知网 https://www.cnki.net

【关键词】脑卒中；运动性失语；言语康复；小组模式

帕金森病患者锻炼依从性及其与日常生活活动能力的相关性研究

陈艳

上海交通大学医学院附属瑞金医院

【摘要】**目的** 调查帕金森病患者的锻炼依从性现状并分析其与日常生活活动能力的关系。**方法** 选取 2021 年 4 月～2021 年 5 月于上海市某三级甲等综合性医院门诊就诊或住院的帕金森病患者 96 人作为研究对象。应用帕金森病患者功能锻炼依从性量表、统一帕金森病评定量表中的日常生活活动评定量表（UPDRS-Ⅱ）及人口统计学量表进行调查 。**结果** 帕金森病患者锻炼依从性总分为（41.47±11.43）分，总依从性处于中等偏上水平。高依从水平的患者仅占 28.13%。患者的日常生活活动能力得分为（12.34±7.38）分。单因素分析结果显示，患者对疾病的态度不同，其锻炼依从性有统计学差异（F值=5.485，P=0.002）。患者锻炼依从性及其各维度与日常生活活动能力间均为负相关关系（P<0.01）。**结论** 帕金森病患者的锻炼依从性亟待提高，应开展融合健康教育的康复锻炼护理模式，改善患者对疾病的消极态度，重点关注日常生活活动能力较差的患者，提高其锻炼依从性，改善运动功能。

【关键词】帕金森病；锻炼依从性；日常生活活动

非小细胞肺癌术后患者睡眠质量及影响因素分析

谌欣欣，李玉梅*

同济大学医学院；同济大学附属上海市肺科医院

【摘要】**目的** 对非小细胞肺癌手术后一个月的患者进行睡眠质量状况调查并对其影响因素进行分析。**方法** 便利抽样法选取上海市某三甲医院行胸腔镜手术后一个月的门诊复查患者为研究对象，采用匹兹堡睡眠质量指数量表及自制的肺癌患者一般资料调查表进行问卷调查。**结果** 行胸腔镜术后的非小细胞肺癌患者睡眠质量得分为(9.02±4.63)分，睡眠障碍发生率为 56.8%，咳嗽和夜间易醒是导致患者睡眠障碍的主要症状和原因。Logistic 回归分析表明性别(OR=2.786, P<0.05)、肺段切除术(OR=0.305, P<0.05)、拔管时间(OR=4.855, P<0.05)、疼痛(OR=4.731, P<0.05)是影响非小细胞肺癌患者睡眠质量的重要因素。**结论** 非小细胞肺癌患者术后一个月康复期总体睡眠质量不佳，受生理、心理和手术创伤等多因素的

中国知网 https://www.cnki.net