护理人员对护患沟通障碍、方法及技巧认知的掌握

王志芳
（复旦大学附属中山医院青浦分院门诊 上海 201799）

【摘要】目的：探析护理人员对护患沟通障碍、方法及技巧知认知的掌握。方法：选取2016年1月—2017年1月我院接收的120例患者为本次研究资料，依照数字单双号的形式将其分两组，每组60例。对照组采用传统常规方法护理，在传统常规护理的基础上，试验组在实施护理干预的同时加强护患沟通技巧和方法，对比分析对照组和试验组护患纠纷发生率与护理满意度情况。结果：74.55%与90.91%分别为对照组与试验组患者的护理满意度，二者相比，试验组明显优于对照组（P＜0.05）；对照组患者的护患纠纷发生率明显高于试验组，二者数据间比较具有统计学意义（P＜0.05）。结论：和患者交流时医护人员只有掌握正确的沟通技巧与方法才能更好地减少护患纠纷事件的发生，同时更好满足患者的多项需求，使护理满意度提升。

【关键词】沟通技巧；沟通障碍；护理人员
【中图分类号】R471 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3807（2017）02-0252-02

护患沟通是指患者和医护人员间相互作用与信息交流的过程。做到和患者沟通保持良好，既能提高医护人员的护理服务质量，也能减少护理事故事件的发生[1]。另外，在沟通过程中，技巧和方法的掌握也是非常重要的，对于患者的需求，医护人员要做到尽量满足，这样既能使患者的临床护理配合度提高，而且还能减少患者的投诉率，加快患者恢复。为进一步探究护理人员对护患沟沟通障碍、方法及技巧知认知的掌握情况，现做出如下内容。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2016年1月—2017年1月我院收治的120例住院患者为本次研究资料，依照数字单双号的形式对其分组。对照组60例，女23例，男37例；年龄区间22～78岁，平均年龄（46.5±2.6）岁。试验组60例，女22例，男38例；年龄区间21～79岁，平均年龄（47.3±2.5）岁。根据上述所述，将两组患者的临床资料情况比较（P＞0.05），组间数据资料情况可对比。

1.2 纳入标准与排除标准[2]

（1）纳入标准：所选患者具备一定的认知能力；无严重原发性病症患者；所有患者均已自愿签署知情同意书。

（2）排除标准：伴有严重精神病症患者；伴有糖尿病症及高血压病症患者；伴有言语能力障碍患者。

1.3 方法

对照组采用传统常规护理，医护人员需要对严密监视患者的病症变化情况，并监测患者生命体征情况，如果出现异常现，需立即实施合理的解决方案。在传统常规护理的基础上，试验组在实施护理干预的同时加强护患沟通技巧和方法，具体护理方案如下：（1）言语沟通技巧：言语沟通在护理工作中表示护患沟通所实施的方法，能够用言语传达所想表达的意思。和患者交流时，医护人员只有做到在言语沟通技巧方面加以注重，才能使患者和一会入院的关系保持在良好状态，拉近与患者间的距离。此外，和患者交流期间，医护人员要避免使用学术语言，尽量用简单易懂的言语和患者交流，通过言语鼓励和眼神安抚等方式增强患者的自信心。（2）非言语沟通技巧表示一种沟通动作行为，对患者行护理期间，医护人员可通过眼神、手势等动作和患者交流，不仅能让患者感受自己被尊重，同时还能缓解其负性情绪，让患者感受到医护人员的和蔼及亲切。举例：（1）像按摩、握手等触摸。保持触摸的合理性，既能使护患间关系更为亲密，使患者的护理依从性得到提升，同时还能使护理服务质量有所提高。（2）眼神。正所谓眼神是心灵的窗户，眼神能表达出多种情感，如：喜欢、厌恶及愤怒等，医护人员在实施护理时，可通过加强和患者眼神交流，有助于患者感受到亲切感。（3）微笑。对患者予以护理干预时，尽量保持微笑动作不但能使患者的负性情绪得到改善，同时还能推进和患者间的距离。（4）姿态端正。面对患者时医护人员要保持一个良好的姿态，时刻做到工作态度严谨，不能漫不经心和过于随便，只有这样才能让患者感受到医护人员负责和认真的工作态度。

1.4 评价标准[3]

本院实施自制护理质量评价表，护理评价内容具体如下：服务及时性和护理质量、服务态度和护理安全及管理规范性等五项，每项20分，共计一百分。非常满意评分区间在80至100内，一般评分区间在60至79内，不满意评分区间在＜60分内。

对比分析试验组与对照组护患纠纷发生率情况。

1.5 统计学方法

本研究对于统计学的分析可实施SPSS 12.0软件进行，以卡方检验的形式对比计数数据的比较，以 t 检验的形式对比计量数据的比较。当 P＜0.05为检验结果时则表示数据间对比差异性具有统计学意义。

2 结果

2.1 分析对比试验组和对照组患者的护理满意度

90.91%和74.55%分别为试验组和对照组患者的护理满意度，两组比较，对照组明显比试验组患者低，二者数据间对比具有差异性（P＜0.05）。具体数据对比见表。

2.2 分析试验组与对照组护患纠纷发生率情况对比

在对照组55例患者中，有10例出现护患纠纷事件，占其比例18.18%；在试验组55例患者中，在2例出现护患纠纷事件，占其比例3.64%。两组对比，对照组明显比试验组患者低，二者数据间对比具有差异性（P＜0.05）。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

新疆地区甲状腺彩超检查结果及其影响因素分析

巴妍·谢开，帕丽达，张 雨，娜迪热·铁列吾汗（通讯作者）
（新疆医科大学第一附属医院健康管理中心体检部 新疆 乌鲁木齐 830054）

【摘要】目的：为了对健康人群进行甲状腺疾病的预防，了解甲状腺疾病在健康体检的人群中的出检率。方法：从我院体检中心获得2015年1月—2015年6月之间进行体检同时进行甲状腺彩超检查的患者共4849例研究对象。其中有4种不同职业和性别、年龄、职业来研究患有甲状腺疾病的出检率，最后进行分析得出可能引起甲状腺结节疾病的影响因素。结果：4849例受检者中，检出甲状腺结节1815例，总检出率37.43%。女性检出率明显高于男性（40.22% VS 34.12%），差异有统计学意义（$P<0.05$）；各年龄组检出率有明显差异，差异有统计学意义（$P<0.05$）；不同职业的男性检出率比较也有显著性差异（$P<0.05$）。结论：进行健康体检的人群中患有甲状腺结节出检率偏高，得出患病几率与性别，年龄有密切关系，同时也与职业有一定的关联，最后笔者建议在健康体检中增加甲状腺彩超检查项目。

【关键词】甲状腺结节；健康体检；彩色B超
【中图分类号】R445.1 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3807（2017）02-0253-02

一般来说甲状腺结节与正常的甲状腺组织完全不同的两个个体，也包括偶然发现的[1]可触及与不可触及的TN—超声等影像学检查发现的结节。其中甲状腺癌的患病率占甲状腺疾病的5%～10%[2-4]，目前来说超声对甲状腺结节的敏感性远高于其他技术（74%～81%）。

由此可见对于甲状腺疾病需要早发现早治疗，规范化防治工作有重要意义。本文则是抽取4849例在我院进行健康检查的患者进行从不同性别，不同职业对患有甲状腺疾病的患者进行分析，其结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

从我院体检中心获得2015年1月—2015年6月之间进行体检同时进行甲状腺彩超检查的患者。研究对象共计4849例，男2216例，女2633例，年龄17～85岁。其中医务人员1163例，男584例，女579例，年龄18～83岁；教师1081例，男456例，女625例，年龄19～85岁；公务员893例，男492例，女401例，年龄22～76岁；企业职工1712例，男684例，女10287例，年龄17～78岁。排除既往甲状腺病史和甲状腺手术史。

1.2 检查方式

检查甲状腺的方法是采用的是彩色多普勒超声诊断仪。被检者需要充分暴露颈部，需采取仰卧位。之后用高频探头对甲状腺区域进行多方面的检查。

1.3 统计学方法

需要用STSS 17.0统计软件进行分析，之后需要用x^2检验构成比的比较，当P小于0.05时的差异有统计学

表 分析对比试验组和对照组患者的护理满意度[n（%）]

组别	非常满意	一般	不满意	护理满意度
对照组（n=55）	22(40.00)	19（34.55）	14（25.45）	41（74.55）
试验组（n=55）	30(54.55)	20（36.36）	5（9.09）	50（90.91）
x^2	5.153			
P	0.023			

3 讨论

就医疗机构而言，今后未来的发展不单单需要在治疗水平方面予以加强，同时还要在护理和管理层面进行提高。伴随近几年人们对护理意识的不断加强，为使医护人员与患者间的关系更近，降低不必要纠纷事故的发生，医护人员需要在护理沟通技巧方面进行提高，这样既能减少纠纷事故的发生率，同时还能使患者的护理依从性提高。从本研究结果中可得到如下结论，对照组的纠纷事件发生率显著比试验组患者高，而护理满意度则显著比试验组患者高（$P<0.05$），表示医护人员护理沟通技巧的掌握在行临床护理过程中能起到重要作用。有研究报道显示，护患沟通障碍易引发护患纠纷事件的发生[4-5]。所以，在和患者交流过程中，医护人员只有确保护患沟通意识良好，才能有效减少纠纷事件的发生。为能确保护患沟通有较高品质，良好的护理文化素养是非常重要的，因为全面的知识与良好的技术能够对沟通效果纽带予以全面维持，这样既能使患者的临床护理依从性有所提升，同时还能使患者的护理满意度提高，避免医疗纠纷事件的发生。另外，医院管理人员需要提高对医护人员沟通技巧的培训，尽量让医护人员多和患者交流、沟通，从实践中摸索和患者沟通的技巧，只有这样才能减少投诉事件及防止医疗事故的发生，同时还能提高医护人员的护理服务质量。

总之言之，护患沟通技巧的掌握不仅能使护患纠纷事件的发生率有效降低，还能在最大程度满足患者的各方面需求，使护理满意度提升，值得应用推广。

【参考文献】

[1] 朱立新 . 护患沟通在门诊输液室护理干预中的重要性探讨 [J]. 中国现代药物应用，2014，08(21):242-243.
[2] 闫艳芳 . 在门诊输液护理中使用护患沟通技巧的效果观察 [J]. 当代医药论丛，2014，12(09):63-63.
[3] 高丽春，关其英 . 浅谈护理工作中护患沟通的作用、原则、方法及技巧 [J]. 中国保健营养旬刊，2014，24(04).：2198-2198.
[4] 周海燕，邢琳，杨艳旭 . 不同学历护理人员护患沟通认知与态度调查研究 [J]. 卫生职业教育，2014，32(23):118-119.
[5] 梁玉梅，王均萍 . 护患沟通技巧在创伤护理中的应用价值探讨 [J]. 医学信息，2015，28(47):167-168.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net