构音障碍儿童的口腔能力分级评估方法和标准

姜文厚、王娟、张月香、徐水艳、王艳华

单位：上海闵行区梅陇杏林为残服务中心　邮编：201102

摘要：为了规范言语障碍的康复训练标准和康复水平，对康复人员的业务水平进行规范化管理，制定一套实用的、可操作性的、客观的评估标准是很必要的。现阶段的医学评估方法，不适用于特殊儿童的言语训练。根据实际经验我们制定了一套完整的评估方法和评估标准，使特殊学校和培训机构有章可循。

关键词：言语康复、构音训练、口腔能力评估、构音能力评估

在语言障碍的儿童中，由于构音能力不足导致的语言障碍还是有相当多的。这部分儿童没有器质性病变，所以其语言障碍的治疗不是在医院中进行，而是在特殊教育学校和康复机构中。现阶段的一些构音障碍的评估标准，主要是针对有器质性病变的儿童进行的，在实际康复训练中，没有指导意义。上海杏林教育在总结了十几年的经验和教训，总结出了针对这部分特殊儿童的口腔能力分级评估标准。同时，这一评估标准，是有统一的实际操作工具所对应的，所以这一评估标准具有客观性、实用性和可操作性。由于这一评估标准的建立，使我们的语言康复取得了里程碑式的进步。运用这一评估标准，不到可以考核老师的康复水平，也能评估现阶段受训人员的实际水平。

下面我们就来详细讨论这一评估标准。我们制定的评估标准是从以下几个方面进行评估的。1、感知觉能力的评估。2、呼吸能力的评估。3、下颌能力的评估。4、唇肌能力的评估。5、舌肌能力的评估。所有评估均按照医学类评估方式，其中功能类评估是分为 5 个级别（0--4 级）。

具体评估方法：

一、感知觉能力评估。

1、 **评估材料：**

舌体刺激棒、构音板、触觉指套、电动牙刷、医用棉签、触觉按摩球、振动按摩仪、韧性食物等。

2、 **评估方法：**

（1）颈部和面部：治疗师和患儿面对面坐着，治疗师使用双手从触摸患儿的双手、手臂、肩部开始，逐渐过渡到颈部、面部，对这些部位的表面施以轻柔的触觉刺激，观察患儿的反应；

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（2）双唇：治疗师用医用棉签对患儿的上唇的外表面轻轻地从一侧刷到另一侧，再到下唇，最后过渡到上下唇的内侧，观察患儿的反应；

（3）齿龈：治疗师用医用棉签放置于患儿上齿龈中间处，再分别向左右两侧轻轻地刷，并以同样的方法刺激下齿龈，观察患儿的反应；

（4）脸颊内表面：治疗师用舌体刺激棒或构音板放置于患儿一侧脸颊的内表面，以打圈的方式从前往后轻轻地刺激，用同样的方法刺激另一侧，观察患儿的反应；

（5）硬腭：治疗师用医用棉签从硬腭的一侧向另一侧刷，从前逐渐往后过渡，观察患儿的反应；

（6）舌肌：治疗师用舌体刺激棒或构音板轻轻地刷患儿的舌肌表面，从舌尖到舌面，再到舌侧缘，观察患儿的反应；

（7）口咽部：口咽部的触觉刺激应当能诱导出呕吐反射。治疗师用舌体刺激棒或构音板放在患儿舌尖处，然后沿着舌正中线由舌尖往舌根部滑行，当到达舌中、后 1/3 交界处时，观察患儿的反应。治疗师也可以刺激患儿口部的其他结构，如悬雍垂、软腭等。由于大多数人可以抑制住该处产生的呕吐反应，所以事前不要告诉患儿治疗师的目的，而是在评估其他部位口部触觉敏感性时，悄悄地进行呕吐反射的诱导。

3、评估结果：

感知觉评估分为：超敏、弱敏、正常三个级别。

（1）口腔外部：颈部和面部、双唇：

正常反应：儿童应当能够耐受这种刺激，甚至会喜欢由此而产生的感觉，当检查者把器械放入其口腔时，他可能会表现得比较配合。

超敏反应：儿童拒绝触碰或者允许触碰但表现出不适、推开、害怕、面部扭曲或唇部收缩的状态，严重时可能会出现呕吐的现象。

弱敏反应：儿童可能根本没有意识到自己被触碰了，忽视了触摸，或者根本不做出任何反应，或者还渴望接受更多的触觉刺激，或者由于他还没有感觉到刺激而不接受这种刺激。

（2）口腔内部：齿龈、脸颊内表面、舌肌：

正常反应：儿童应当能够耐受这种刺激，甚至会喜欢由此而产生的感觉，当检查者把器械放入其口腔时，他可能会表现得比较配合。

超敏反应：儿童拒绝触碰或者允许触碰但表现出不适、推开、害怕、面部扭曲或唇部收缩的状态，严重时可能会出现呕吐的现象。

弱敏反应：儿童可能根本没有意识到自己被触碰了，忽视了触摸，或者根本不做出任何反应，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

或者还渴望接受更多的触觉刺激，或者由于他还没有感觉到刺激而不接受这种刺激。

（3）口腔内部：硬腭：

正常反应：儿童几乎不能耐受这种刺激，表现出诸如推开等厌恶的反应，呈现瘙痒地反应，甚至试图用舌舔上颚来减少这种感觉。

超敏反应：儿童拒绝触碰，或者允许触碰但表现出明显的厌恶反应或呕吐反应。

弱敏反应：儿童可能不作出任何的反应，甚至还渴望接受更多的触觉刺激，或者由于还没有感受到刺激而不接受这种刺激。

（4）口腔内部：口咽部：

正常反应：呕吐反射是判断患儿口腔内部触觉敏感性的最好方法。而口咽部的触觉刺激应当能诱导出呕吐反射。刺激时，当舌体刺激棒或构音板到达舌中、后 1/3 交界处，呕吐反射出现。具体表现为：下颌和舌向前下方运动，舌骨和喉上抬，喉咽的前部和后部延中线运动，悬雍垂抬高保护鼻腔，舌呈现槽状，其中间形成深沟，两侧缘抬高。

超敏反应：刺激时，当舌体刺激棒或构音板到达舌前部或舌前 2/3 处时，呕吐反射就出现，有的甚至只要刺激舌前 1/2 处、脸颊、双唇、或齿龈前部，就可以诱导出呕吐反射。

弱敏反应：刺激时，当舌体刺激棒或构音板到达舌中、后 1/3 交界处时，呕吐反应没有出现，再往后刺激甚至到达舌根部时，均不能出现。

二、呼吸能力的评估

1，初级呼吸能力的评估

1、**评估方法**：治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范将竖笛放入口中，双唇紧闭将其包住，并及时送气将笛子吹响，重复 10 个。

2、**评估等级参考**

0 级：无反应；

1 级：需要在完全辅助下，才能将笛子吹出响声；

2 级：在部分辅助下，能将笛子吹出响声；

3 级：能独立吹响 10 次，但不能每个都在 2 秒内及时吹出响声；

4 级：能独立吹响 10 次，且每个都能在 2 秒内及时吹出响声。

2，进阶呼吸能力的评估

1、评估方法：治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范下颌保持稳定，圆唇将下颌分级管上的乒乓球吹走，重复 10 个。要求患儿模仿完成同样的动作。

2、评估等级参考

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

0 级：不能对准目标吹气；

1 级：能对准目标独立吹走 3 号分级管上的乒乓球 10 个，但不能每个都一次完成；；

2 级：能独立对准目标吹走 3 号分级管上的乒乓球 10 个，且每个都能一次完成；

3 级：能独立对准目标吹走 5 号分级管上的乒乓球 10 个，但不能每个都一次完成；

4 级：能独立对准目标吹走 5 号分级管上的乒乓球 10 个，且每个都能一次完成。

3，强化呼吸能力的评估

1、**评估方法**：治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范将吹龙放入口中，双唇紧闭将其包住，并及时送气将吹龙吹响，重复 10 个。

2、**评估等级参考**

0 级：无反应；

1 级：在辅助下能吹出长条；

2 级：偶尔能独立吹出长条击物，但次数小于 10，不是每个都能成功；

3 级：能独立吹出长条击物 10 次，但不能每次都能在 2 秒内及时吹出；

4 级：能独立吹出长条击物 10 次，且每次都能在 2 秒内及时吹出。

4，控制呼吸能力的评估

1、评估方法：治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范有节奏地吹响竖笛，让患儿模仿完成相同的动作。

2、评估等级参考

0 级：无反应；

1 级：能有节奏吹响 5 个琴键，但需要按压腹部提示；

2 级：能有节奏吹响 5 个琴键，不需要按压腹部提示；

3 级：长短音结合吹口风琴，需要按压腹部提示；

4 级：长短音结合吹口风琴，不需要按压腹部提示。

三、下颌能力的评估

1）下颌运动能力评估

① **评估材料：**T 型咀嚼器、空心咀嚼管、两用咀嚼器、下颌咀嚼训练器；

② **评估方法：**治疗师把 T 型咀嚼器放入自己一侧臼齿处，间断、充分咬合 10 次，要求患儿模仿。同样的方法，依次使用空心咀嚼器、两用咀嚼器、下颌咀嚼器进行测试，观察并记录下颌的运动情况。

③ 评估等级参考

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

0 级：无反应；

1 级：能间断咬合 T 型咀嚼器，咬合充分，下颌无左右滑动；

2 级：能间断咬合空心咀嚼管，咬合充分，下颌无左右滑动；

3 级：能间断咬合两用咀嚼器，咬合充分，下颌无左右滑动；

4 级：能间断咬合下颌咀嚼器，咬合充分，下颌无左右滑动。

2）下颌分级控制能力评估

闭合位

① **评估材料**：构音板

② **评估方法**：治疗师示范将构音板横着放在上下牙齿中间，咬住，并稳定下颌，保持 3 秒，要求患儿模仿做出同样的动作，然后撤出构音板，下颌仍保持在闭合位发“i”，并持续 3 秒。

③ **评估等级参考**

0 级：不能咬住构音板；

1 级：咬住构音板，但不能保持 3 秒；

2 级：咬住构音板，且能保持 3 秒；

3 级：撤除构音板，能保持闭合位发“i”但不能持续 3 秒；

4 级：撤除构音板，能保持闭合位发“i”并能持续 3 秒。

小半开位

① **评估材料**：下颌稳定棒

② **评估方法**：治疗师示范把下颌稳定棒横放在上下牙齿之间，咬住，并稳定下颌，持续 3 秒，要求患儿模仿完成相同的动作，然后撤出下颌稳定棒，下颌仍保持在小半开位发“e”，并持续 3 秒。

③ **评估等级参考**

0 级：不能含住下颌稳定棒；

1 级：能含住下颌稳定棒，但不能保持 3 秒 ；

2 级：能含住下颌稳定棒，并保持 3 秒；

3 级：撤出下颌稳定棒，能保持在小半开位发″e″，但不能持续 3 秒；

4 级：撤出下颌稳定棒，能保持小半开位发″e″，并持续 3 秒。

大半开位

① **评估材料**：3 号多功能分级管

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

② **评估方法：**治疗师示范张开嘴巴，咬住 3 号分级管，稳定下颌，并保持 3 秒，要求患儿模仿完成相同的动作,然后撤出分级管，下颌仍保持在大半开位发“o”，持续 3 秒。

③ **评估等级参考**

0 级：不能含住 3 号多功能分级管 ；

1 级：能含住分级管，但不能保持 3 秒；

2 级：能含住分级管，并保持 3 秒；

3 级：撤出分级管，能保持大半开位发″o″，但不能持续 3 秒；

4 级：撤出分级管，能保持大半开位发″o″，并持续 3 秒。

全开位

① **评估材料：**5 号多功能分级管

② **评估方法：**治疗师示范咬住 5 号多功能分级管，并稳定下颌，保持 3 秒，要求患儿模仿完成相同的动作,然后撤出分级管，下颌仍保持在全开位发“a”，持续 3 秒。

③ **评估等级参考**

0 级：不能含住 5 号多功能分级管 ；

1 级：能含住分级管，但不能保持 3 秒；

2 级：能含住分级管，并保持 3 秒；

3 级：撤出分级管，能保持全开位发″a″，但不能持续 3 秒；

4 级：撤出分级管，能保持全开位发″a″，并持续 3 秒。

3）下颌转换能力评估

① **评估材料：**T 型咀嚼器、空心咀嚼管、两用咀嚼器、下颌咀嚼器

② **评估方法：**治疗师把 T 型咀嚼器放入自己一侧臼齿处，在 15 秒内充分、连续、匀速地咬合 20 个，下颌无左右滑动现象，要求患儿模仿。同样的方法，依次使用 T 型咀嚼器、空心咀嚼管、两用咀嚼管和下颌咀嚼器进行测试，观察并记录下颌的运动情况。

③ **评估等级参考**

0 级：不能进行连续咬合；

1 级：能在 15 秒内充分、连续、匀速地咬合 T 型咀嚼器，且下颌无左右滑动现象；

2 级：能在 15 秒内充分、连续、匀速地咬合空心咀嚼管，且下颌无左右滑动现象；

3 级：能在 15 秒内充分、连续、匀速地咬合两用咀嚼管，且下颌无左右滑动现象；

4 级：能在 15 秒内充分、连续、匀速地咬合下颌咀嚼器，且下颌无左右滑动现象。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

四、唇的功能评估

1）双唇闭合运动能力评估

① **评估材料**：唇肌运动训练器

② **评估方法**：治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范用双唇抿住唇肌运动训练器，并保持 3 秒，要求患儿模仿完成同样的动作。

③ **评估等级参考**

0 级：无反应；

1 级：无负重，持续 3 秒；

2 级：两个配重，持续 3 秒；

3 级：四个配重，持续 3 秒；

4 级：八个配重，持续 3 秒。

2）圆唇控制能力

① **评估材料**：3 号多功能分级管

② **评估方法**：治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范充分运用双唇力量夹住 3 号分级管，并保持 3 秒，要求患儿模仿完成同样的动作。

③ **评估等级参考**

0 级：无反应；

1 级：努力夹住却不能，只能用眼睛、头或肩代替或辅助；

2 级：夹住很费力，唇肌僵硬或无力；

3 级：能充分运用唇肌力量夹住，但无法保持 3 秒；

4 级：能充分运用唇肌力量夹住，且能保持 3 秒。

五、舌的能力评估

1）舌尖向前伸展运动

① 评估方法：治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范把舌肌运动训练器的重力球放置于自己舌正前方 2-3cm 处，并用舌尖碰到重力球，保持 3 秒。之后再把舌肌运动训练器的重力球放置于患儿舌正前方 2-3cm 处，观察患儿有伸舌的意识时，诱导患儿伸舌去舔重力球并保持 3 秒。如患儿对舌肌运动训练器的重力球不作出反应时，可以尝试使用患儿感兴趣的食物来诱导其伸舌去舔，记录患儿的舌尖的运动情况。

② 评估等级参考

0 级：无反应；

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 级：可见舌尖试图外伸，但无法完成，只能用唇、头、眼、下巴或肩膀运动来代替或辅助；

2 级：舌尖能向前平伸，但无法伸出口外，触碰重力球 ；

3 级：舌尖能向前平伸，并伸出口外，触碰重力球，但无法保持 3 秒；

4 级：舌尖能向前平伸，并伸出口外，触碰重力球，且保持 3 秒，无抖动 。

2）舌尖上抬运动

① **评估方法：**治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范把舌肌运动训练器的重力球放置于自己舌肌正前方 2-3cm 处，并用舌尖去舔重力球至最高位，保持 3 秒。之后把舌肌运动训练器的重力球放置于患儿舌正前方 2-3cm 处，观察患儿有伸舌的意识时，诱导患儿伸舌去舔重力球至最高位，并保持 3 秒。如患儿对舌肌运动训练器的重力球不作出反应时，可以尝试使用患儿感兴趣的食物放到舌肌上方，来诱导其伸舌去舔，记录患儿的舌尖的运动情况。

② **评估等级参考**

0 级：无反应；

1 级：可见舌尖试图上抬，但无法完成，只能用唇、头、眼、下巴或肩膀运动来代替或辅助；

2 级：舌尖能独立上抬，将舌肌运动训练器上的重力球舔动，但无法达到最高位；

3 级：舌尖能独立上抬，将舌肌运动训练器上的重力球舔动，能达到最高位，但无法保持 3 秒；

4 级：舌尖能独立上抬，将舌肌运动训练器上的重力球舔动，能达到最高位，且能保持 3 秒。

3）舌尖向下运动

① 评估方法：治疗师平躺在按摩床上，示范把舌肌运动训练器的重力球放置在自己舌肌正前方 2-3 厘米的位置，舌尖前伸接触重力球，并由上到下舔至最低端，保持 3 秒，可重复 3 次，要求患儿模仿完成相同的动作，记录患儿舌尖运动情况。

② 评估等级参考：

0 级：无反应；

1 级：舌尖能独立前伸，但无法向下舔动重力球，只能用唇、头、眼、下巴或肩膀运动来代替或辅助；

2 级：舌尖能向下舔动重力球，但不能达到最底端；

3 级：舌尖能向下舔动重力球至最底端，但无法保持 3 秒；

4 级：舌尖能向下舔动重力球至最底端，并能保持 3 秒。

4）舌尖向左运动

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

① 评估方法：治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范把舌肌运动训练器的重力球放置于自己舌肌正前方 2-3cm 处，用舌尖将重力球舔至最左边，并保持 3 秒。之后再把舌肌运动训练器的重力球放置于患儿舌正前方 2-3cm 处，观察患儿有伸舌的意识时，诱导患儿伸舌去舔重力球至最左边，并保持 3 秒。如患儿对舌肌运动训练器的重力球不作出反应时，可以尝试使用患儿感兴趣的食物来诱导其伸舌去舔，记录患儿的舌尖的运动情况。

② **评估等级参考**

0 级：无反应；

1 级：可见舌尖试图向左移动重力球，但无法完成，只能用唇、头、眼、下巴或肩膀运动来代替或辅助；

2 级：舌尖回缩或无力，用舌叶代替舌尖向左舔动重力球，且不能将重力球移动至顶点；

3 级：舌尖能向左舔重力球至顶点，但不能保持 3 秒；

4 级：舌尖能向左舔重力球至顶点，且能保持 3 秒。

5）舌尖向右运动

① **评估方法：**治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范把舌肌运动训练器的重力球放置于自己舌肌正前方 2-3cm 处，用舌尖将重力球舔至最右边，并保持 3 秒。之后再把舌肌运动训练器的重力球放置于患儿舌正前方 2-3cm 处，观察患儿有伸舌的意识时，诱导患儿伸舌去舔重力球至最右边，并保持 3 秒。如患儿对舌肌运动训练器的重力球不作出反应时，可以尝试使用患儿感兴趣的食物来诱导其伸舌去舔，记录患儿的舌尖的运动情况。

② **评估等级参考**

0 级：无反应；

1 级：可见舌尖试图向右移动重力球，但无法完成，只能用唇、头、眼、下巴或肩膀运动来代替或辅助；

2 级：舌尖回缩或无力，用舌叶代替舌尖向右舔动重力球，且不能将重力球移动至顶点；

3 级：舌尖能向右舔重力球至顶点，但不能保持 3 秒；

4 级：舌尖能向右舔重力球至顶点，且能保持 3 秒。

6）舌尖内卷运动

① **评估方法：**治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范把舌肌运动训练器与水平面成 15° 角放置于自己舌肌正前方，并用舌尖将重力球舔至最高处，保持 3 秒。之后再把舌肌运动训练器同样成 15° 角放置于患儿舌正前方，诱导患儿伸舌去舔重力球至最高处，并保持 3 秒。如患儿对舌肌运动训练器的重力球不作出反应时，可以尝试使用患儿感兴

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

趣的食物来诱导其伸舌去舔，记录患儿的舌尖的运动情况。

② **评估等级参考**

0 级：无反应；

1 级：可见舌肌收缩，但无法完成，只能用唇、头、眼、下巴或肩膀运动来代替或辅助；

2 级：舌尖能向内卷，将舌肌运动训练器上的重力球舔动，但无法达到顶点；

3 级：舌尖能向内卷，将舌肌运动训练器上的重力球舔至顶点，但无法持续 3 秒；

4 级：舌尖能向内卷，将舌肌运动训练器上的重力球舔至顶点，且持续 3 秒。

7）舌尖上下连续运动

① 评估方法：该能力需在患儿舌尖能完成向上和向下单项运动的基础上才进行评估。让患儿平躺在按摩床上，治疗师让患儿舌尖伸出口外接触重力球，提示其舌尖向上运动舔动重力球至最高处，再利用舌尖的力量将重力球舔至最低处为 1 回合，连续运动 3 个回合，观察并记录其舌尖运动情况。

② 评估等级参考

0 级：没反应；

1 级：舌尖试图做，但不会上下连续移动重力球，用头、眼下巴或肩膀运动来代替；

2 级：舌尖回缩或无力，用舌叶代替舌尖上下连续移动重力球，运动不规则，无节律，速度缓慢；

3 级：舌尖能上下连续移动重力球，但不能持续 3 次，运动慢，力量稍差，有轻微抖动；

4 级：舌尖能轻松自如的上下连续移动重力球达 3 次。

8）舌尖左右连续运动

① 评估方法：该能力需要患儿舌尖能完成向左和向右单项运动的基础上进行。治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师示范把舌肌运动训练器的重力球放置于自己一侧嘴角处，用舌尖将重力球舔至对侧，再从对侧将重力球舔回来。连续运动 3 个回合。要求舌尖左右连续运动时，下颌保持稳定，舌尖做独立运动。

② 评估等级参考

0 级：没反应；

1 级：舌尖试图做，但不会左右连续移动重力球，用头、眼下巴或肩膀运动来代替；

2 级：舌尖回缩或无力，用舌叶代替舌尖左右连续移动重力球，运动不规则，无节律，速度缓慢；

3 级：舌尖能左右连续移动重力球，但不能持续 3 次，运动慢，力量稍差，有轻微抖动；

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4 级：舌尖能轻松自如的左右连续移动重力球达 3 次。

9）舌尖前后连续运动

① 评估方法：该能力需在患儿舌尖能完成向前伸展和内卷运动的基础上才进行评估。治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师把舌肌运动训练器的前后水平位放入患儿口腔，重力球放置于训练器的最前端，距舌尖 2-3cm，提示患儿伸舌把重力球由前向后拨动至顶端，再由后向前拨动至顶端，观察并记录患儿舌尖运动情况。

② 评估等级参考

0 级：没反应；

1 级：舌尖试图做，但不会前后连续移动重力球，用头、眼下巴或肩膀运动来代替；

2 级：舌尖回缩或无力，用舌叶代替舌尖前后连续移动重力球，运动不规则，无节律，速度缓慢；

3 级：舌尖能前后连续移动重力球，但不能持续 3 次，运动慢，力量稍差，有轻微抖动；

4 级：舌尖能轻松自如的前后连续移动重力球达 3 次。

10）舌碗形态刺激反应

① 评估方法：治疗师和患儿面对面坐着，建立关注。治疗师手持构音板，由外向内轻轻的刷患儿的舌前 1/3 处，观察患儿在接受刺激之后舌体的形态。

② 评估等级参考

0 级：无反应；

1 级：有意识，但压下没反应；

2 级：多次刺激后，才出现舌尖或两侧缘上抬；

3 级：多次刺激后，出现舌碗反应；

4 级：只要给予刺激，舌碗反应就形成。

11)舌尖向外抵抗运动

① **评估方法：**治疗师与患儿面对面坐着，建立关注。治疗师手持舌体刺激棒，利用点面从水平方向上对准患儿舌尖，施加轻柔持续的力向内推舌，并提示患儿用力把舌体刺激棒顶出口腔，观察患儿舌肌的运动情况。

② **评估等级参考**

0 级：无反应；

1 级：舌尖有向外抵抗的意识，但无法向前伸展接触舌体刺激棒，可能会用舌中部来代偿向外抵抗；

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 级：只能将舌体刺激棒抵抗唇齿的位置，不能完全顶到口腔外部，舌肌力量弱；

3 级：能将舌体刺激棒顶到口腔外部，但舌肌力量稍差，无法保持 3 秒，舌肌有轻微抖动；

4 级：能轻松将舌体刺激棒顶到口腔外部，并且舌尖有力向前伸展，保持 3 秒，舌肌无抖动。

参考文献：1、李胜利《语言治疗学》 2014 年 6 月第二版 人民卫生出版社

2、黄昭鸣 杜晓新《言语障碍的评估与矫治》2006 年第一版 华东师范大学出版社

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net